LIBRAIRIE ALAIN BRIEUX
48, rue Jacob . 75006 PARIS
Tél. 42 60 21 98

Inv. No 13593 19 96

Case No 22

A gift of
Associated Medical Services, Incorporated
and the
Hannah Institute for the History of Medicine

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/traitdesmaladi00louy

TRAITÉ
DES MALADIES NERVEUSES
OU VAPEURS.

PREMIER TOME.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

MRI-GEN
S30

TRAITÉ
DES MALADIES NERVEUSES
OU VAPEURS,
ET PARTICULIÈREMENT DE L'HYSTÉRIE
ET DE L'HYPOCONDRIE;

PAR M. LOUYER VILLERMAY,

Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Médecin de la 3e Légion de la Garde nationale, Médecin du 2e Dispensaire de la Société philantropique, attaché aux Tribunaux du département de la Seine, Membre de la Société de l'École de Médecine, et de plusieurs Sociétés nationales et étrangères.

Il y a des affaires et des maladies que les remèdes aigrissent en certains temps, et la grande habileté consiste à connaître quand il est dangereux d'en user.

Réflexion morale de LA ROCHEFOUCAULT, 296.

Université d'Ottawa
BIBLIOTHÈQUES
LIBRARIES
University of Ottawa

A PARIS,

CHEZ MÉQUIGNON l'aîné père, Libraire de la Faculté de Médecine, rue de l'École de Médecine.

1816.

NO
LOAN
RC
532
.L68
1816

DBN: 1364737

Cet Ouvrage se trouve aussi :

A MONTPELLIER,

Chez SEVALLE, Libraire, Grande-Rue, n° 122.

PRÉFACE.

Les mêmes considérations qui nous engagèrent, il y a quinze ans, à choisir l'hypocondrie pour sujet d'une dissertation inaugurale, nous déterminent encore aujourd'hui à publier cet ouvrage sur les maladies nerveuses *proprement dites ;* ouvrage dans lequel nous avons fondu notre premier travail. Le désir d'éclairer l'histoire de ces affections dont la nature et le traitement étaient souvent un sujet d'incertitudes ou de discussions, et l'espoir d'être utiles aux personnes atteintes par ce fléau, qui afflige tous les rangs de la société, étaient à nos yeux des motifs puissans. Ajoutons que notre propre expérience ne nous avait que trop appris à bien connaître les souffrances physiques et morales qui résultent de ce genre de maladies. Nous appréciâmes mieux dès-lors l'influence de leurs diverses causes ; il nous fut également possible de considérer la succession et la variété de leurs phénomènes, de leurs complications ; et surtout la valeur des différens moyens curatifs, en examinant les circonstances auxquelles nous dûmes notre rétablissement. Enfin, de fréquens rapports avec les personnes qui, par leur éducation, leur profession, leurs

habitudes, ou une sensibilité des plus vives, etc., sont spécialement exposées aux affections nerveuses, nous ont encore aidés à les étudier et à les approfondir.

Quelques soins que nous ayons donnés à ce travail, nous ne pouvons nous dissimuler qu'il est encore très-imparfait, et bien loin de répondre à tous nos vœux ; d'offrir surtout cette précision qu'exigeront les médecins, et cette profondeur de vues, cette force de raisonnemens que permet d'espérer l'heureuse impulsion communiquée à la science médicale. Nous désirons seulement qu'on veuille bien le comparer aux traités qui ont paru jusqu'à ce jour sur le même objet, et l'on conviendra, nous osons nous en flatter, que si nous sommes loin d'avoir fait le mieux possible, on ne saurait du moins nous reprocher d'être restés en arrière. Mais en attendant que des observations nouvelles et une étude constante nous permettent de rétablir quelques faits, de remplir des lacunes, ou de réparer quelques inexactitudes, au risque de prendre, pour le vœu du public, celui de quelques amis indulgens, nous cédons à leurs instances et à nos désirs. Comptant sur la faveur acquise à notre premier essai, nous livrons ce nouveau fruit de nos veilles à la périlleuse épreuve du grand jour (1).

---

(1) Déjà nous avons tiré un parti utile des avis éclairés

En publiant cet ouvrage nous n'avons pas eu la prétention de donner un traité complet de tous les désordres compris arbitrairement sous la dénomination de *maladies nerveuses*, nous nous sommes proposés seulement d'exposer l'histoire des affections qu'on désigne plus particulièrement sous le nom de *vapeurs* ou de *maux de nerfs*. En effet, quels rapports ont le tétanos, l'hydrophobie, la danse de Saint-Guy, les névralgies, etc., avec les névroses qui font l'objet de notre étude. Devions-nous faire entrer dans notre cadre tout ce que les gens du monde comprennent hasardeusement sous le titre d'*affections nerveuses*. Mais où nous serions-nous arrêtés ?

Si d'une part les observateurs profonds savent parfaitement distinguer ces maladies, à l'aide d'une attention opiniâtre, de l'autre des hommes superficiels se trompent parfois dans leur diagnostic; les uns, préjugeant légèrement du tempérament ou du caractère mélancolique d'un individu, supposent à la maladie dont il est atteint une nature analogue à cette disposition; les autres voient l'hystérie dans presque tous les déran-

---

qui nous furent donnés lors de notre Dissertation. Également convaincus des avantages qu'on peut espérer d'une bonne critique, des réflexions judicieuses et des faits nouveaux, nous serons toujours disposés à les accueillir avec reconnaissance.

gemens qu'éprouve la santé des femmes; non-seulement ils l'admettent là où elle n'existe pas, mais encore dans telle occasion où son existence n'est pas probable (1).

Combien de fois ne s'est-on pas mépris sur la nature ou le caractère des affections nerveuses? Tantôt deux variétés, tantôt les divers degrés ou des nuances variables de la même névrose étaient considérés comme des maladies différentes. Ainsi l'on désignait sous le nom d'*épilepsie utérine*, une variété de l'hystérie, comme nous le démontrerons ; ainsi la prédominance des symptômes locaux de l'hypocondrie, l'intensité des signes sympathiques, ou le fait seul de l'exaltation mentale donnaient lieu à de pareilles méprises. D'autres fois enfin, la multiplicité des névroses les a fait admettre gratuitement, ou supposer dans un état de simplicité, lorsqu'elles

---

(1) Ce genre d'erreurs est très-fréquent, et nous en rapporterons un exemple. Une jeune dame ressent des douleurs vives dans l'hypogastre avec dysurie, fièvre et vomissemens. On fait une consultation, et un médecin n'hésite pas à déclarer que c'est *hystérique*. En vain lui représente-t-on que cette personne est nouvellement mariée à un homme qu'elle aime beaucoup; il n'en départ pas. Toutefois le déplacement de la maladie, qui plus tard occupa successivement l'estomac, la poitrine et la tête, ne laissa aucun doute sur son principe rhumatismal.

étaient compliquées. Cependant les maladies nerveuses, quoique très-multipliées, ne sont pourtant pas aussi répandues qu'on pourrait le croire, et il est trop vrai que cette dénomination est fréquemment un manteau officieux dont se couvrent l'inapplication ou l'ignorance. Quand faute d'une attention ou de notions suffisantes, quelques praticiens ne parviennent pas à reconnaître une maladie, ils ont recours à un échappatoire, et sortent d'embarras en disant, c'est une affection nerveuse, hystérique ou hypocondriaque. Ma mémoire seule me fournirait plusieurs preuves à l'appui de cette assertion; et je l'avouerai, je n'ai pas toujours été, surtout autrefois, étranger à ces inadvertances, à ces jugemens précipités.

Dans un tel état de choses, quel a dû être notre but? de tracer les premières routes pour arriver à la vérité, d'écarter tout ce qui pouvait la déguiser; en un mot, d'exposer, d'après nature, le tableau des affections les plus éminemment nerveuses, de celles qui sont les plus fréquentes, et les causes indirectes du plus grand nombre d'erreurs. Ce qui justifie encore notre plan ainsi limité, c'est la question proposée, en 1784, par la Société royale de Médecine. Elle demandait : « Quels sont les caractères des ma-
» ladies nerveuses *proprement dites*, telles que

» l'hystérie et l'hypocondrie, etc.; jusqu'à quel
» point diffèrent-elles des maladies analogues,
» telles que la mélancolie? Quelles sont leurs
» causes principales, et les indications générales
» que l'on doit se proposer dans le traitement? »

Mais aucun mémoire, aucun traité publié jusqu'ici n'a embrassé cette question dans toute son étendue, ne l'a présentée sous son jour véritable : on peut donc dire que les vœux de cette Compagnie savante n'ont pas été exaucés, que ses intentions, si favorables aux progrès de la science, n'ont pas été remplies. Toutefois cette question nous a paru si bien posée; elle exprime si clairement, et avec tant de précision, le vrai point de vue sous lequel on doit considérer les maladies nerveuses, que nous avons craint de nous en écarter sensiblement; et les désirs de cette Société célèbre sont devenus l'objet de nos efforts. Non-seulement nous avons cherché à résoudre chacun des élémens de cette proposition, mais nous y avons donné des développemens très-étendus, et qui n'étaient pas indiqués, ou du moins exigés par le programme. Ainsi nous avons isolé l'hystérie du mal caduc et des convulsions, etc., l'hypocondrie de l'hystérie, de la mélancolie, des phlegmasies chroniques, et des lésions organiques de l'abdomen; nous avons séparé ces névroses, non-seulement des maladies

qui s'en rapprochent par leur nature ou par leur siége, mais encore de beaucoup d'autres affections qui n'ont avec elles que des similitudes ou des analogies spécieuses.

Pour mieux préparer nos lecteurs à la connaissance de ce travail, nous allons en outre indiquer l'ordre que nous avons suivi.

Cet ouvrage est divisé en deux Parties : dans la première nous traitons de l'affection hystérique, maladie spasmodique dans ses symptômes les plus apparens, mais éminemment nerveuse par sa nature, ses causes, sa marche et ses terminaisons. De l'énoncé de ses sources diverses, nous passons à la description de ses phénomènes et de ses variétés, dont deux que nous admettons méritent une attention particulière ; nous traçons ensuite, dans autant de chapitres, ses terminaisons, ses complications, son diagnostic et son pronostic ; enfin les différentes méthodes curatives qu'il convient d'y opposer.

Le douzième chapitre est consacré au résumé de cette première partie : ces analyses sont profitables aux hommes familiarisés avec l'histoire d'une maladie ; elles leur en rappellent les principaux traits, et permettent de rattacher à ceux-ci des faits moins saillans, mais plus nombreux.

Cette première Partie est infiniment moins éten-

due que la seconde, parce que l'hystérie, quoique assez fréquente, est cependant bien moins répandue que l'hypocondrie : celle-ci d'ailleurs est commune aux deux sexes; elle est familière à un bien plus grand nombre d'individus, en raison de ses causes infiniment plus variées et plus nombreuses, se manifeste pendant le cours presque total de la vie humaine, et enfin se prolonge beaucoup plus long-temps. Ce sont en partie ces raisons qui d'abord nous avaient engagés à réunir, en un seul volume, ce travail, dans la crainte de le diviser d'une manière peu régulière; mais considérant ensuite son étendue, nous avons préféré, afin de rendre l'ouvrage plus portatif et plus commode à la lecture, le partager en deux tomes qui, rapprochés, ne feront qu'un seul volume.

Dans la seconde Partie nous avons envisagé l'hypocondrie sous les mêmes rapports, mais nous y avons présenté des développemens beaucoup plus considérables, d'après les motifs que nous venons d'énoncer.

L'histoire de cette vésanie est également divisée en douze chapitres. Le premier traite de ses généralités, le second nous en offre les causes principales. Ces causes étant si nombreuses, si variées, et agissant sur un très-grand nombre de personnes, leur connaissance enfin étant si im-

portante, nous avons donné à leur étude une application suivie et des soins particuliers à leur exposition. Dans le troisième chapitre, on trouvera des réflexions sur le principe, la nature intime du désordre; au suivant, sont rattachés tous les phénomènes de la maladie que nous distinguons en symptômes locaux, en signes sympathiques, et en phénomènes moraux.

Cette distinction naturelle, quoique inexacte sous quelques rapports, favorise beaucoup l'intelligence de la marche si variée que suit ordinairement cette affection nerveuse.

Remarquons en outre que les symptômes locaux sont dans l'histoire des maladies ce que sont dans l'histoire des peuples les époques, c'est-à-dire les points sur lesquels on doit s'arrêter. « Mais de même, dit *Bossuet*, que pour aider la » mémoire dans la connaissance des lieux, on » retient certaines villes principales, autour » desquelles on place les autres chacune selon » sa distance, ainsi dans l'ordre des siècles, il » faut avoir certains temps marqués par quelque » grand événement auquel on rapporte tout le » reste (1) ». De même aussi il importe dans l'étude des maladies de s'attacher aux signes essentiels, pathognomoniques, comme à autant de

(1) Disc. sur l'Hist. univ.

points centraux, qui sont aux phénomènes sympathiques, comme l'axe aux rayons.

Le cinquième chapitre est consacré à faire connaître les variétés et les nuances de cette névrose; car autant celles-ci sont nombreuses, autant les premières le sont peu; si on les considère comme offrant des phénomènes différens de ceux qu'on observe dans la marche ordinaire de la maladie.

Nous exposons ensuite les terminaisons de l'hypocondrie simple avant d'indiquer ses complications ou les terminaisons de ces dernières : si celle-là se termine très-rarement d'une manière funeste, tant qu'elle reste simple; associée trop souvent à d'autres affections très-sérieuses, elle en partage ou plutôt en aggrave les dangers.

Un autre chapitre reproduit l'hypocondrie avec son cortége lugubre. Ce sont ses complications, le plus souvent méconnues, qui lui ont mérité les noms de *morbus herculeus, protheus, pandoræ pixis*, complications que *Tissot* confondait avec l'hypocondrie simple, lorsqu'il la jugeait d'une manière si alarmante, et qu'enfin *Lorry* nous dépeignait sous le titre de *tabes melancholica*, consomption mélancolique ou plutôt hypocondriaque. Ce chapitre est le nécrologe des hypocondres.

« Malheur, dit *Rousseau* (1), à la jeune fille » qui lira une page de ce roman ; elle est per- » due ». Malheur aussi aux malades, aux médecins même qui liront ce chapitre ; ils se croiront perdus, s'ils ne comparent la mortalité, d'un côté, au nombre immense d'individus atteints par cette affection, et de l'autre, aux chances multipliées de guérison qu'on peut espérer.

Plus loin nous établissons le diagnostic de l'hypocondrie, et nous la différencions des maladies que, par analogie, on pourrait confondre avec elle ; nous tâchons également de la signaler au milieu d'affections nombreuses, et qui, bien qu'analogues, en sont cependant distinctes.

Le pronostic, qui est à son tour l'objet de notre examen, est rassurant, considéré dans son application exclusive à cette vésanie non compliquée. Un autre chapitre est destiné à constater les désordres qu'on rencontre chez les individus qui ont succombé non à celle-ci, mais par suite d'une complication.

Après avoir ainsi décrit les origines variées de l'affection qui nous occupe, sa marche, et toutes ses particularités, nous arrivons à son traitement, qui demande à être médité dans son ensemble et dans ses élémens, sous le rapport

(1) Nouvelle Héloïse.

des loix de l'hygiène, des médicamens et de l'application de nos facultés mentales.

Enfin un douzième et dernier chapitre nous rappelle l'histoire entière de l'hypocondrie dans une analyse rapide et serrée.

Toutefois cette exposition anticipée ne peut donner une idée exacte de notre plan; il faut donc pénétrer plus avant dans la route que nous avons frayée, en parcourir toute l'étendue, si l'on veut être à même de juger ce livre, non-seulement sans prévention, mais encore avec connaissance de cause.

TRAITÉ
DES MALADIES NERVEUSES
OU VAPEURS,
ET PARTICULIÈREMENT DE L'HYSTÉRIE ET DE L'HYPOCONDRIE.

PREMIÈRE PARTIE.
DE L'HYSTÉRIE.

CHAPITRE PREMIER.

Étymologie : *hystérie* des Français, *hysteria* des Latins, ἤπνιξ ὑσερικὴ des Grecs ; *uteri præfocatio*, suffocation de matrice, *d'*ὑσερα, ὑσερον; *uterus*, qui signifie matrice ; μήτρα, de μήτηρ, *mater*, mère.

Synonymie : *hystérie*, *hystéricie*, *hystéricisme*, *hystéralgie, passion et affection hystériques, affection utérine, suffocation de matrice, étranglement de l'utérus, mal de mère :* on a encore appelé cette maladie *vapeurs hystériques, ascension de la matrice.*

Le mot *hystérie* nous semble préférable, parce qu'il est plus généralement usité : celui d'*hystéralgie* convient mieux à l'inflammation de la matrice, comme paraît le prouver son origine d'ὑστερι αλγος, douleur de l'utérus. Chez les femmes hystériques, la sensibilité vitale ou organique de la matrice, d'après *Bichat,* est seule mise en action : en général, elles n'éprouvent aucun sentiment douloureux vers cet organe; dans son inflammation et ses affections chroniques, soit squirrhe, soit cancer, la sensibilité relative y est fort développée, et les douleurs les plus vives s'y font ordinairement sentir : tout moyen excitant porté sur ce viscère exaspérerait les accidens qui, au contraire, cèderaient presque toujours dans l'hystérie à l'excitation spéciale de l'organe affecté; tant il est vrai que dans ce dernier cas la sensibilité vitale ou organique est seule exaltée.

Les anciens attribuaient à un prétendu déplacement de la matrice le globe hystérique qui parcourt tout l'espace situé entre l'hypogastre et le larynx, et qui paraît dû à une irritation fixée successivement sur tous les rameaux des nerfs grand et moyen sympathiques, ou trisplanchnique et pneumogastrique : cette expression, d'*ascension de la matrice*, ne peut être conservée dans le langage médical, parce que les mots doivent toujours être en rapport avec les idées qu'on veut exprimer.

Classification. Les nosographes ont très-peu varié sur le rang qu'ils ont assigné à cette maladie : Sauvages et Vogel la classent dans les spasmes ; Cullen et Pinel dans les névroses. Avec le nosographe moderne, nous la rangeons dans la classe des *névroses;* ordre, *vésanies ;* genre, *névroses de la génération ;* espèce, *névroses génitales de la femme.*

Nous comprenons l'hystérie dans la classe des *vésanies*, plutôt que dans les *spasmes*, parce qu'elle se rapproche beaucoup plus des vésanies telles que l'hypocondrie avec laquelle on l'a confondue et même identifiée, que des affections spasmodiques dont la plupart des bons observateurs l'ont presque toujours distinguée.

Si les phénomènes les plus sensibles de l'affection hystérique très-intense se rapprochent des symptômes propres à l'épilepsie, au tétanos et aux convulsions idiopathiques, sa nature, ses causes, son développement, sa marche, son étiologie, ses différentes terminaisons, enfin les moyens curatifs qu'elle réclame, la rattachent aux maladies dites vaporeuses. De même que le délire ne peut faire placer la fièvre ataxique parmi les aliénations, de même les mouvemens convulsifs ne sauraient faire ranger l'hystérie parmi les maladies spasmodiques, quand d'autres considérations aussi variées qu'importantes engagent à la classer parmi les vésanies.

Les erreurs commises dans le diagnostic de l'hystérie sont d'autant plus étonnantes, que cette affection, par sa nature, ses causes, son siége, etc., forme une maladie toute particulière, et par conséquent peu susceptible d'être méconnue. Cependant plusieurs médecins, et même parmi ceux qui ont senti le besoin de l'isoler, se sont trompés sur ce point de doctrine médicale; ainsi *Hoffman*, qui lui consacre un chapitre particulier, et présente quelquefois l'hystérie bien isolée de toute autre affection, nous offre souvent aussi une hypocondrie, une mélancolie simple ou compliquée qu'il intitule *affection hystérique*.

Sydenham, dont l'exemple a trouvé beaucoup d'imitateurs, l'a si peu spécifiée, qu'il regarde l'hystérie, l'hypocondrie et la mélancolie comme une seule et même maladie, déterminée par les mêmes causes, offrant la même marche, et accessible aux mêmes moyens de curation. Comment l'autorité d'*Hippocrate*, de *Galien*, qui l'a bien décrite, d'*Arétée*, d'*Aëtius*, de *Paul d'Egine*, de *Mercurialis*, de *Forestus*, de *Sennert*, d'*Horstius*, *etc.*, qui ont tous regardé l'utérus comme le siége de cette maladie, n'a-t-elle pas prévenue toute erreur à cet égard, et ne l'a-t-elle pas emporté sur l'opinion de *Lepois*, de *Willis*, de *Sydenham* et de *Boerhaave*, dont les noms, quoique recommandables, ne pou-

vaient balancer des suffrages d'un bien plus grand poids.

En traitant de l'hypocondrie, nous ferons connaître les caractères qui la différencient de l'hystérie : les ressemblances qu'on a remarquées entre ces deux affections sont si fugitives, leurs causes, leur siége, leur nature si opposés, enfin leur marche et leur traitement si dissemblables, que nous ne pouvons nous rendre raison de la fausse route qu'on a suivie dans le diagnostic de l'hypocondrie et de l'hystérie. Plus loin, nous exposerons le diagnostic de cette dernière maladie, et les traits qui la distinguent de l'épilepsie. Examinons maintenant les circonstances qui ont contribué à faire admettre la prétendue existence de l'affection hystérique chez les individus du sexe masculin. Il est sans doute arrivé que des médecins ont confondu l'hypocondrie et l'hystérie, et regardé comme cette dernière maladie, l'affection hypocondriaque dont une femme était atteinte. Retrouvant ensuite des hommes qui leur présentaient les mêmes accidens, ils n'auront point hésité à déclarer que l'hystérie se manifestait chez l'homme, ainsi que chez la femme. Dans d'autres cas, ils auront méconnu la complication, lorsque l'hystérie et l'hypocondrie étaient réunies, et n'auront vu dans cet ensemble de phénomènes morbifiques qu'une simple hystérie. S'ils observaient ensuite l'homme

en proie à une affection hypocondriaque, ils retrouvaient une partie des accidens que leur avait offerts la femme affectée d'une double maladie, et se fondaient sur cette analogie pour avancer une erreur véritable, et qu'une observation plus attentive aurait rectifiée, pour émettre l'opinion que l'hystérie était commune aux deux sexes; bien que l'étymologie du mot hystérie impliquât contradiction.

Une objection plausible, sur laquelle s'appuient les médecins qui admettent l'hystérie chez l'homme, c'est l'analogie qui existe entre cette maladie et les affections nerveuses très-singulières, que l'on a observées sur quelques individus du sexe masculin. *Hoffman* en rapporte un exemple notable; *Willis* nous en fournit un second, et nous en avons observé un troisième, que nous allons transcrire ici.

Un homme marié, âgé de 42 ans, doué d'une constitution nerveuse, avait la peau blanche, les cheveux et les yeux noirs; il avait perdu deux de ses frères enlevés par des convulsions; lui-même fut pris, à la suite d'un chagrin violent, mais sans symptômes précurseurs, le 11 avril 1803, d'un état convulsif général, qui se prolongea pendant trois heures : dans les momens de rémission, il se plaignait de nausées, de douleurs d'estomac et d'une sorte de boule qui paraissait rouler depuis l'épigastre jusqu'au col,

où il existait une constriction violente : durant la plus grande intensité des accidens, il y eut perte totale de connaissance. On employa avec le plus grand succès une potion qui contenait un grain d'opium et des frictions sur l'épigastre avec un liniment narcotique.

Ce fait pourrait facilement devenir cause d'erreur ; toutefois l'examen approfondi de cette affection en démontre le caractère; et d'abord elle était héréditaire dans sa famille, puisque deux de ses frères avaient succombé à la violence des accès; il eût peut-être également péri, sans les secours qui lui furent administrés. On doit remarquer, en outre, que les narcotiques, employés sous forme de potion et de liniment calmans, eurent dans ce cas-ci un succès très-marqué, tel qu'ils ne l'obtiennent pas ordinairement dans les affections hystériques, et que l'espèce de globe mobile dont se plaignait le malade ne s'étendait pas depuis la région hypogastrique, mais bien depuis l'estomac jusqu'au col. Un caractère qui rapproche cette maladie de l'épilepsie, plutôt que de l'hystérie, c'est la perte totale de connaissance et de la mémoire, lors de la plus grande intensité de l'accès. Il est encore à noter que cet accès fut unique, et qu'une vive affection morale le détermina. En analysant les symptômes spécifiques de cette maladie, sa cause étrangère à l'empire des organes

générateurs, la terminaison mortelle dont elle a été suivie chez deux parens du malade, et l'absence d'une boule qui semble s'élever de l'hypogastre, on acquiert la conviction que cet ensemble de phénomènes ne saurait constituer l'affection hystérique, qui est véritablement exclusive à la femme, mais bien une attaque d'épilepsie ou de convulsions. C'est ainsi qu'on peut contester le titre de l'observation II d'*Hoffman*.

Observation II, intitulée Hystérie.

Un jeune homme, âgé de 16 ans, d'une taille élevée et d'une forte constitution, doué d'un embonpoint et d'un tempérament sanguin très-prononcés, avec *exubérance* des forces vitales, se plaignait depuis peu d'une douleur vive à l'anneau inguinal, qui livre passage aux vaisseaux spermatiques : de plus, il éprouvait contre son gré de violentes érections, et était obsédé par des désirs lascifs. Bientôt fièvre légère, revenant chaque jour, et se dissipant après plusieurs semaines; la douleur de l'aine reparaît aussitôt la fièvre finie. D'autres accidens, semblables à ceux de l'hystérie, se manifestent : spasmes horribles, s'étendant de la région du pubis jusqu'au dos, à la région précordiale, au cœur, au larynx et même au cerveau, avec palpitations du cœur, étranglement de la gorge, gêne de la respiration, syncope, assoupissement, mouvemens

convulsifs des articulations. Ce paroxisme se reproduisait presque tous les mois; du reste l'appétit était bon, et il existait une constipation rebelle aux purgatifs les plus forts; le pouls, ordinairement vif et fort, était pendant l'accès très-inégal et déprimé. — Après divers traitemens anti-spasmodiques et anti-épileptiques, qui furent infructueux, *Hoffman* conseilla une saignée de six onces presque tous les mois, des poudres nitrées pour diminuer l'orgasme du sang, un exercice doux, et défendit des méditations trop suivies; bientôt le malade fut entièrement guéri (1).

Cette observation est-elle une véritable hystérie? Je n'hésite pas à répondre négativement, parce que la matrice n'existe pas chez l'homme. On m'objectera que les accidens de cette maladie offrent une analogie presque parfaite avec les phénomènes hystériques, tels qu'on les rencontre chez la femme. Je réponds que ce fait isolé prouve seulement qu'on peut observer par fois chez l'homme des symptômes très-analogues aux accidens de l'hystérie, et même presque identiques. Mais combien peu rencontre-t-on d'exemples semblables; et lors même qu'il en existerait un grand nombre, il faudrait encore faire choix d'un autre mot ou plutôt d'une dénomination qui

(1) Obs. II, §. 1, cap. 5, *de Malo hyst.*

fût, au terme d'hystérie, ce que celui de satyriasis ou de priapisme est à l'expression de nymphomanie ou de fureur utérine. De plus, si l'on réfléchit qu'il fut administré à ce jeune homme des remèdes anti-épileptiques et que ses accès observaient dans leurs retours beaucoup de régularité, on sera disposé à considérer cette maladie comme une véritable épilepsie, ou une variété de l'affection épileptique, ou enfin une névrose anomale, et non comme une observation particulière d'hystérie.

Nous croyons, d'après l'analyse raisonnée de ces observations, et des faits qui s'en rapprochent, que l'homme peut ressentir des accidens nerveux et même des mouvemens convulsifs, très-analogues à ceux qui caractérisent l'hystérie, mais qui ne sauraient, malgré leur analogie plus ou moins spécieuse, être identifiés avec les phénomènes propres à cette dernière affection. Ne sait-on pas que la présence des vers dans l'estomac ou les intestins détermine sympathiquement des accidens qui simulent l'inflammation de la plèvre, et qu'on a nommés *pleurésie vermineuse?* Dans ce cas, la maladie essentielle consiste dans l'affection des intestins, et non dans la phlegmasie de la membrane séreuse : de même il se peut qu'une irritation quelconque produise par sympathie des mouvemens convulsifs très-analogues, mais non identiques, aux

phénomènes de l'hystérie. Puisqu'ils ne peuvent dépendre de l'irritation d'un organe qui n'existe pas chez l'homme, on doit les considérer comme des aberrations de la sensibilité ou comme une variété, soit des convulsions, soit de toute autre maladie. Notre but, au reste, n'est pas de prouver *ce que sont* ces maladies qui ont été méconnues chez les individus du sexe masculin, mais seulement de démontrer *ce qu'elles ne sont pas*.

Les accidens que produit un état de continence absolue chez l'homme, sont le priapisme ou satyriasis, le spermatocèle, l'hypocondrie et les aliénations mentales; mais il ne peut occasionner la nymphomanie, ni surtout l'hystérie. Dans tous les cas, il faudrait au moins, comme nous l'avons déjà dit, changer la dénomination. L'hystérie est une affection de l'utérus, et, comme toutes les maladies de cet organe, elle ne peut être observée que chez les femmes. Par la même raison, l'homme seul est exposé aux affections spéciales du testicule, de la verge et de la prostate.

Ce qui ajoute à notre surprise, c'est qu'aucune maladie, parmi celles dont l'homme est passible, ne peut fournir avec l'hystérie une analogie aussi frappante que celle qui rapproche le satyriasis de la nymphomanie : celle-ci aurait, avec plus de vraisemblance, pu être considérée comme

une affection commune à l'homme et à la femme, puisque le priapisme ou satyriasis offre de telles analogies avec l'utéromanie, qu'on serait tenté d'admettre l'identité de ces deux maladies, et cependant la nymphomanie a toujours été regardée comme exclusive au sexe féminin.

N'est-il pas étonnant que l'hystérie, dont l'ensemble (1) des phénomènes ne se reproduit jamais chez l'homme, ait cependant paru, à un assez grand nombre de médecins, susceptible d'affecter également l'un et l'autre sexe? Mais par quelles raisons ou par quel mécanisme la matrice exerce-t-elle sur tout le système nerveux de la femme une influence telle, que les organes génitaux de l'homme n'offrent rien de semblable? Cette différence de réaction ou de sympathie dépend d'abord de l'organisation propre à la femme douée d'une sensibilité beaucoup plus vive; mais elle provient encore davantage de la disposition même de l'utérus, qui tient beaucoup plus intimement à l'économie entière que les organes génitaux de l'homme : situé plus profondément, l'utérus joue un rôle beaucoup plus important; il fournit des écoulemens périodiques, il reçoit le produit de la conception et pourvoit à son développement et à tous les phé-

(1) Le fourmillement qu'éprouve vers l'utérus la plupart des femmes hystériques ne peut exister chez l'homme, etc.

nomènes de l'accouchement, fonctions qui lui sont exclusives. Les organes de la génération ne peuvent être retranchés chez la femme, tandis que l'appareil génital de l'homme, tout extérieur, et dont les fonctions sont bien plus limitées, semble former un système comme isolé, et qui peut facilement être enlevé, ou au moins sans que cette opération compromette nécessairement la vie générale.

Pour fixer l'opinion sur la distinction précise de cette névrose, nous la décrirons d'abord bien isolée de toute complication, ensuite nous la présenterons compliquée avec d'autres maladies; et en appliquant la méthode de l'isolement à ces observations *mixtes*, nous ferons ressortir les phénomènes caractéristiques de l'hystérie et ceux des autres affections qui peuvent la compliquer : plus loin nous exposerons les causes de cette maladie, sa marche, ses différens symptômes, ses anomalies, ses terminaisons et ses complications; nous terminerons par établir le diagnostic et le pronostic de l'hystérie, enfin les différentes méthodes curatives que l'expérience et l'observation conseillent d'y opposer.

Hystérie simple par cause morale.

Une jeune personne âgée de dix-sept ans, d'une forte constitution et d'un tempérament sanguin, joignait à une grande sensibilité de la

franchise et un caractère très-aimant : elle demeurait avec ses parens, qui n'avaient pas pour elle la plus tendre affection.

Un jeune homme, admis dans la maison, fut souvent témoin des peines qu'éprouvait cette demoiselle : il cherchait à la consoler par ces soins et ces attentions qu'inspirent si facilement le malheur et la jeunesse : à ces témoignages du plus simple interêt succédèrent d'autres sentimens, et un amour réciproque en fut le résultat.

S'étant un jour aperçue que son ami prodiguait à une autre dame toute sorte de prévenances, cette jeune personne en ressentit un violent dépit, mais se contraignit. Dès le soir, ses règles, qui coulaient depuis deux jours, s'arrêtèrent ; elle devint d'une pâleur extrême, tous ses traits étaient altérés, et sa physionomie était bouleversée : peu d'instans après elle perdit connaissance, et fut prise de convulsions violentes : tour à tour elle gardait le silence ou poussait des cris, des soupirs et des gémissemens, se comprimait ou se frappait la poitrine ; tantôt elle faisait des efforts pour se mordre ; d'autres fois elle cherchait à déchirer ses vêtemens. Ses yeux étaient convulsifs et souvent recouverts par les paupières, les mâchoires presque toujours fortement rapprochées. Pendant la durée de cet accès la mémoire n'était pas entièrement

abolie, la malade se plaignait d'une boule qui semblait partir de la matrice et s'arrêter à la gorge où elle occasionnait une vive constriction, une sorte d'étranglement. A la fin de l'accès, il se manifesta une émission considérable d'urine limpide. Je fus appelé dès le deuxième jour, et j'annonçai que ces accidens n'auraient probablement aucune suite fâcheuse. Plusieurs accès, peu différens du premier, se succédèrent. J'employai les antispasmodiques et les narcotiques, qui furent sans effet pendant six semaines. Dans les momens de rémission, j'eus occasion de causer seul avec la malade, et j'obtins la confidence de son affection secrète : toutes les fois que j'appelais son attention sur des objets étrangers à son amour, le calme semblait se consolider; mais aussitôt que les circonstances ou son imagination le lui rappelaient, et sur tout lorsque ce jeune homme s'offrait à sa vue, les accès étaient imminens ou même se reproduisaient. Deux mois s'étaient écoulés, lorsque je fis appliquer douze sangsues à la vulve, et bientôt les règles reparurent : dès cette époque, les convulsions diminuèrent sensiblement, et la convalescence fut assurée par les témoignages de tendresse que cette jeune personne reçut de son ami.

Hystérie simple.

Une demoiselle âgée de dix-huit ans, joignait à un tempérament sanguin une très-grande susceptibilité nerveuse. Depuis l'âge de huit ans, époque où elle eut la petite vérole, elle n'éprouva aucune maladie grave et aucun mouvement convulsif.

Un jour, en jouant à l'escarpolette, elle se plaignit d'étourdissemens, de maux de cœur, et rendit les alimens qu'elle avait pris : peu d'instans après, et sans cause connue, elle fut agitée par de légers mouvemens convulsifs qui reparurent le lendemain, mais avec plus de force, et se soutinrent pendant deux jours. Les deux mois suivans furent exempts d'orages, mais bientôt les accès se manifestèrent de nouveau et à des intervalles fort irréguliers.

Avant leur invasion, cette demoiselle était triste, rêveuse, désirait être seule, ne parlait pas : tout lui déplaisait. Elle se plaignait d'abord d'une sorte de frémissement dans la région de l'hypogastre, et ensuite d'une boule qui, du bas-ventre, semblait se porter jusque vers le larynx où elle ressentait un resserrement très-incommode. Peu après, des convulsions générales se déclaraient, accompagnées de cris aigus, de pleurs ou d'éclats de rire non motivés. Le tronc et les extrémités offraient toute sorte de con-

torsions; la malade éprouvait en outre une forte oppression et une sorte de compression vers les hypocondres, une douleur locale vers l'occiput; la tête, les muscles de la face, et surtout des yeux étaient fortement en convulsion : il fallait plusieurs personnes pour la contenir et pour empêcher qu'elle ne se blessât ou qu'elle ne blessât ceux qui voulaient la secourir. Chaque accès durait ordinairement quatre ou cinq heures, et se terminait subitement par l'évacuation copieuse d'une urine très-limpide.

Telle est l'analyse d'un Mémoire à consulter, qui nous fut adressé de la province : le pronostic que nous portâmes sur l'issue probable de cette maladie ne fut pas très-alarmant, mais nous ignorons le résultat des conseils que nous avions proposés.

Souvent une cause très-légère donne lieu au développement de l'hystérie, comme nous le démontre le fait suivant :

Clémentine F**, âgée de treize ans, cheveux et sourcils blonds, d'une constitution délicate, ayant les seins et les parties génitales peu développées pour son âge, sensible et très-irritable, avait joui d'une assez bonne santé jusqu'à l'âge de onze ans. Ce fut à cette époque qu'elle éprouva tout à coup un sentiment de strangulation avec suffocation imminente et palpitations légères. Huit jours après il s'y joignit un hoquet qui se

répéta très-souvent. On combattit ces accidens par l'usage des bains; mais après le neuvième, elle fut prise de convulsions qui revinrent d'abord tous les huit ou dix jours, et par la suite tous les jours.

Le 13 germinal an x, M. M** fut témoin d'un accès qui, au rapport des parens, fut le plus long et le plus violent de tous ceux qu'elle avait éprouvés : en effet, il se prolongea depuis huit heures du soir jusqu'à trois heures du matin.

L'invasion fut subite : la jeune personne tomba tout à coup, et resta sans mouvement et sans parole; il y eut ensuite contraction vive des muscles masséters, grincement de dents, rire apparent, et mouvemens irréguliers de tous les muscles soumis à l'empire de la volonté. Bientôt après, des éclats de rire immodérés se manifestèrent, et furent suivis d'une roideur tétanique des extrémités inférieures, dans laquelle la pointe des pieds était fortement tournée en dedans.

Après quelques instans de rémission, les symptômes devinrent plus violens : le cœur battait tumultueusement, le pouls était plus fréquent, petit et irrégulier. Les contractions musculaires étaient si fortes, qu'à peine trois ou quatre personnes pouvaient contenir la malade; elle poussait par intervalle des cris aigus. Lorsque ses mains étaient libres, elle se meurtrissait violemment; lorsqu'elles étaient retenues, elle cher-

chait à se frapper la tête contre les objets environnans. Les courts instans de rémission étaient marqués par une grande sensibilité : elle embrassait sa mère et la caressait tendrement; mais à ce calme succédèrent bientôt de nouveaux accès, signalés par des symptômes différens, tels que des grimaces et des contorsions ridicules, des mouvemens convulsifs des doigts des pieds et des mains, le resserrement total de l'œsophage, les yeux hagards, la pupille dilatée, tantôt l'impossibilité d'ouvrir la bouche, tantôt celle de la fermer; enfin la perte entière de la sensibilité, et la mort apparente. La respiration n'était plus sensible, et le pouls avait cessé.

Cet état dura une heure, après laquelle toutes les fonctions se ranimèrent insensiblement par l'application de deux synapismes : alors les convulsions recommencèrent avec la même violence; elles cessèrent enfin, et la jeune personne parut calme.

Le lendemain l'attaque fut moins forte, et offrit quelques phénomènes nouveaux. Dans les rémissions elle montrait la plus grande insensibilité aux caresses de sa mère; quelques instans après elle feignait de vouloir l'embrasser, et tâchait de la surprendre pour la mordre. Elle rendit involontairement une grande quantité de vents et d'urine.

Le 15 germinal au soir, nouvel accès moins

long que celui du 14, qui offrit également de nouveaux symptômes : l'écume lui vint à la bouche; elle était d'une extravagance extrême, commandant tour à tour l'exercice militaire et les figures de la danse; tantôt avec une voix douce, tantôt avec un son aigu, d'autres fois rauque. L'accès finit par une sorte d'horreur qu'elle manifesta contre sa mère. Peu après il succéda un raisonnement assez juste et suivi; elle se mit à pleurer, se plaignant de ce que sa mère lui refusait tout, etc.

A force de questions j'appris que cette aversion pour sa mère, qu'elle aimait et caressait si tendrement dans les accès du 13, tenait à ce qu'elle lui avait refusé une montre en or l'avant-veille, après la lui avoir promise. Lorsqu'elle eut obtenu la montre elle se soumit à tout : on lui fit prendre une potion calmante et un lavement avec un gros d'assafœtida. Les accès ne reparurent plus, et la guérison fut consolidée par le séjour à la campagne et un exercice soutenu. (*Journal de Méd., frim. an* XI.)

L'âge de la malade, son extrême sensibilité, et l'époque de la puberté, constituent dans ce cas les causes prédisposantes des accès d'hystérie, qui ont été déterminés par un refus qui contraria trop vivement cette jeune personne.

Hystérie simple.

Une jeune fille âgée de dix-huit ans, d'un tempérammment flegmatique et sanguin, et dont les menstrues coulaient irrégulièrement, fut prise, à la suite d'un refroidissement, d'une toux violente et convulsive : celle-ci calmée, elle ressentit un accès d'hystérie très-prononcé, envies de vomir réitérées, constipation, dysurie, froid des extrémités, palpitations du cœur, battemens des artères de la tête, figure rouge et gonflée. Quand elle recouvrait la connaissance, le pharynx restait étranglé, au point que les alimens et même les boissons ne pouvaient passer. Le pouls était faible et débile. Au bout d'une demi-heure, l'accès revenait, et après une saignée du pied, il y eut une rémission de huit heures; mais bientôt l'orage reparaît avec plus de violence et accompagné de mouvemens *épileptiques* (1) : la déglutition présentait les mêmes obstacles.

Hoffman conseilla des lavemens, des linimens nervins sur la nuque et l'épine, et des pédiluves. A l'intérieur, il prescrivit les antispasmodiques et les diaphorétiques. Tous les accidens étaient dissipés, lorsqu'un écart dans le régime fit craindre de nouveaux accidens : un léger purgatif, non-

(1) C'est-à-dire, convulsifs.

seulement les prévint, mais contribua à l'entier rétablissement de la malade.

Hystérie simple.

Une demoiselle âgée de trente-deux ans, d'un tempérament sanguin, joignait à une constitution assez robuste une vive sensibilité. A vingt-six ans, elle éprouva de la pesanteur dans les hypocondres et à l'épigastre; ses digestions devinrent difficiles : on remédia à ces divers accidens par l'usage des pilules savonneuses, des eaux thermales ferrugineuses, et les sucs d'herbes. A vingt-huit ans, et sans cause connue, mademoiselle D*** fut atteinte d'accès hystériques, caractérisés par le sentiment d'une boule qui semblait partir de l'utérus, remonter à l'estomac, en y développant une vive chaleur, et de là au cou, où elle occasionnait une forte constriction et rendait la respiration difficile et accélérée. Au bout d'un an, ces paroxysmes devinrent plus fréquens, et la susceptibilité nerveuse de la malade augmentant de jour en jour, on réclama les conseils d'un médecin qui employa, sans succès, les antiphlogistiques, un régime adoucissant, puis les antispasmodiques et différens moyens hygiéniques. A la fin de la deuxième année, les paroxysmes étaient accompagnés de perte de connaissance, de mouvemens convulsifs et de renversement du corps en arrière; ils duraient

quelquefois jusqu'à deux heures, et plongeaient la malade dans un état de mort apparente.

Une commère fut appelée, donna des boissons dont la composition était un mystère, et pratiqua vers les parties génitales diverses manœuvres. Mademoiselle D*** ressentit aussitôt dans l'organe irrité une douleur vive qui s'apaisa assez promptement, et depuis lors elle a joui d'une très-bonne santé. Pendant toute la durée de cette affection hystérique, les règles et l'appétit n'avaient point éprouvé de dérangement.

Hystérie compliquée d'Hypocondrie (1).

Une jeune personne, aussi distinguée par sa beauté que par ses vertus, âgée de dix-huit ans, d'une complexion délicate, mais douée d'un esprit pénétrant et d'un caractère très-mobile, fut recherchée en mariage par un jeune homme qui l'avait vue fréquemment pendant une maladie qu'elle venait d'essuyer.

Sa santé, à peine rétablie, fut de nouveau dérangée : dès-lors, douleurs au dos et aux lombes (2), *tremblemens et contractions spasmodiques des*

---

(1) Hoffman, *de Malo hysterico*, obs. 3, p. 59, tom. 2.

(2) Les symptômes caractéristiques de l'hystérie, dans les deux observations qui vont suivre, seront écrits en caractères italiques : les autres symptômes appartiennent à l'hypocondrie.

membres, perte des forces et de l'appétit, constipation, tenesmes, envies d'uriner; bientôt *syncopes*, *sentiment de strangulation*, froid des extrémités, horripilations suivies d'une chaleur incommode, *respiration difficile*, *resserrement spasmodique*, anxiétés précordiales presque constantes; pouls varié, tantôt foible et fréquent, tantôt petit et inégal; *urines limpides*, quelquefois avec un sédiment rouge; sommeil difficile ou nul, augmentation de l'anxiété précordiale; quand elle prenait de la nourriture ou des médicamens, règles peu abondantes, séreuses, âcres et intensité plus grande des symptômes vers l'époque de la menstruation. Plusieurs médecins furent consultés et d'avis différens. Les uns voyaient une fièvre quotidienne : l'amaigrissement considérable faisait soupçonner à d'autres une fièvre hectique; enfin plusieurs accusaient la faiblesse de l'estomac et les flatuosités de l'abdomen. De là l'abus des remèdes stomachiques, carminatifs, nervins, emménagogues, laxatifs, martiaux : elle fut même saignée du pied, mais le mal augmenta. Au bout de trois mois *Hoffman* est appelé : il recherche de suite la cause de la maladie, défend tous les remèdes, recommande, pour boisson ordinaire, le lait d'ânesse, coupé avec les eaux acidules de *Sedlitz;* des lavemens et des frictions sur les lombes; l'exercice sous un ciel serein et pur, surtout en

voiture, et pendant quelque temps la cessation de toute correspondance ou entrevue avec le jeune homme. Il permit ensuite le lien conjugal, qui fut l'époque du retour à la santé. Au bout d'un an, elle devint enceinte; de légers accès d'hystérie qui se déclarèrent pendant les couches, furent bientôt calmés, et depuis lors, la santé se maintint parfaite.

Dans l'observation d'hystérie hypocondriaque que nous venons de rapporter, les symptômes d'hystérie sont les plus prononcés; dans la suivante, au contraire, ce sont les phénomènes de l'affection hypocondriaque qui prédominent.

Une femme célèbre, à la fleur de l'âge, était depuis quelque temps sujette à une affection hystérique très-violente : elle éprouvait des douleurs intolérables vers la cuisse gauche, *des convulsions*, *des anxiétés*, *de la dyspnée*, un hoquet, des inquiétudes, de l'insomnie, etc. Elle ressentait en outre une douleur vers la rate, et portait une tumeur considérable dans l'hypocondre gauche; il s'y joignait des flatuosités, des gonflemens dans l'abdomen et l'utérus, des rots, des borborygmes, des douleurs vagues, des vents dont l'issue soulageait la malade; enfin une constipation extrême.

Tous les moyens antihystériques de la pharmacie furent employés sans succès : on prescrivit ensuite un bon régime, quelques eaux miné-

rales, et surtout celle de *Sedlitz*, et cette affection grave fut bientôt entièrement dissipée. (*Hoffman.*)

Je considère le gonflement ou la tumeur de l'hypocondre gauche comme le résultat du spasme ou des vents qui dilatent quelquefois les intestins d'une manière surprenante, ou enfin comme un engorgement du tissu cellulaire qui environne la rate : il est également possible qu'il ait existé une affection de la rate même ; mais cette opinion me paraît peu vraisemblable : les douleurs de la cuisse étaient-elles rhumastimales ou symptômes de l'hypocondrie ? Je l'ignore (1).

Les caractères de l'hystérie qu'on peut déduire non-seulement des observations précédentes, mais même d'un grand nombre d'histoires particulières relatives à cette maladie, avaient été indiqués déjà par *Astruc* et *Pinel.* Au début de l'accès, *impression sourde que la malade ressent dans la matrice, bientôt resserrement du col et de la poitrine, et sorte de compression circulaire le long des fausses côtes, sentiment d'une boule mobile, qui de l'utérus se porte jusqu'au larynx; souvent mouvemens convulsifs, syncope ordinairement incomplète, lésion partielle de l'ouïe et*

---

(1) Je me borne à ce petit nombre d'observations, me réservant d'en rapporter d'autres à l'appui des opinions que j'émettrai dans la suite de ce travail.

presque toujours de la mémoire pendant la durée des accès.

Mais en décrivant l'histoire de cette maladie, et en traitant du diagnostic, nous acheverons d'en faire connaître les caractères.

CHAPITRE II.

Causes de l'hystérie.

Nous pensons avoir démontré, 1°. que l'utérus est le siége de cette névrose; 2°. que celle-ci peut exister sans que cet organe soit atteint de lésions physiques; 3°. que le système nerveux est seul affecté; 4°. que le mouvement d'ascension ou n'a pas lieu ou est fort borné et vermiculaire; 5°. que les accidens éprouvés au-delà de la matrice sont sympathiques; 6°. enfin, que cette connexion s'établit par les filets du grand sympathiques, et surtout du pneumogastrique. Voyons maintenant de quelles sources provient ordinairement l'hystérie.

On peut distinguer ses causes en disposantes et en déterminantes : mais cette manière de les envisager nous semble peu importante, d'autant que c'est le degré d'intensité d'une cause souvent identique qui la fait considérer comme disposante ou déterminante.

Outre les causes qui provoquent l'hystérie, il faut encore distinguer celles qui en décident les

retours : les mêmes agens, en général, occasionnent l'invasion et les retours de l'hystérie ; mais on en observe qui concourent plus particulièrement à la production de celle-ci qu'à la production des accès. Du reste, nous aurons soin d'indiquer, à mesure que nous examinerons les causes, celles qui ont une part plus active sous l'un ou l'autre rapport.

Quand une femme ou une jeune personne sont disposées à cette maladie, la cause la plus légère suffit pour la déterminer (1). Il convient de se rappeler cette assertion, sans quoi l'on pourrait fréquemment révoquer en doute l'influence très-réelle d'une foule de circonstances, en apparence plus ou moins inertes. Sans doute, plusieurs des agens, ou des occasions que nous citerons comme propres à déterminer l'hystérie, ne la produisent que très-rarement; nous ignorons même si toutes les causes que nous énonçons l'ont réellement produite; mais il nous suffit, pour être autorisés à les indiquer, que leur nature, et une analogie bien constatée, les rendent susceptibles d'un pareil résultat. Les causes de cette affection sont trop variées et trop nombreuses pour que nous omettions d'en référer quelques-unes, par cela seul que nous ne connoissons point d'exemples

---

(1) Voyez l'observation page 17.

où leur influence, quoique bien vraisemblable, ait eu lieu d'une manière évidente. Nous n'avons point vu l'action intérieure ou extérieure des cantharides amener l'hystérie, mais nous savons qu'elle a plusieurs fois occasionné la nymphomanie. D'après l'analogie qui existe entre ces deux affections, on doit penser qu'un agent qui peut plus, peut moins; que les cantharides, qui ont causé dans plusieurs circonstances la nymphomanie, sont également capables de causer l'hystérie.

Nous suivrons dans l'examen des causes de cette maladie la division admise par le professeur *Hallé*, pour les matériaux de l'hygiène.

PREMIÈRE SECTION.

Causes physiques.

La part que peuvent avoir au développement de cette maladie les agens répandus dans l'atmosphère est incontestable.

Une température excessive en froid ou en chaud, une exposition méridionale, un sol aride, des vents brûlans, l'impression d'une forte pluie, d'un froid violent, de l'humidité ou d'un vent très-vif, une exposition prolongée à l'action des rayons solaires, peuvent favoriser l'invasion de l'hystérie, ou en ramener, avec plus ou moins de fréquence et d'intensité, les retours.

On conçoit également le rôle que joueront, à

cet égard, les émanations répandues dans l'atmosphère, surtout quand celle-ci sera très-rarefiée ou circonscrite, et quand les personnes qui y sont exposées seront très-susceptibles; mais cette influence varie suivant la sensibilité des individus et l'idiosyncrasie. La vapeur du charbon a déterminé chez une dame, à laquelle j'ai donné des soins, une hypocondrie très-grave, dont elle a parfaitement guéri. Je présume que cette cause eût pu également produire l'hystérie, si cette dame y avait été disposée.

Je ne pense pas qu'on ait observé cette affection avec un caractère épidémique ou endémique, et je doute également qu'elle puisse être propagée par un principe contagieux, car on ne doit pas considérer comme tel l'empire de l'exemple.

L'exercice concourt efficacement au maintien de la santé; mais l'abus du mouvement, l'extrême fatigue, de longues courses par un temps défavorable, sous un soleil brûlant, etc., la danse, portée jusqu'à une lassitude absolue, des efforts démesurés, les veilles prolongées ou des excès contraires, une vie trop sédentaire, un exercice trop circonscrit, comme les soins exclusifs du ménage, le travail d'une profession exempte de déplacemens, frappent toute l'économie d'une atonie qui forme une disposition plus ou moins prochaine à cette affection.

Un trop long séjour au lit, un grand nombre

de couvertures, un coucher trop mou, effeminé, agissent de la même manière, et impriment en même temps aux organes générateurs une sorte d'éréthisme, une exaltation qui est souvent le principe de l'hystérie.

On peut redouter les mêmes inconvéniens des substances irritantes appliquées sur notre corps, de l'action des synapismes, de l'urtication, des éruptions accidentelles ou de celles produites par l'art, et surtout de l'action des cantharides : on connaît l'influence singulière qu'elles exercent sur les organes urinaires et génitaux, et l'on doit pressentir facilement quels effets peuvent produire leurs préparations chez les femmes disposées à l'hystérie, ou très-accessibles, par suite de leur idiosyncrasie, à l'influence sympathique ou immédiate de ces insectes, surtout quand leur application sera inconsidérée.

Les compressions appliquées à la surface du corps, les ligatures trop serrées, les vêtemens trop étroits, trop lourds, trop légers en exposant à l'impression du froid, les bains tièdes ou chauds, et même froids lorsqu'ils sont trop réitérés, une propreté trop recherchée, des ablutions très-fréquentes, et l'habitude énervante des parfums, coopèrent plus ou moins à la formation de l'hystérie.

Après avoir examiné les agens qui, par leur impression sur la surface du corps, peuvent

présider au développement de l'hystérie, nous allons passer en revue les substances qui, portées dans l'intérieur de notre économie, sont susceptibles des mêmes résultats.

Nous signalerons d'abord, à ce sujet, l'excès ou l'habitude des alimens réputés aphrodisiaques, ou doués d'une excitation spéciale sur l'appareil génital, les truffes, les écrevisses, les champignons, le chocolat aromatisé, les moules, les fraises, les framboises, une nourriture trop succulente, trop variée, les alimens préparés avec force épices ou aromates, les vins recherchés, l'abus des liqueurs alcooliques, un état d'ivresse, la surcharge produite par les alimens, leur mauvaise qualité, et peut-être une abstinence plus ou moins absolue et trop prolongée. En première ligne, nous indiquerons encore les pastilles dans lesquelles on fait quelquefois entrer la teinture ou une très-petite dose de cantharides. Des lavemens composés avec des substances irritantes ont produit, à ma connaissance, une nymphomanie avec mouvemens convulsifs : il est naturel de penser que des lavemens aussi irritans pourraient amener de véritables accès d'hystérie.

On doit placer sur la même ligne l'impression que produisent certains alimens. J'ai connu une dame, en proie à une affection d'autant plus profonde qu'elle était dissimulée, qui était prise

de convulsion hystérique toutes les fois qu'elle déjeunait avec une tasse de café au lait (1).

Non-seulement le trouble de nos digestions, mais encore le dérangement de nos sécrétions, est une des causes qui compromettent le plus souvent notre santé; c'est ainsi que toutes les circonstances qui portent le désordre dans nos principales fonctions, peuvent du plus au moins contribuer à la formation de l'hystérie. On doit distinguer sous ce rapport les causes qui ont une part plus active en raison de leur fréquence ou de leur intensité, et celles dont l'influence est relative à un rapport plus ou moins immédiat avec les organes où siége la maladie.

La transpiration, en général, dont l'exercice régulier entretient la santé, qui, d'autres fois, par un mouvement spontané, forme la crise de nos maladies, les détermine fréquemment aussi, quand son jeu naturel est interverti : telle est une des sources de l'hystérie, et plus souvent encore de ses retours.

Le trouble des fonctions de l'utérus entraîne plus directement encore les affections hystériques : à cet ordre de causes se rattachent le retard du flux menstruel, sa suppression ou rétention, sa diminution, ses anomalies, sa ces-

(1) Chaque fois qu'elle entrait dans une église, elle éprouvait, de retour chez elle, le même accident.

sation spontanée ou accidentelle, tardive ou prématurée, les ménorrhagies sthéniques ou atoniques, les écoulemens leucorrhoïques, leur dérangement, leur âcreté, leur extrême abondance, les blénorrhagies vénériennes ou de nature différente qui peuvent se propager, quoique rarement, dans la vessie et l'utérus, peut-être aussi la rétention de la liqueur spermatique (qui paraît très-abondante chez quelques femmes). Nous rangerons dans la même série un état de pléthore sanguine, produit par le trouble de la menstruation, ou coïncidant avec son cours régulier, l'omission d'une saignée habituelle, enfin des pertes de sang ou hémorrhagies, soit spontanées, soit artificielles. Dans d'autres cas, ce sont des phénomènes différens qui conduisent au même but; tels qu'un embarras gastrique, une surabondance de bile ou de sucs intestinaux, etc., une constipation opiniâtre (qu'on observe fréquemment à la suite des couches, d'un séjour au lit très-prolongé), un dévoiement considérable, l'abus des purgatifs ou l'omission d'une purgation habituelle, enfin la suppression d'un exutoire, ou une suppuration excessive; mais plusieurs de ces causes n'agissent que très-indirectement, ou d'une manière secondaire, et seulement en diminuant l'énergie des forces vitales et en exaltant d'autant la sensibilité générale, et particulièrement celle de la matrice.

Il est également probable que diverses maladies, qui ont leur siége aux parties génitales ou aux environs, peuvent participer au développement de l'hystérie : à ce sujet, nous mentionnerons les affections dartreuses situées au pourtour de l'anus, au pli de l'aine, sur les grandes lèvres, et même à l'intérieur, peut-être aussi certains catarrhes du vagin ou des ascarides placés au sphincter du rectum ; quant aux affections plus graves de l'utérus, telles que les engorgemens, les squirrhes, les ulcères et cancers de cet organe, c'est une complication, une terminaison assez rare de l'hystérie, et non le principe. La grossesse ne nous paraît pas incompatible avec les convulsions hystériques ; mais nous pensons qu'elle ne les produit que rarement, parce qu'on doit distinguer les mouvemens convulsifs, occasionnés par un accouchement difficile ou douloureux, des mêmes accidens produits par l'irritation nerveuse de l'appareil génital chez les jeunes vierges ou les jeunes veuves, ou même chez les femmes mariées.

Si nous examinons, sous ce rapport, l'impression qu'exercent les tempéramens, nous verrons que les femmes ou les jeunes personnes qui ont reçu en partage un système nerveux très prononcé, ou une vive sensibilité nerveuse, et un tempérament éminemment sanguin, y sont fort disposées. Celles qui ont le teint brun ou très-co-

loré, les yeux noirs et vifs, la bouche grande, les dents blanches, et les lèvres d'un rouge incarnat les cheveux abondans, le système pileux fourni et couleur de jais, dont les caractères sexuels sont prononcés, et chez qui les menstrues coulent abondamment, jouissent encore de cette fâcheuse prérogative.

La puberté et le terme de la vie sexuelle, désigné sous le nom d'époque critique, disposent au développement de l'hystérie ; mais l'état de continence volontaire ou involontaire détermine très-fréquemment cette maladie. On doit distinguer la continence relative et celle qui est absolue : pour telle femme, la privation totale des plaisirs vénériens est plus facile qu'un usage modéré des mêmes habitudes pour telle autre. Chez un certain nombre, il ne suffit pas que le but de la nature soit rempli, il faut, en outre, que le vœu du cœur soit exaucé ; c'est ainsi qu'on voit des femmes mariées, jouissant des droits de l'hymen, qui éprouvent des accès d'hystérie parce qu'elles sont sous l'empire d'une inclination qui n'est pas satisfaite. On distingue, en outre, la continence première, celle des jeunes vierges, qui diffère de la continence secondaire, qui suit la jouissance : telle est celle des jeunes veuves, des femmes séparées de leur mari, ou qui, quoique mariées, vivent dans une sorte de célibat.

Mais des causes très-différentes, et même opposées, peuvent donner lieu à cette maladie. C'est ainsi qu'elle est quelquefois produite par l'onanisme, ou même par l'abus des plaisirs vénériens, qui, en énervant la constitution de certaines femmes, en exaltent la sensibilité, et les placent dans la situation physique et morale la plus propre à l'invasion des affections hystériques.

C'est donc une opinion trop générale que celle énoncée dans l'*Encyclopédie méthodique*, art. Hystérie. L'auteur prétend que les femmes mariées, que celles qui jouissent des plaisirs de l'amour, et surtout les filles publiques, ne sont jamais affectées d'accès hystériques. Il est bien vrai qu'une continence absolue et involontaire est la cause la plus ordinaire de ce désordre; mais les affections morales, celles principalement qui donnent les émotions les plus vives, et les autres agens déterminent quelquefois ces accidens chez les femmes qui jouissent des plaisirs de l'hymen : mon observation particulière me porterait tout au plus à croire que l'hystérie est alors moins prononcée.

DEUXIÈME SECTION.

Causes morales.

Mais une considération importante, et qui se rattache intimement à notre objet, c'est l'in-

fluence qu'exerce sur la production de l'hystérie la vie sexuelle, considérée particulièrement dans ses phénomènes moraux. Cette influence ne peut être contestée, puisque l'hystérie n'existe presque jamais (ou peut-être jamais) avant le premier développement de la vie sexuelle, ni au-delà de sa cessation, vulgairement nommée *époque critique*.

On connaît les phénomènes généraux et sympathiques que provoque cette révolution locale qui a lieu dans l'utérus, et qu'on n'observe pas ou qu'imparfaitement chez les personnes du sexe à qui la nature a refusé cet organe.

La femme dès-lors est assujettie à un tribut mensuel; ses formes se développent, sa voix change, ses facultés intellectuelles s'agrandissent; elle éprouve plus impérieusement de nouveaux besoins : plus ils seront prononcés, plus, toute chose égale d'ailleurs, on devra redouter l'invasion de cette névrose, si le vœu de la nature n'est pas rempli, si le besoin de l'organisation n'est pas satisfait.

Ce sentiment qui appelle l'un et l'autre sexe à se rapprocher et à s'unir intimement est une loi commune, un résultat constant de notre organisation : maîtrisé par la volonté, et en général, par l'empire de notre entendement, ce sentiment forme le premier anneau de la vie sociale et de notre bonheur; mais quand ce besoin est trop

impérieux, lorsqu'il devient une passion dominante, il fait craindre non-seulement pour la santé, mais encore pour la félicité individuelle et pour l'intégrité de notre plus bel apanage, pour nos facultés mentales. La continence, au contraire, est un état contre nature, et qu'on ne doit prolonger que le moins possible chez les personnes du sexe, lorsque le désir d'une union intime est fortement prononcé, ou quand le tempérament est très-développé.

Diverses circonstances morales peuvent favoriser, retarder ou empêcher le développement de l'hystérie. Dans la première série on place une vive sensibilité morale, une constitution délicate et nerveuse, une éducation soignée, un ensemble de goûts et d'habitudes qui portent les jeunes personnes à s'attacher à tous ceux qui les entourent; quand leur susceptibilité a été trop ménagée, lorsqu'elles ont été entourées de soins trop recherchés, ou prévenues jusque dans leurs moindres désirs, elles éprouveront souvent une forte commotion par suite d'une contrariété légère, et dont l'invasion de l'hystérie sera quelquefois le résultat, surtout s'il existe chez elles une disposition plus ou moins prononcée à cette maladie.

Transportées dans une autre sphère, dans le monde, ou même au sein des sociétés les plus choisies, de combien de prestiges enchanteurs

elles sont environnées! combien de genres de séduction viennent les assaillir! Les soins affectueux qui leur sont prodigués, les éloges offerts comme autant de témoignages de bienveillance, la perspective des avantages qui les attendent, du plaisir qui leur est promis, du bonheur qu'elles doivent répandre, les promesses séduisantes, les caresses trompeuses, flattent, excitent, exaltent leurs sens; le besoin de la reconnaissance vient les tromper. A ce premier sentiment d'une âme douce et compatissante succède le premier élan d'un cœur sensible : heureux moment d'innocence, et bientôt d'ivresse! La pudeur éclate, le visage se colore au doux mot d'amour. Ignorante, incertaine, la jeune vierge fait un nouveau pas : ici une carrière inconnue s'ouvre devant elle ; ce n'est plus un enfant timide qui s'avance les yeux baissés. Ferme de l'appui qu'elle trouve dans la tendresse de ses parens, elle marche sans regrets et sans remords à l'autel.

Telles sont beaucoup de jeunes personnes qui, favorisées par un concours de circonstances heureuses, échappent au danger dont elles étaient menacées.

Un autre spectacle vient frapper nos yeux : leur jeune compagne, douée d'une sensibilité moins douce, mais d'une imagination plus active, a suivi une route différente : elle a franchi

la barrière d'un pas léger, en s'étourdissant sur la pente; et des bras d'une mère bienveillante, mais facile à tromper, elle a passé dans ceux d'un amant. Bientôt frustrée dans son espoir, ou arrachée à l'objet de son affection, elle ne peut renoncer à des liens malheureusement contractés, aux plus douces habitudes, à ces illusions trompeuses d'une passion dominante, dont on a dit si justement :

Amour, douce folie,
Épisode trop court du roman de la vie.

Dès-lors un trouble sensible se manifeste : la nature, trompée dans son attente, souffre; le désordre de l'organisation est renforcé par le trouble moral; la santé s'altère, des accidens se déclarent, et déjà l'hystérie est imminente.

D'autres, en plus grand nombre, arrivent souvent aux mêmes conséquences par une route différente. Tantôt une circonstance imprévue, tantôt un tendre attachement ou une passion violente, éveillent des besoins qui existaient sans être sentis, ou du moins sans être impérieux, et qui dès-lors deviennent prédominans.

D'autres fois c'est l'empire des organes reproducteurs qui provoque le désordre, sans nulle participation des facultés mentales; si le besoin de la nature était satisfait, l'orage serait bientôt dissipé. Mais qui ne sait à combien d'entraves

les jeunes personnes sont exposées? Souvent c'est un aveu qu'elles n'osent faire, et qu'elles voudraient qui leur fût arraché ; dans d'autres cas, leur inclination n'est pas partagée. Le sentiment le plus naturel, du moins à cette période de la vie humaine, le plus général, le plus énergique, et qu'on se plaît tant à communiquer, doit être concentré, dissimulé ou étouffé ; fréquemment il faut cacher le cœur le plus épris, la sensibilité la plus aimante, l'amour le plus passionné, sous le voile de l'indifférence ou de la simple amitié, sous le masque d'une prévention ou d'une haine simulées. Dans d'autres cas, elles sont forcées de répondre par une apparente insensibilité aux expressions les plus passionnées, aux instances les plus pressantes, et quand au fond de leur âme elles approuvent le langage d'un amour qu'elles partagent, leur bouche doit démentir leurs affections les plus chères, et donner le change sur l'état véritable de leur cœur.

Si leur secret s'est trahi, ou s'il leur a été surpris, d'autres obstacles les attendent encore. Elles connaissent la sollicitude de leurs parens ; mais elles savent aussi quelles barrières vont leur opposer les préjugés ; d'autres fois la raison, les convenances sociales ou des principes trop sévères.

L'époque de la puberté est donc celle des affections hystériques. Jusqu'alors les organes de

la génération n'ont joui, en quelque sorte, que d'une vie végétative, ou mieux, organique; mais quand leur énergie vient à s'éveiller, quand un sentiment naturel fait désirer de nouveaux rapports, l'influence de ces organes est toute-puissante chez les personnes du sexe, et imprime à tout leur être des modifications surprenantes. Ces effets sont surtout remarquables chez les jeunes personnes qui sont vives, ardentes, colères; celles encore qui sont très-pensives ou mélancoliques sont particulièrement exposées aux atteintes de cette névrose.

Sans doute l'époque de la puberté varie quant à son développement : on peut le retarder, ou régulariser son influence par des moyens physiques et moraux conformes à la saine morale, à l'intérêt individuel et à l'ordre public.

L'époque critique est encore une condition favorable au développement de cette maladie; et nous verrons parfois les effets de cette révolution se prolonger long-temps après la cessation du tribut périodique.

Mais outre cet état moral qui tient à deux périodes bien remarquables dans la carrière des femmes, toutes les affections vives de l'âme peuvent devenir causes déterminantes, ou plutôt occasionnelles de l'hystérie : je dis occasionnelles, parce que le plus souvent les émotions vives de l'âme ne sont que l'occasion qui donne naissance

à la maladie, et celle-ci ne se développerait pas, si une disposition particulière n'avait ainsi secondé leur action.

Nous allons suivre l'influence des causes mentales, d'abord dans les sens, puis dans les affections morales, enfin dans les facultés intellectuelles.

La vue d'un objet désagréable, surtout s'il existe une prévention forte, ou même une véritable antipathie; ainsi la vue d'un aliment, d'une substance médicamenteuse, de certains insectes ou animaux, un spectacle d'horreur ou d'épouvante, peuvent produire l'hystérie; mais dans ce dernier cas et dans quelques autres, les sens n'agissent que comme moyens de transmission; c'est le sentiment d'indignation ou d'effroi qui détermine la maladie.

D'autres fois un sentiment tout contraire amène le même résultat; tel le plaisir qu'éprouvent quelques femmes à la vue de l'homme dont elles sont éprises, à la vue des objets qui leur rappellent leur tendresse, ou qui excitent leurs regrets ou leur colère.

Le son d'un instrument, comme l'harmonica, etc., le bruit que fait une scie appliquée sur certaines matières très-compactes, comme la pierre, le marbre, etc., une forte détonnation, la continuité d'un même bruit, conduisent parfois au même résultat. Telles sont encore les

conséquences que peuvent entraîner les impressions exercées sur le sens de l'odorat. On a vu des femmes vaporeuses éprouver des migraines violentes, des suffocations et des convulsions véritables, toutes les fois qu'elles étaient forcées de respirer pendant quelque temps des odeurs antipathiques. Ces considérations sur les odeurs n'avaient point échappé à nos devanciers : suivant *Hygmor*, les substances odorantes, comme le musc, la civette, etc., déterminent l'affection hystérique : *suaveolentia moschus*, *zibetha*, *etc. affectionem hystericam promovent.* On peut en dire autant de l'action, dans quelques cas, des odeurs fétides, quoiqu'on les ait considérées comme moyens curatifs.

On connaît également le trouble qu'excitent en nous le langage des yeux, le chant, la voix d'un être chéri ; ne sait-on pas quelles émotions provoque le toucher, quel égarement inspire souvent un tendre baiser : c'est par un mécanisme analogue qu'agissent diverses circonstances de la vie ; l'habitude des promenades publiques, des spectacles, des bals, des concerts, des réunions nombreuses, la vue de tous les objets relatifs au luxe, aux arts : ce sont autant de sources fécondes d'illusions, d'autant plus dangereuses, qu'elles sont plus séduisantes.

Tantôt les organes des sens ou les sens moraux, tantôt les sens physiques, c'est-à-dire les

organes génitaux, indépendamment de toute influence morale, font naître le désir et le besoin impérieux de l'union des sexes, ou les accidens même de l'hystérie. Cet effet sera surtout sensible chez les jeunes personnes dont les organes génitaux seraient exposés à une excitation locale, ou qui auraient contracté de funestes habitudes. Dans le plus grand nombre des cas, il existe une action simultanée ou une influence réciproque des sens physiques et des sens moraux : nul doute qu'une telle exaltation ne dispose plus puissamment, et ne donne lieu à tous les accidens d'une hystérie très-prononcée.

Le plus communément, les causes mentales ne donnent pas lieu aux phénomènes hystériques, tant que la femme n'y a pas été préparée par les circonstances énoncées dans les paragraphes précédens : s'il suffisait, pour déterminer les accidens de l'hystérie, d'une impression morale, brusque et pénible, on les verrait beaucoup plus souvent qu'on ne les observe ; toutefois les affections morales les plus tristes y donnent fréquemment naissance ; mais la cause la plus ordinaire, la plus puissante et la plus durable, c'est le sentiment de l'amour, surtout quand la jeune personne est obligée de le dissimuler, et d'en concentrer en elle-même les expressions et jusqu'au moindre témoignage, ou jusqu'au plus léger indice. Quand à l'aveu d'une inclination succède

un tendre retour, quand surtout il s'y joint l'espoir d'une union légitime ou l'accomplissement des vœux les plus ardens, on voit bientôt diminuer l'intensité des accidens hystériques et la fréquence des accès : ceux-ci se rapprochent au contraire, ou acquièrent une nouvelle vigueur, s'il éclate entre les deux individus un mouvement de jalousie ou des contrariétés, et spécialement lorsque l'espoir d'une alliance désirée se trouve éloigné, affaibli ou anéanti. Mais cette névrose touche à son terme, si, dans une douce union, les vœux de la nature et du cœur sont également remplis : un veuvage prématuré, des séparations trop longues ou trop fréquentes, un abandon plus coupable et plus cruel, des peines domestiques qui blessent le cœur et l'amour-propre d'une femme sensible, la placent de nouveau dans les circonstances les plus propices à l'hystérie, et soumettent souvent les jeunes femmes à l'empire de cette maladie.

Un chagrin produit par une cause étrangère à la passion de l'amour conduit quelquefois au même résultat, mais plus rarement : il sera plus susceptible de provoquer le retour d'un accès que d'entraîner l'invasion première de l'hystérie; il en est ainsi des autres affections de l'âme, terreur, emportement, etc. On peut encore relater ici les regrets, les chagrins qu'éprouvent d'autant plus les femmes à leur époque critique,

qu'elles sont plus affectées de la perte des illusions de la jeunesse ou de l'âge adulte.

De toutes les fonctions de l'entendement, l'imagination est celle qui d'abord dispose le plus à cette maladie, et qui par suite la détermine le plus souvent : en examinant l'influence des autres causes, on s'assure presque constamment qu'elle a été préparée ou secondée par cette faculté puissante. Tous les agens que nous avons considérés comme pouvant influer sur les organes des sens ont une action incontestable sur l'imagination ; mais on doit en outre placer ici l'influence si prononcée des lectures lascives, celle des romans et des livres érotiques, de ceux même dont le but est moral, mais qui offrent la description animée des passions amoureuses, les conversations qui roulent sur cet objet, quand surtout elles ont lieu entre des personnes du même âge et de sexe différent; l'habitude des promenades publiques, des spectacles, des bals, des concerts, des réunions nombreuses, des repas splendides, enfin la culture prématurée ou trop continue des sciences et des beaux-arts, qui agit puissamment sur l'imagination, surtout en multipliant les rapports entre les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe.

La mémoire, en reproduisant à l'esprit de la jeune femme les traits de son amant, ses discours et ses caresses, ou en offrant à la jeune vierge

des images voluptueuses, des tableaux lascifs, des expressions brûlantes, peut également influer sur l'invasion de cette névrose.

Enfin elle est quelquefois provoquée par une sorte d'imitation. « Une demoiselle était en proie » à un accès d'hystérie ; la servante de la maison, » entrant dans la chambre au moment où sa » maîtresse fut atteinte de convulsions, tomba » aussitôt dans le même état ». (ALIBERT, *Nouv. Élém. de Thérap.*, t. II, p. 32.) Je pourrais citer plusieurs exemples analogues ; je me borne au fait suivant : Une jeune hystérique, au moment de l'accès, était entourée de plusieurs dames ; dès le soir, deux de celles-ci furent affectées de la maladie qu'elles avaient observée le matin chez leur amie : elles n'avaient pas eu auparavant la moindre atteinte de cette névrose. La communication provient, dans ce cas, d'une part, du penchant qui nous porte à l'imitation ; de l'autre, de la frayeur que cause la vue d'une personne en proie à de pareils accidens. C'est sans doute le spectacle moins effrayant qu'offre l'hystérie qui la rend moins susceptible, que l'épilepsie, de la contagion produite par l'exemple.

Mais, outre les causes de la maladie, il faut encore distinguer celles des accès.

Causes des Accès.

Lorsqu'une femme ou une jeune personne a déjà ressenti plusieurs accès d'hystérie, ceux-ci peuvent se reproduire plus ou moins fréquemment, et avec une intensité variée. On doit distinguer les causes des accès de celles qui ont produit en premier lieu l'invasion de la maladie; bien que les causes de ceux-ci soient en général les mêmes que celles qui ont provoqué la première atteinte de l'hystérie. Nous ferons observer que le plus ordinairement ces dernières devront être plus puissantes que les autres, parce qu'il est plus facile de renouveler un accident, vu que l'économie y est disposée, que de produire un premier désordre, auquel parfois l'organisation n'est nullement préparée : cette distinction des causes de la maladie et de celles des accès est conforme à l'observation. Une jeune personne, d'un tempérament ardent, conçoit pour un jeune homme une passion violente, qu'elle est obligée de dissimuler, et ressent par suite une première atteinte d'hystérie : quelques autres succèdent spontanément, mais à des époques éloignées, et en l'absence de l'objet aimé. Bientôt les circonstances viennent à changer; elle se rencontre fréquemment en société avec le même individu, et chaque fois elle éprouve une nouvelle attaque. N'est-il pas évident que

son tempérament, son amour et l'état de continence ont produit la maladie, et que les accès en sont renouvelés par la vue du jeune homme?

Si on désire un exemple plus tranchant, on le trouvera dans l'observation suivante.

Une jeune femme devint hystérique peu de temps après la mort de son mari : les accès étaient en général peu rapprochés, et aucune cause morale n'y donnait lieu. Au bout de deux ans, elle fit connaissance d'un homme qui ne répondit pas à ses vœux, et chaque fois qu'elle le voyait, elle était certaine d'éprouver, de retour chez elle, un paroxysme d'hystérie.

Dans ce cas, la cause de la maladie diffère de celle des accès.

On a vu la saignée ramener les accès hystériques; mais je crois que leur retour, dans ce cas, était plutôt dû à l'impression morale qu'à la douleur physique ou à l'effusion du sang; toutefois, dans quelques cas, la saignée imprime une commotion vive au système nerveux, et peut alors opérer par son influence physique le retour des accidens.

CHAPITRE III.

Siége et principe de l'Hystérie.

Passons maintenant à l'examen du siége et de la cause interne ou immédiate de cette affection.

Si l'on cherche à connaître quel est le siége de

cette maladie, et quel dérangement des organes de la femme produisent les phénomènes de l'hystérie, on est bientôt convaincu que l'utérus est le siége de cette névrose, et qu'il existe vers cet organe une irritation, un spasme, qui se fait le plus souvent sentir aux malades elles-mêmes, et qui est indépendant d'une lésion organique ou d'une altération de tissu : *passio hysterica sæpè oritur, ubi nullum omninò uteri vitium organicum adest, quam tamen causam in utero hærere ipsæ sentiant ægræ et fateantur.* Pendant les accès d'hystérie, la main placée sur l'hypogastre reconnaît un mouvement vermiculaire, qui se fait également sentir au doigt introduit dans le vagin.

Les accidens qui se manifestent hors de l'utérus sont produits par une action sympathique.

Ce sont les nerfs de cet organe qui influent sur tout le système nerveux de l'économie. Dans un petit nombre de circonstances, le système nerveux général peut être affecté primitivement, et modifier à son tour l'action nerveuse ou la sensibilité de l'utérus. Quand la maladie est produite par l'énergie du système générateur, on pourrait présumer que la présence d'une liqueur spermatique très-abondante provoque le spasme de cet organe, et par suite, celui de tout le système nerveux général. Ce qui semble confirmer notre opinion, c'est l'extrême fréquence de l'hystérie

chez les femmes dont l'imagination est très-lascive, ou le tempérament utérin très-développé, et la guérison qui résulte presque toujours de l'union des sexes.

Ne sait-on pas qu'une pratique infâme, *clitoridis titillatio, id est, uteri secretio,* dissipe le plus souvent les accès? Mais lorsqu'il existe une inclination contrariée, et qui s'était manifestée avant le développement des accidens de l'hystérie, il est très-probable alors que le moral a été primitivement affecté, et que le système nerveux général a influé sur celui de l'appareil génital, et a produit ainsi l'affection hystérique : dans ce cas, la pléthore spermatique peut exister, mais elle est consécutive. De même, quand les anomalies de la menstruation, et surtout la suppression des règles, ont amené cette névrose, on peut présumer que le reflux du sang irrite tous les nerfs de l'économie; car souvent les symptômes de la turgescence sanguine surviennent vers la tête ou la poitrine, et l'affection de l'utérus n'en est que la conséquence.

CHAPITRE IV.

HISTOIRE DE L'HYSTÉRIE.

Considérations préliminaires.

Cette maladie fut connue dans les temps les plus reculés : il paraît qu'elle est devenue plus

fréquente depuis les siècles derniers, et surtout depuis quelques années (1); plus commune dans les grandes villes que dans celles d'un rang secondaire, quand surtout les mœurs, les besoins et les coutumes n'y sont pas les mêmes que dans les cités très-populeuses. Elle est presque inconnue dans les pays peu ou point civilisés, et rare dans les campagnes, où cependant on l'observe quelquefois : ce que cette névrose perd en fréquence parmi les villageoises, elle le recouvre du côté de l'intensité; en effet, si les accès d'hystérie sont plus rares parmi les femmes de la campagne, ils sont en général beaucoup plus forts que ceux qu'on observe à la ville, parce qu'alors la maladie tient moins à la sensibilité exaltée qu'à l'énergie de la constitution, à la force surabondante du tempérament utérin, ou au désordre des évacuations sanguines; rarement elle est produite dans les campagnes par les affections morales ou par l'empire d'un amour contrarié. Un autre fait tend à prouver que l'hys-

(1) Cette opinion n'est pas générale; on peut croire au contraire, a dit un médecin fort instruit, que l'hystérie est moins fréquente depuis ces temps modernes, parce que la révolution, en imprimant aux genres nerveux de vives secousses, les a fortifiés, et parce que la diminution des fortunes a obligé beaucoup de femmes à des occupations plus actives : cette assertion me semble plus ingénieuse que fondée.

térie ne dépend pas toujours des vices de l'éducation, de l'exemple pernicieux ou de la dépravation des mœurs : j'en ai observé des symptômes très-prononcés chez une jeune aveugle, élevée par des religieuses; et dans les principes de morale que professent ces femmes respectables il semblait que l'organisation s'était développée chez elle avec d'autant plus d'énergie, que la nature ne faisait que peu de frais du côté des facultés mentales. En effet, dès l'âge de 11 ans, son physique était aussi avancé qu'il l'est ordinairement chez les autres femmes à 20 ou 25 ans, et dès cette époque, elle fut très-abondamment réglée. A l'aide d'un régime peu restaurant, de l'usage de quelques bains, des boissons réfrigérantes, d'un exercice soutenu, et des occupations mécaniques, on parvint à faire une diversion favorable, et à calmer les accidens que cette jeune personne éprouvait.

Marche de la maladie.

Cette affection présente dans sa marche beaucoup d'anomalies : et d'abord elle varie quant à ses causes, à son intensité, à la rapidité de son développement, à la succession progressive des paroxysmes, à sa durée, à sa résistance aux moyens curatifs, à sa terminaison, enfin à ses complications diverses; et de plus, les accès hystériques, considérés isolément, varient par leur rapproche-

ment, leur longueur et leur intensité; car, depuis le symptôme intermédiaire entre l'état de santé parfaite et l'atteinte d'hystérie la plus légère et la plus rapide, jusqu'aux accès portés au plus haut degré de violence, de durée et de fréquence, les nuances et les variétés sont infinies.

Outre ces différences générales, il existe encore des modifications relatives aux individus : l'âge, le tempérament, les habitudes physiques et morales, la nature particulière de la cause, la sensibilité spéciale, modifient, dans quelques cas, les phénomènes hystériques : de cette source dérive la différence des accès et de la maladie considérée en elle-même. Ou l'invasion est subite, et dès le principe ceux-ci parviennent au *summum ;* ou bien l'hystérie se développe par degrés, la sensibilité paraît se monter insensiblement à ce point d'énergie nécessaire au développement des accès : dans ce cas, on peut observer plus facilement et les préludes et les différens stades de la maladie (1).

Symptômes précurseurs.

Les symptômes précurseurs existent ordinai-

(1) Pour qu'on puisse prononcer qu'il existe une affection hystérique, ou intituler ainsi une observation, il faut un ensemble de phénomènes qui ne permette pas de doute sur l'existence de la maladie, et non pas seulement quelques symptômes nerveux isolés, peu prononcés ou passagers.

rement quand la cause agit par degrés, comme on l'observe fréquemment chez la jeune fille qui reçoit les premières impressions, éprouve le premier sentiment, et ressent en elle-même un trouble dont elle ne peut se rendre compte : bientôt elle devient craintive, dissimulée, incertaine; sa sensibilité s'exalte ; elle cherche la solitude; ses idées sont d'abord vagues, errantes; par la suite elles se fixent, se concentrent sur un seul objet : en vain elle veut en éloigner l'image, le souvenir ne peut s'effacer de son esprit pendant la veille, et des songes durant la nuit le lui retracent encore. Le sommeil est souvent interrompu, la santé s'affaiblit; la pâleur succède au coloris, à l'éclat de la fraîcheur; des maux de tête se manifestent de temps à autre; il s'y joint des vertiges, des engourdissemens dans les membres, des bâillemens le plus souvent interrompus, des pandiculations, des alternatives de rougeur et de pâleur, des palpitations, des angoisses; des instans de délire, ou plutôt d'absence. Les malades pleurent involontairement ou jettent des éclats de rire; quelquefois elles chantent ou tiennent momentanément, et comme par distraction, des propos incohérens : elles sont ordinairement tristes et rêveuses. D'autres phénomènes précurseurs, mais analogues, se remarquent quand la cause dépend d'une affection morale différente, dont l'impression n'a été ni très-forte

ni très-brusque, de l'approche des règles ou d'un dérangement dans le flux menstruel.

Souvent la maladie avorte dès le principe; dans d'autres cas, elle ne parvient qu'à son premier stade ou au second; parfois elle franchit le troisième degré. Ces variations tiennent à l'intensité et à la durée de la cause, qui peut être fort légère ou très-prononcée, à une disposition favorable ou contraire dans l'organisation individuelle, et enfin aux résultats divers des moyens curatifs mis en usage; il ne faut donc pas conclure de ce que nous suivons la marche de la maladie dans toutes ses périodes, qu'elle présente constamment ce *summum*, ce *nec plus ultrà* d'intensité chez toutes les personnes du sexe qu'elle affecte; mais il importe, pour en donner un tableau exact, de l'observer dans son ensemble comme dans ses détails, et de suivre le développement progressif de ses accès les moins prononcés comme les plus intenses.

Premier degré.

Nous distinguons des stades dans l'ensemble et la succession des phénomènes hystériques, quoique la ligne de démarcation ou la transition d'un degré à l'autre soit souvent imperceptible. Il faut en outre remarquer que la division de l'hystérie en trois degrés appartient plutôt à l'intensité de la maladie qu'à la succession des phénomènes;

que les trois degrés sont plutôt trois variétés de la même affection que trois périodes qui se succèdent, quoique cette dernière circonstance puisse aussi arriver quelquefois.

L'hystérie peut monter de suite au deuxième ou au troisième degré, sans avoir aucunement parcouru les intermédiaires, suivant l'intensité ou la multiplicité des causes et les dispositions du sujet : cette névrose existe; elle est même prononcée lorsque, par une des causes désignées, les femmes éprouvent le sentiment d'une boule que les modernes appellent *globe hystérique*, une impression sourde et un mouvement obscur vers la matrice, le resserrement du thorax et de la gorge, une sorte de suffocation. Ce globe est le produit d'une irritation nerveuse : les malades le comparent ordinairement au sentiment ou à la gêne que leur ferait éprouver un corps étranger, une arête, un morceau de viande engagés dans la gorge. Il s'élève communément de la région qu'occupe la matrice, et cet organe est probablement lui-même le point de départ : il semble suivre le trajet du nerf *trisplanchnique* ou *grand-sympathique*, et le parcourir par un mouvement oscillatoire, monte et descend un nombre de fois indéterminé : c'est là ce que les anciens, *Hippocrate* lui-même, j'en excepte *Galien*, regardaient comme l'ascension de la matrice.

De l'utérus, ce globe, qui s'accompagne ordinairement d'un sentiment de froid glacial ou d'une chaleur plus ou moins vive, se porte le long de l'abdomen vers l'estomac, traverse la poitrine, et s'avance jusqu'au col, où il gêne fortement la respiration. Ce phénomène constitue un des signes caractéristiques de cette névrose, mais n'est point exclusif aux personnes du sexe, puisqu'il existe parfois chez l'homme; dans ce dernier cas, il n'est ni aussi fort, ni aussi constant que chez la femme, et commence presque toujours à l'épigastre, loin de la région hypogastrique (1). Souvent l'abdomen est en même temps déprimé, tendu; les malades accusent le sentiment d'un cercle qui comprimerait les fausses côtes. Il existe fréquemment aussi une douleur locale très-circonscrite, qu'on a nommée *clou hystérique*, qui fait éprouver tantôt la douleur d'une aspérité qu'on enfoncerait dans les chairs; d'autres fois, un tiraillement très-incommode. Bientôt le ventre se gonfle, ainsi que la poitrine et le col; le visage rougit et pâlit alternativement; les extrémités se réfroidissent par suite des anomalies de la chaleur. Le pouls devient petit, irrégulier, tandis que les bat-

(1) Pourrait-on expliquer ce globe par la contraction successive des fibres musculaires du canal intestinal et du pharynx?

temens sont grands et forts vers la tête ; les palpitations du cœur sont parfois précipitées; dans d'autres cas, elles sont faibles.

La digestion est facilement troublée dans le moment d'un pareil orage : ainsi, chez plusieurs malades, la déglutition est souvent difficile, et par moment tout-à-fait impossible. Quelquefois il survient des nausées, des vomissemens bilieux ou alimentaires, ou bien il existe un goût d'œufs pourris; mais, le plus ordinairement, les fonctions digestives sont peu dérangées; et, dans l'intervalle des accès, elles s'exécutent fort bien. A la fin du paroxysme, il s'écoule fréquemment par le vagin une liqueur muqueuse ou spermatique; l'urine coule en abondance ; elle est alors limpide, inodore, et même insipide. Ces différens caractères de l'urine sont très-remarquables, et ont fait reconnaître des affections nerveuses qui simulaient d'autres maladies.

L'éternuement annonce parfois la fin des accès, surtout quand ceux-ci ne sont pas très-prononcés : leur retour s'annonce chez plusieurs hystériques par divers symptômes nerveux, tels que le sentiment du globe, des spasmes, des resserremens au larynx, des suffocations instantanées, une douleur à la région de l'estomac, ou la dépression spasmodique de l'épigastre, etc.

Ce qui caractérise le premier degré, c'est la

lenteur dans le développement de la maladie, et le peu d'intensité des phénomènes.

Deuxième degré.

Celui-ci nous présente une plus grande intensité, et doit être considéré comme la marche que suit le plus ordinairement l'affection hystérique. L'invasion est presque toujours subite, et cette névrose marche brusquement : au début, perte ordinairement incomplète des fonctions des sens et de l'entendement ; état de syncope plus ou moins prononcé, mais rarement absolu ; sentiment du globe hystérique, qui, de la matrice, se dirige vers les parties supérieures, et parcourt successivement tous les plexus nerveux intérieurs ; léger délire qui se dissipe toujours avec l'accès ; resserrement de l'abdomen ; palpitations tumultueuses ; gonflement extraordinaire de la poitrine, du col et de la face, qui devient d'un rouge violet ou reste très-pâle (il existe chez plusieurs malades une sorte de salivation ou d'écume à la bouche ; mais ce symptôme n'est point aussi prononcé ni aussi constant que dans l'épilepsie) ; constriction douloureuse au larynx ; respiration difficile, et même crainte de suffocation ; resserrement comme tétanique de la mâchoire inférieure ; le spasme s'étend bientôt à tous les muscles soumis à la volonté ; les membres, le tronc, la tête, sont agités de mouvemens

convulsifs ; les malades se frappent communément la poitrine ; une effusion de larmes ou des éclats de rire non motivés se succèdent alternativement, et la physionomie semble quelquefois prendre tour à tour l'expression de la joie ou celle de la tristesse. Dans cette maladie, les nerfs du système générateur entraînent les muscles dans le désordre. Les mouvemens convulsifs et l'affection cérébrale sont sympathiques, et se dissipent aussitôt que le spasme de l'utérus est terminé. On remarque chez quelques femmes des contractions très-pénibles vers l'utérus : la douleur circonscrite que ces malades éprouvent dans un point quelconque, tantôt à la tête, tantôt à la poitrine, mais communément vers le sinciput, est plus prononcée que dans le degré précédent. Il existe tantôt un sentiment de froid glacial ; d'autres fois une chaleur vive, dont le siége, l'étendue et la persévérance varient singulièrement : on remarque assez fréquemment une constipation opiniâtre.

Revenue à elle-même, la femme conserve ordinairement un souvenir confus de ce qui s'est passé pendant la durée de son accès : quelques-unes cependant n'en ont aucune idée : nous n'avons jamais rencontré cet oubli absolu de l'accès.

Troisième degré.

A l'agitation nerveuse la plus intense, aux convulsions les plus violentes, succède le trouble le plus effrayant de la respiration et de la circulation ; tout fait craindre une congestion cérébrale, une sorte d'apoplexie hystérique ; d'autres fois les malades tombent dans une espèce de collapsus. Les fonctions du cœur et des poumons paraissent suspendues; le pouls est insensible, et la chaleur animale semble entièrement éteinte ; les malades sont froides, pâles, insensibles, immobiles, et restent dans un état plus ou moins prolongé de mort apparente, qui peut se terminer par l'extinction totale de la vie.

Bonnet (*Sepulc. lib.* 3, *obs.* 9) transmet l'observation d'une demoiselle qui, entre autres symptômes hystériques, éprouvait fréquemment des syncopes effrayantes qui duraient quelquefois plus d'une demi-heure.

Les accès du troisième degré ont persisté quelquefois pendant deux et trois jours, et ont donné lieu à des méprises terribles. *Ambroise Paré*, *Raulin* et *Lepois* (*Piso*) rapportent des exemples de femmes hystériques ainsi restées dans un état de mort apparente, et que l'on se disposait à ensevelir.

Pline le Naturaliste nous a conservé l'histoire d'une femme qui paraît bien avoir été hysté-

rique, et qui resta sept jours dans un état que l'on prit pour une mort véritable.

Au rapport de *Lancisi*, une jeune personne donna des signes de vie pendant que l'on célébrait son service à l'église.

Vezale voulut disséquer le prétendu cadavre d'une femme depuis long-temps en syncope : elle se plaignit vivement du premier coup de scalpel.

Je rappelle ici l'accident arrivé à *Asclépiade* : il rencontra le convoi d'une dame qu'on portait en terre, s'en approcha, et reconnut qu'elle n'était pas morte.

Le fait le plus notable est celui cité dans le *Journal des Savans* (1745), relatif à la femme d'un colonel anglais (milady Roussel). Elle était si tendrement aimée de son mari, qu'il ne put se persuader qu'elle fût morte : il la laissa dans son lit beaucoup au-delà du temps prescrit par l'usage du pays, et quand on lui représenta qu'il était temps de l'enterrer, il répondit qu'il brûlerait la cervelle à celui qui serait assez hardi pour vouloir lui ravir le corps de sa femme. Huit jours se passèrent ainsi, sans que le corps présentât le moindre signe d'altération, mais aussi sans qu'il donnât le moindre signe de vie. Quelle fut la surprise du mari, qui lui tenait les mains qu'il baignait de ses larmes, lorsqu'au son des cloches d'une église voisine, milady se ré-

veilla comme en sursaut, et se levant sur son séant, dit : *Voilà le dernier coup de la prière ; allons, il est temps de partir.* Elle se rétablit parfaitement, et vécut encore long-temps.

Supposons tous ces faits bien authentiques, il resterait encore à démontrer le genre ou l'espèce de l'affection, car le mot *syncope* ou *vapeur* n'est pas toujours synonyme d'*affection hystérique.* Cependant, d'après le témoignage des auteurs, on serait porté à croire qu'autrefois, les accès d'hystérie parvenaient à une intensité effrayante, et que souvent même ils se terminaient par la mort, puisque *Arétée* admet cette terminaison comme assez fréquente, et puisque *Forestus* regarde comme un signe mortel l'écume à la bouche ; mais de nos jours l'hystérie ne se termine presque jamais de cette manière, à moins qu'il ne s'y joigne quelques complications fâcheuses, telles qu'un sommeil léthargique qui peut faire craindre une apoplexie : *In hypocondriacis et hystericis lethargus apoplexiam annuntiat.* Peut-être s'est-on mépris, dans quelques cas, sur la nature véritable de la maladie : toutefois les autorités les plus recommandables sont trop d'accord sur le danger que présentent certains cas d'hystérie, pour qu'on puisse regarder ces craintes comme erronées, exagérées, ou le résultat d'erreurs commises dans le diagnostic. Nous avons d'ailleurs rencontré nous-

mêmes cette névrose, parvenue quelquefois à ce troisième degré, comme dans l'observation ci-jointe.

Une jeune personne âgée de vingt et un ans, douée d'une bonne constitution et bien réglée, jouissait habituellement d'une parfaite santé.

Elle rencontra plusieurs fois, dans la société, un jeune homme qui parvint à lui inspirer une violente passion. Les parens de cette demoiselle s'opposèrent à l'union qu'elle désirait : dès-lors on remarqua un léger dérangement dans sa santé ; le cours des menstrues fut irrégulier. Pendant l'espace de six mois elle éprouva plusieurs accès d'hystérie avec mouvemens convulsifs, sentiment de strangulation de clou et de boule hystériques, fourmillement vers l'utérus, etc. On se contenta de prescrire l'application de quelques sangsues à la vulve.

Peu de temps après, cette jeune personne aperçut entre les mains de ses parens une lettre de son ami, qu'ils refusèrent de lui communiquer. Aussitôt elle fut prise d'une attaque beaucoup plus forte que les précédentes, et qui fut accompagnée d'un assoupissement comme léthargique, de perte absolue, de sentiment et de mouvement, de trismus, et d'un resserrement du pharynx tel que la déglutition était presque impossible. Dans cet état, le médecin ordinaire conseilla une forte saignée, au moyen de six sangsues appliquées

derrière chaque oreille ; mais les accidens ne furent point diminués, et trois jours se passèrent sans aucun changement. C'est alors que je fus appelé. Je trouvai la malade privée de connaissance, ne répondant point aux questions qu'on lui faisait : elle paraissait souffrante et ne point entendre. La figure était un peu animée et rouge, l'œil fixe, les paupières étaient constamment fermées, les arcades dentaires rapprochées, et l'obstacle à la déglutition était toujours le même, la respiration gênée, le pouls régulier, assez mou, peu développé, voisin de l'état naturel. Je prescrivis l'infusion de tilleul et une potion antispasmodique, et fis appliquer deux vésicatoires aux cuisses.

Le lendemain, la malade était à peu près dans le même état ; cependant elle proférait quelques mots, mais sans suite dans les idées, quoiqu'ils fussent relatifs à son inclination : il s'annonçait en outre un commencement de moiteur générale. On convint d'appliquer un nouveau vésicatoire à la nuque, et quand la transpiration serait finie, des compresses d'eau salée et de vinaigre sur la tête (c'était au mois d'octobre). On fit en outre pratiquer des frictions sur le cou avec l'huile, le camphre, le laudanum et l'éther ; enfin on ordonna des lavemens et des demi-lavemens avec le camphre et l'assa fœtida.

Au bout de sept jours, cette jeune personne

recouvra l'usage de ses sens, ayant conservé seulement un souvenir vague de la crise qu'elle avait ressentie.

Les parens s'opposant toujours à son mariage avec le jeune homme dont elle était éprise, nous leur conseillâmes de la faire voyager. Des objets et des rapports nouveaux affaiblirent le sentiment qui la maîtrisait, et le calme de l'esprit suivit bientôt l'entier rétablissement de l'organisation physique.

Le docteur *Jeanroi*, qui fut un des praticiens les plus distingués de la capitale, m'a rapporté qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois dans sa longue pratique une attaque d'hystérie aussi violente, ou parvenue à ce troisième degré. La jeune personne resta trois jours dans un état léthargique sans connaissance apparente, sans parole, etc. Deux vésicatoires furent appliqués aux jambes, et dès le lendemain, la malade prononça plusieurs phrases sans délire bien marqué; elle se plaignit de grandes lassitudes, et en peu de jours elle fut parfaitement rétablie.

L'observation suivante nous fera connaître un exemple d'hystérie abandonnée à la nature, et qui probablement n'eût pas été mortelle, si on y avait opposé les efforts d'une médecine active et bien dirigée; elle nous dévoilera en outre les ravages qu'occasionne la maladie dans l'organisation.

Hystérie terminée le troisième jour par la mort.

Une jeune fille, âgée de quinze ans, présentait déjà tous les signes de la puberté confirmée : son tempérament était sanguin et sa taille petite, mais fort bien prise ; elle était vive, alerte, et très-gaie ; exempte de chagrins et de passions, elle vivait dans l'état de domesticité.

A l'âge de huit ans, elle eut une attaque de convulsions qui ne se renouvela depuis en aucune manière, jusqu'à l'âge de quatorze ans.

Elle était bien réglée depuis huit mois ; et cette évacuation, en général assez abondante, fut supprimée vers la huitième époque, à la suite d'une frayeur vive : néanmoins il ne résulta de cet accident rien de fâcheux ; mais au retour suivant, les règles ne firent que paraître et s'arrêtèrent tout à coup : dès-lors malaise général, engourdissement dans les jambes et les cuisses, soif, et de plus, chagrins relatifs à son service. Le deuxième jour, cet état fut aggravé vers le soir par un sentiment de strangulation, tel que l'aurait déterminé un collier très-serré ; la respiration devint fort gênée, la région hypogastrique était le siége d'un gonflement marqué ; les parties génitales extérieures faisaient éprouver une sorte de gêne, comme si elles eussent été très-tuméfiées ; les membres et le tronc étaient agités de mouvemens convulsifs répétés ;

la constriction et le spasme du pharynx ne permettaient pas à la malade de prendre la moindre quantité de liquide, quelque besoin qu'elle ressentît de boire ; et quelque effort qu'elle fît pour y parvenir, cela lui fut toujours impossible. Il y eut, durant cet accès, une excrétion abondante d'urine claire et limpide : le troisième jour, elle fut conduite à l'Hôtel-Dieu, vers midi. La suffocation et l'anxiété étaient portées jusqu'au désespoir ; la malade se lamentait et poussait des cris aigus ; elle se plaignait constamment d'être étranglée ; sa voix était cependant peu changée ; elle conservait d'ailleurs toute sa raison et répondait juste aux questions qu'on lui faisait. Les mouvemens convulsifs de toutes les parties continuaient ; ils étaient extrêmement fréquens et étendus ; l'abdomen s'élevait et s'abaissait alternativement d'une manière très-considérable. La malade portait à tout moment la main à son cou, comme pour en arracher le fatal collier ; elle priait qu'on ne lui présentât aucun liquide, parce que les efforts infructueux qu'elle faisait lui causaient trop de douleur. La gêne de la respiration était inexprimable, et à tout moment il y avait menace de suffocation. Le pouls était serré, dur, fréquent et très-irrégulier ; les mouvemens du cœur offraient le même caractère ; ils étaient fort sensibles au tact et même à la vue : la peau était rouge et couverte de sueur.

Cette malade expira six heures après son entrée, au milieu d'une violente exacerbation, et se plaignant d'être étranglée.

Par une fatalité inconcevable, cette infortunée ne reçut pas le moindre secours pendant les trois jours que dura cette horrible maladie.

Ouverture. Le ventre était peu distendu, le pharynx, l'œsophage et l'estomac étaient entièrement vides et n'offraient aucune particularité, seulement l'estomac était resserré et fortement revenu sur lui-même; le cœur était vide de sang dans ses cavités gauches: il en était ainsi de toutes les artères et des veines pulmonaires; les cavités droites du même organe, et surtout son oreillette, étaient au contraire remplies d'une énorme quantité de sang noir, en grande partie coagulé, qui remplissait aussi l'artère pulmonaire et tout le système vasculaire à sang noir. On ne trouva dans tout l'encéphale, dans son prolongement rachidien ou ses enveloppes, et dans les nerfs, aucune altération appréciable; les veines cérébrales et les sinus de la dure-mère contenaient beaucoup de sang. Les ganglions du nerf trisplanchnique furent trouvés, les uns un peu plus gros que de coutume, les autres un peu moins. Les viscères, dont il n'est fait aucune mention, s'éloignaient peu de leur état naturel.

Les organes extérieurs de la génération parurent ceux d'une fille vierge: le clitoris et l'uté-

rus ne donnèrent lieu à aucune remarque. Les ovaires étaient très-volumineux ; ils avaient une grande fermeté : une sorte de tunique albuginée, mais transparente dans plusieurs points, leur servait d'enveloppe. Ces organes contenaient à l'intérieur une foule de vésicules arrondies, gorgées d'un fluide muqueux extrêmement abondant, qui ne s'écoulait que par une ouverture faite à chaque vésicule en particulier. (*Rullier, Dissertation*).

N'est-il pas raisonnable de penser qu'une forte saignée du pied pratiquée dès le principe, des vésicatoires sur les membres abdominaux, et les antispasmodiques, ainsi que les narcotiques administrés à l'intérieur et à l'extérieur, etc., eussent prévenu une pareille catastrophe?

La femme peut quelquefois empêcher ou retarder l'invasion des accès; dans d'autres cas, rien ne peut différer ou prévenir l'explosion, ni la présence d'un grand nombre de témoins, ni la majesté du lieu, ni aucun sentiment d'amour-propre. Les mêmes circonstances influent assez ordinairement sur la durée ou l'intensité des accès, mais plus souvent encore, ceux-ci se prolongent indépendamment de toute influence étrangère.

CHAPITRE V.

Variétés de l'Hystérie.

Les variétés de l'hystérie sont moins nombreuses et moins remarquables que les anomalies hypocondriaques, et surtout que les variétés propres aux diverses espèces d'aliénation : on pourrait même dire que l'hystérie n'offre en général aucune variété bien constante; elle présente plutôt des nuances ou des particularités accidentelles. En effet, l'âge, le tempérament, la constitution, le climat, la température, n'exercent pas ordinairement une influence très-notable sur les phénomènes de cette maladie (1).

Cependant les accès hystériques ne se présenteront pas avec le même appareil de symptômes, lorsqu'ils se développeront chez une femme faible et délicate, dont le chagrin a depuis longtemps exalté la sensibilité et usé les forces, et quand ils se manifesteront à la suite d'une hémorrhagie suprimée chez une femme vigoureuse et très-sanguine. Ils diffèrent en outre dans quelques cas, et c'est ce qui nous a engagés à admettre les deux variétés suivantes, que nous

(1) C'est par la raison que les observations d'hystérie diffèrent peu sensiblement entre elles, que nous n'en rapporterons qu'un petit nombre; tandis que les histoires particulières d'hypocondrie offrant des différences bien plus tranchées, nous en relaterons des exemples plus nombreux.

proposons d'appeler *hystéricisme* et *hystérie épileptiforme*.

Première variété. Hystéricisme.

Des médecins, dont le suffrage nous semble devoir former autorité, ont admis une variété d'hystérie qu'ils ont nommée *hystéricisme*. C'est une affection nerveuse qu'on observe surtout chez les jeunes personnes de douze à quinze ans, dont la constitution commence à se developper, et chez qui l'éruption menstruelle se prepare, mais n'a point encore eu lieu; l'utérus semble alors exercer une réaction plus ou moins sensible sur le reste de l'économie, et spécialement sur le système nerveux général.

Nous en rapporterons deux exemples.

Premier exemple d'hystéricisme.

Mademoiselle Caroline B***, âgée de quatorze ans, a toujours eu l'apparence extérieure d'une santé parfaite : à un embonpoint modéré elle joignait un teint frais et un caractère très-gai. Dans son plus jeune âge, on remarqua qu'elle avait le ventre gros et dur; à sept ans environ, cette disposition physique disparut, et presque tous les hivers il se formait sur le cuir chevelu des engorgemens qui se terminaient par suppuration. Depuis l'âge de dix ans à peu près, elle éprouvait, quand elle courait, des palpitations

avec douleur au côté gauche de la poitrine, qui par la suite firent place à une difficulté de respirer, suivie d'une forte oppression. Cette jeune personne ressentait presque toujours, dans la veille comme pendant le sommeil, et avec plus ou moins d'intensité, une oppression ou plutôt un râlement qui n'était accompagné d'aucune douleur, mais auquel il se joignait souvent un embarras, une sorte de resserrement dans la gorge, qui de la région de l'estomac se porta au larynx, et alla toujours en augmentant depuis l'âge de douze ans.

On soupçonna qu'une humeur particulière était la cause de ce désordre : on y opposa pendant deux ans, et sans succès, un vésicatoire au bras ; plus tard, on accusa un état de pléthore sanguine, parce que les règles n'avaient pas encore paru, et on appliqua des sangsues au siége ; mais il n'en résulta aucun amendement. Les opinions alors se partagèrent, et l'on supposa tour à tour que la maladie était spasmodique ou le résultat des obstructions.

Telle est l'analyse d'un mémoire à consulter, que je reçus en 1807. Je conseillai l'exercice, l'usage d'une potion antispasmodique avec l'opium gommeux ℥ß et l'éther ℈j ; l'application de serviettes chaudes autour du bassin, les bains de siége tièdes, un régime tonique, une bonne rôtie au vin pour souper, etc. etc. Enfin, je pres-

crivis conditionnellement, dans le cas où les symptômes deviendraient plus violens, de faire appliquer des sangsues à la vulve.

Les accidens diminuèrent de suite, et trois mois après, j'appris que l'apparition des règles avait été le signal d'un entier rétablissement.

Deuxième exemple d'hystéricisme.

Une demoiselle âgée d'environ quinze ans, d'un tempérament sanguin et nerveux, jouit d'une bonne santé dans sa première enfance, et annonça une intelligence très-précoce. Ses parens faisaient succéder aux lectures et à l'étude les promenades au dehors et les recréations convenables. Son régime était bien ordonné et régulier. Quelque temps après la guérison d'un catarrhe pulmonaire, qui fut très-prononcé et tenace, mademoiselle *** fut prise de légers mouvemens convulsifs dans les membres ; sa respiration était fréquente et entrecoupée ; la malade répétait continuellement, et avec vélocité ce son : *bia bia*. Elle conservait évidemment la connaissance de tout ce qui se passait autour d'elle ; le pouls était petit, serré, naturel, quant à la fréquence des pulsations : dix gouttes de liqueur d'*Hoffmann* firent cesser l'accès, et furent plusieurs fois suivies du même succès ; les attaques se répétaient trois et quatre fois par jour : du reste, le sommeil était bon généralement, et la santé parfaite pen-

dant les intermissions. Le médecin ordinaire de la malade, M. *Depasse* de Guingamp, praticien très-éclairé, attribua les accidens à l'extrême susceptibilité nerveuse de la jeune malade, à son accroissement rapide, et surtout à une sorte de puberté anticipée, bien plutôt qu'à une disposition vermineuse dont rien ne constatait l'existence. Par le traitement qu'il prescrivit, il chercha à remplir une double indication, à diminuer la sensibilité exaltée, en fortifiant toute l'économie, et spécialement le système musculaire : il conseilla les bains légèrement tièdes, les frictions sèches sur le rachis, les lombes et les membres abdominaux, une infusion de tilleul et de feuilles d'oranger, des lavemens tantôt simples, et tantôt avec un gros *d'assa-fœtida*, enfin un exercice varié, et les amusemens propres à l'âge de la jeune malade.

Après avoir fait observer ce régime pendant un mois, on vit diminuer les accès, et au bout de quelque temps, ils cessèrent totalement pour reparaître six semaines plus tard. Les paroxysmes présentaient les mêmes symptômes : dyspnée, contractions involontaires et irrégulières des muscles; l'appétit et le sommeil étaient bons, et dans l'intervalle des accès, la santé paraissait parfaite.

Le calme reparut pendant trois mois, et durant cette intermission, la jeune malade prit de

la force et acquit même de l'embonpoint; mais l'orage revint avec autant d'intensité que par le passé, mais aussi avec quelques différences. Les accès commençaient souvent par des bâillemens, quelquefois par des éclats de rire ou des pleurs non motivés; tantôt la malade se roulait sur son lit ou sur le parquet, tantôt montait sur les meubles : du reste, elle était capable de suivre un raisonnement, et répondait avec beaucoup de finesse aux questions et aux observations qu'on lui adressait; mais pendant la durée de son accès, elle s'éloignait sensiblement du respect et de la tendre affection qu'elle portait à ses parens.

Telles sont les particularités les plus remarquables de cette singulière maladie.

Les conseils que nous adressâmes aux parens, M. *Pinel* et moi, différaient très-peu des moyens mis en usage par le médecin ordinaire : cette affection fut d'abord affaiblie par le traitement rationnel mis en usage, par l'exercice, et surtout par un long voyage, et s'est ensuite dissipée complètement à l'aide du même régime, à mesure que la constitution de cette jeune personne s'est fortifiée, et surtout depuis que le flux menstruel est régulièrement établi.

Deuxième variété. Hystérie épileptiforme.

Il est une autre variété d'hystérie que plusieurs médecins ont bien reconnue, signalée, et à laquelle

ils ont donné le nom d'*épilepsie utérine* (1). Cette dénomination nous semble inexacte, 1°. parce que la maladie nommée *épilepsie*, ou *mal caduc*, ne dépend presque jamais, et peut-être jamais d'une lésion de l'utérus (2); 2°. parce que les accidens désignés sous le nom d'*épilepsie utérine* dépendent d'un mode d'irritation de l'utérus, et non du cerveau : en vain présenteraient-ils plus ou moins d'analogie avec les symptômes propres à l'épilepsie, ils ne pourraient constituer cette affection, puisque, loin d'appartenir à une lésion du cerveau ou du système nerveux, ils dépendent d'une affection particulière de la matrice. Examinons en outre que les causes qui ont donné lieu à ces prétendues épilepsies utérines sont celles qui donnent presque toujours naissance à l'hystérie; que la marche de ces maladies, sous beaucoup de rapports, se rapproche plus de celle de l'hystérie que de la progression de l'épilepsie : ainsi elles cèdent ordinairement au même moyen qui triomphe presque toujours des

---

(1) Parmi ces auteurs nous citerons spécialement *Sennert*, *Jonston* et *Lansonius*.

(2) Quand la suppression des règles détermine l'épilepsie, ce n'est point par suite d'une lésion existant dans la matrice, mais bien par l'effet du trouble dont est affecté le cerveau ; c'est ainsi que dans la péripneumonie, résultat d'une aménorrhée subite, le poumon seul est atteint plus ou moins fortement, et l'utérus ne participe point au désordre.

névroses utérines; abandonnées à la nature, elles n'offrent presque jamais de terminaisons fâcheuses; enfin, lorsque les rapports sexuels ont dissipé le désordre, il se reproduit bientôt de nouveau quand les malades reviennent à leur état de continence. Souvent encore la fin du paroxysme est signalée par l'émission d'une urine limpide et par des évacuations utéro-vaginales.

Appuyons maintenant cette opinion par quelques faits :

Premier exemple d'Hystérie épileptiforme.

Une veuve âgée de trente-un ans, d'un tempérament sec et ardent, livrée à la vie sédentaire, éprouve du dérangement dans le flux menstruel, et s'abandonne à un usage copieux du vin : tout à coup elle tombe à terre, sa bouche écume, son corps est violemment agité et ses membres fortement rétractés. Ayant recouvré sa connaissance, elle ne conservait aucun souvenir de son accès, qui se répéta deux fois dans le même mois. Plusieurs médicamens furent employés sans succès. Un second mariage lui est alors conseillé; elle choisit un mari jeune et très-amoureux, devint bientôt enceinte, et se rétablit parfaitement. (*Obs. de Lansonius.*)

Dans cet exemple nous retrouvons la cause ordinaire de l'hystérie, une continence forcée, et non la frayeur ou les lésions cérébrales, sources

si constantes des affections épileptiques ; nous voyons en outre la maladie céder aux plaisirs de l'amour, qui dissipent presque toujours les névroses utérines. Il faut en convenir, il est bien rare que l'épilepsie soit guérie aussi facilement ; d'où je crois pouvoir conclure, malgré quelques symptômes plus ordinaires à l'épilepsie, que cette jeune veuve était devenue hystérique par suite de son veuvage, qu'elle s'est rétablie en faisant cesser l'état de continence, et que cette observation serait mieux caractérisée par les noms d'*hystérie épileptiforme* que par la dénomination d'*épilepsie utérine ;* mais étayons par d'autres preuves cette proposition.

Les *Éphémérides des Curieux de la Nature* renferment deux faits qui viennent encore à l'appui : le premier surtout offre une sorte de contre-épreuve.

Premier cas. Une jeune fille, qui passait depuis dix ans pour épileptique, s'abandonne avec un soldat aux jouissances vénériennes, et guérit : son amant est rappelé sous les drapeaux, aussitôt elle est atteinte de fureur utérine. (*Déc.* 3, *ann.* 1, *obs.* 12, *p.* 29.)

Cette dernière maladie succède bien plus souvent à l'hystérie qu'à l'épilepsie, et le siége qui lui est commun avec l'affection hystérique nous confirme que cette fille était sujette, non au mal caduc, mais à une névrose utérine qui a cédé

une première fois *strenuâ cohabitatione*, et qui aurait cédé de nouveau au même moyen.

Deuxième cas. Une demoiselle, de très-haute extraction, fut prise d'accès épileptiques à la suite de la suppression de ses règles : un médecin lui conseilla le mariage ; bientôt elle devint grosse, et après un heureux accouchement elle recouvra une santé parfaite. (*Déc. 1, ann. 1, obs.* 86.)

Ces deux faits nous démontrent également que la continence est le principe du désordre, que celui-ci provient de l'utérus, et que, dans l'un et l'autre cas, les changemens survenus dans cet organe ont été le signal de la guérison. *Hoffmann* cite une histoire analogue, que nous avons rapportée page 741.

Dans l'observation suivante, où l'on retrouve encore plusieurs des symptômes propres à l'épilepsie, nous ne voyons cependant qu'une *hystérie épileptiforme*, et non une épilepsie véritable.

Deuxième exemple d'Hystérie épileptiforme.

Alexandrine D**, âgée de quarante-un ans, d'un tempérament sanguin, d'un embonpoint et d'une stature ordinaires, éprouve, à l'âge de vingt-sept ans, de violens chagrins, qui déterminent la suppression de ses règles. Après six mois de cette aménorrhée elle fait choix d'un amant ; bientôt l'écoulement sexuel reparaît, une grossesse se déclare, et au huitième mois son

ami l'abandonne. Des convulsions surviennent aussitôt : elles sont caractérisées par un cri perçant qui précède la perte de connaissance, par le tremblement et la flexion des membres, par les mouvemens convulsifs des yeux et l'écume à la bouche : l'accès ne durait qu'un quart d'heure.

L'accouchement fut heureux ; mais neuf jours après, retour des accès qui se manifestent chaque mois, le second ou le troisième jour des règles, ou à une très-petite distance. Le même désordre subsiste pendant plus de huit ans ; et durant le même laps de temps, la malade observe une continence absolue.

En 1811 elle habite de nouveau avec un homme, ne ressent aucune atteinte de sa névrose, et devient enceinte une seconde fois. Pendant les trois derniers mois de sa grossesse elle éprouve de nouvelles attaques, qui lui semblent causées par la lenteur avec laquelle procède son amant, puisqu'elles n'ont pas lieu lorsque, dans l'acte, celui-ci arrive promptement au but.

Après l'accouchement, Alexandrine D** renonce à tout commerce amoureux ; mais les accès reparaissent vers l'époque des règles, et comme par le passé. Ce qu'il y a maintenant de remarquable, c'est que depuis les neuf derniers mois qui viennent de s'écouler, elle n'a éprouvé que trois attaques. D'après cette amélioration survenue *spontanément*, on peut espérer que cette

maladie convulsive se dissipera entièrement lorsque la sensibilité de l'utérus sera plus émoussée, ou quand la vie qui est propre à cet organe aura entièrement cessé : c'est aussi l'opinion de la malade, qui avoue que son tempérament s'affaiblit de jour en jour, surtout depuis qu'elle s'est condamnée à une sorte de retraite, et qu'elle ne fréquente plus la société des hommes.

Nous ne répéterons pas ici les réflexions que nous avons déjà mentionnées, mais nous ferons remarquer que, chez Alexandrine, le siége de la névrose existait bien certainement dans l'utérus, puisque les accès ont été constamment influencés par les divers états de ce viscère, et que la continence, le coït, la grossesse et la cessation progressive de la vie sexuelle, ont exercé sur les phénomènes de cette maladie une influence que l'on n'observe pas chez les personnes atteintes d'épilepsie.

D'après ces diverses considérations nous proposons d'appeler cette variété d'hystérie *hystérie épileptiforme*, et de remplacer ainsi par une dénomination exacte et précise une dénomination tout-à-fait fautive.

L'hystérie se présente parfois sous la forme d'une syncope, et sans l'appareil convulsif qui lui est ordinaire. Dans l'observation ci-jointe,

que j'emprunte au docteur *Nacquart*, nous verrons un exemple de cette variété.

« M. P** se lève, croyant laisser sa femme » jouir d'un profond sommeil ; deux heures » après on entre dans la chambre, elle conti- » nuait à paraître dormir. Une heure plus tard, » étonné de ce sommeil prolongé, contre son » habitude, on veut la réveiller : vains efforts, » toutes les tentatives sont inutiles. Lorsque je » la vis vers midi, la respiration était facile, » peu étendue ; la position dans le lit naturelle ; » les membres étaient souples, non agités ; les » yeux fermés ; la coloration dans l'état ordinaire. » Au bout de six heures, cet état, qui avait été » amené par de vives contrariétés, se dissipa » entièrement, et la malade, qui avait déjà » éprouvé plusieurs accès pareils, n'en conser- » vait aucun souvenir ». (*Journal général de Méd. décembre* 1812. *Paris.*) Mais cette observation est-elle une hystérie ou une syncope ?

Parmi les variétés d'hystérie, la suivante nous a paru remarquable.

Madame D**, âgée de vingt-quatre ans, est douée d'une bonne constitution et d'une sensibilité extrême au physique comme au moral. Les affections vives de l'âme lui font éprouver du malaise, des spasmes nerveux avec perte incomplète de connaissance, et même avec convulsions. Le bruit qui la surprend, ou le choc réitéré

d'un verre renouvellent ces accidens : la sensibilité des organes de la génération est fort peu développée. Néanmoins, cette dame est devenue mère plusieurs fois ; mais lorsque, dans le rapprochement des sexes, elle ne ressent aucun plaisir, ce qui arrive le plus souvent, elle est prise d'une suffocation très-pénible, tombe en syncope et dans des convulsions violentes, mais peu prolongées. Quand au contraire le spasme voluptueux se fait sentir chez elle, il ne lui survient aucun accident.

Ce fait est une variété d'hystérie, car les accidens partent bien certainement de l'utérus. Du reste, cette dame, pendant l'accès, ne perd pas entièrement connaissance.

L'observation suivante nous offre l'exemple d'une particularité très-singulière (1). Une demoiselle âgée de cinquante ans, douée d'une grande sensibilité, fut atteinte, vers l'époque de la puberté, de convulsions fréquentes; elle vécut célibataire, et parvint, avec une santé faible et une constitution très-irritable, à l'âge de quarante-cinq ans. Lors de la tourmente révolutionnaire, une vive affection morale lui occasionna des convulsions violentes qui durèrent deux jours. A peine eut-elle recouvré ses sens, qu'elle s'aperçut d'une dépression considérable à la ré-

(1) Mém. de la Soc. méd. d'Émul.

gion épigastrique : depuis cette époque, elle éprouva chaque jour un accès hystérique, qui fut rebelle aux antispasmodiques pendant huit mois. L'apparition momentanée d'un engorgement au genou gauche affaiblit ces symptômes. Tout à coup, et trois mois après la cessation de tout médicament, il se manifeste une évacuation alvine très-copieuse, et l'estomac revient comme par enchantement dans sa position naturelle; mais bientôt le chagrin de la mort de sa mère la plonge de nouveau dans les mêmes accidens, qui cèdent aussitôt que les douleurs du genou reparaissent.

Quatre années se passent dans un calme absolu, et cette dame atteint tranquillement son époque critique. A cinquante ans l'estomac disparaît pour la troisième fois. Les accès hystériques se reproduisent également : convulsions effrayantes, figure animée d'un rouge noirâtre, respiration laborieuse, convulsions des muscles du col avec menace de suffocation, dépression très-sensible à l'épigastre, sans aucun gonflement dans le voisinage; symptômes d'embarras gastrique, auxquels on opposa les délayans, l'eau émétisée, etc. L'estomac reprit sa place naturelle; les accès devinrent moins fréquens et moins intenses, et la convalescence fut cimentée par un vésicatoire au bras.

Telle est l'analyse d'une observation dont je

ne prétends pas garantir ou nier l'exactitude, et qu'on trouve dans les *Mémoires de la Société médicale d'Émulation*, t. IV, p. 211.

On a divisé l'hystérie en idiopathique, symptomatique, sympathique et métastatique; mais les particularités qu'elle présente, dans les diverses circonstances où l'on a cru devoir admettre ces divisions, ne nous semblent pas assez notables pour constituer des espèces distinctes, ou même des variétés.

Baillou et *Rivière*, et d'après eux le célèbre *Morgagni*, admettent une fièvre hystérique; mais le docteur *Chambon* ne reconnaît dans l'observation de *Rivière* que des symptômes anomaux appartenant à la fièvre, et je partage l'avis de ce médecin. Ne voyons-nous pas admettre fréquemment l'existence de l'hystérie ou sa complication, d'après la simple observation de quelques phénomènes nerveux, tout à fait indépendans de l'action de l'utérus, étrangers à cette névrose, ou trop éphémères pour la caractériser?

Mais outre les variétés qui existent dans l'ensemble des symptômes que présente un cas particulier d'hystérie on rencontre assez souvent, chez les personnes hystériques, des particularités ou des phénomènes qui méritent d'être considérés isolément, tels que le strabisme accidentel, des illusions d'optique auxquelles on a sans doute donné trop d'importance, en les dési-

gnant sous le nom d'*amauroses périodiques* (1). Le développement extraordinaire de l'ouïe, une sorte de catalepsie, les nausées, le vomissement, le hoquet, l'envie de mordre et l'horreur de l'eau que *Lieutaud* assure avoir observée plusieurs fois; ce dernier phénomène a été, dans quelques circonstances, un sujet de méprise, et a fait prendre pour une hydrophobie une véritable affection hystérique; le contraire est également arrivé, et un médecin d'un très-grand mérite a regardé comme atteinte d'un accès d'hystérie une femme en proie à une hydrophobie déterminée par l'usage imprudent de l'*asarum* (ou herbe au pauvre homme) que lui conseilla un herboriste.

On a rapporté dans un journal de médecine l'histoire d'une dame affectée d'hystérie, et qui laissait dégager, par le moindre contact, des étincelles électriques : j'ai vu beaucoup d'exemples de la maladie hystérique, et je n'ai jamais rencontré cette particularité chez une personne sujette à cette névrose; mais comme on l'observe dans d'autres circonstances, ce fait ne nous semble offrir en lui-même rien d'invraisemblable : le phénomène suivant, dont nous avons la certitude, paraîtra tout aussi extraordinaire : c'est le développement d'un emphysème essentiel

(1) Nosogr. phil., 2e édit., t. 3.

chez une femme hystérique, sans aucune lésion extérieure, et sans aucune communication avec les poumons.

Enfin on a remarqué quelquefois chez les jeunes personnes sujettes à cette névrose un changement prompt d'un ton fort et profond de la voix à un ton faible et haut. Dans certains cas encore, les accès violens de la passion hystérique sont accompagnés d'une chaleur brûlante que les malades ressentent particulièrement dans le bas-ventre et la poitrine : cet accident est sans fièvre générale, et n'offre pas d'inquiétude.

Après avoir énuméré la majeure partie des accidens ou symptômes anomaux que peut offrir à l'observation la réunion d'un grand nombre de femmes hystériques, nous allons examiner l'influence de cette maladie sur un des phénomènes les plus importans de la vie sexuelle. Parmi les auteurs qui ont écrit sur l'hystérie, les uns ont pensé que les personnes sujettes à cette affection étaient plus aptes à devenir enceintes (ce qu'on peut expliquer par leur sensibilité plus exquise et des passions plus ardentes); d'autres, au contraire, ont regardé cette maladie comme pouvant former obstacle à la conception : ces deux opinions méritent d'être examinées. Sans doute il est possible que des personnes hystériques soient stériles toute leur vie, et les auteurs qui ont émis cette dernière opinion auront probablement observé

des exemples à l'appui ; mais le plus souvent les femmes qui ont été sujettes aux accès d'hystérie sont très-fécondes, et cet avis du moins nous paraît plus conforme à l'observation. Nous pourrions citer à ce sujet plusieurs témoignages, mais nous nous bornerons à mentionner le suivant. Une jeune femme éprouve, avant son mariage, des accès d'hystérie très-violens : à dix-sept ans on la marie ; deux mois après, ses règles se suppriment, et une grossese se déclare ; à dix-huit ans, suppression des menstrues par la même cause. Dans l'espace de neuf ans, elle eut huit enfans : chaque année elle portait un enfant ; telle était son aptitude pour la *fécondation* (qu'on nous pardonne cette expression), qu'après chaque couche, elle devenait enceinte aussitôt qu'elle habitait avec son mari.

Les femmes, au contraire, dont les organes génitaux n'exercent qu'un faible empire, celles surtout qui n'éprouvent aucune jouissance dans l'acte vénérien, sont en général peu habiles à la conception, quoique susceptibles cependant de devenir mères.

Telles sont les particularités les plus remarquables qu'offre cette névrose utérine pendant son cours ; voyons à présent comment elle se termine.

CHAPITRE VI.

Terminaisons des accès et de la maladie.

La durée des accès varie; ils se prolongent depuis deux et trois heures à dix et douze heures, et dans quelques cas plus rares, à sept ou huit jours. Lorsqu'un paroxysme hystérique touche à son déclin, ce qui arrive après un laps de temps très-variable, les convulsions diminuent progressivement; les malades étendent les bras et les jambes, et se livrent à des bâillemens et des éternuemens; la respiration n'est plus aussi gênée, la circulation s'exécute avec ordre, et on entend ordinairement des borborygmes : *obmurmurant intestina.* La fin de l'accès est plus spécialement assurée lorsqu'un liquide particulier vient lubrifier les parties génitales. Rarement cette sécrétion est elle accompagnée d'une sensation voluptueuse, analogue à celle du coït. Cependant *Galien* rapporte l'exemple d'une femme dont les crises hystériques se terminaient par une émission spontanée de liqueur spermatique, émission accompagnée d'une sensation voluptueuse. *Zacutus Lusitanus,* et plusieurs autres médecins ont répété la même observation. Les malades, pour la plupart, rendent une quantité prodigieuse d'urine extrêmement limpide. En même temps la physionomie devient plus calme, les yeux ne sont plus égarés, la voix

recouvre son timbre ordinaire ; après un moment de stupeur et d'étonnement, les sens sont susceptibles d'impressions et de sensations exactes; enfin l'exercice régulier des fonctions de l'entendement se rétablit. A la fin de l'accès, dont la terminaison absolue est plus ou moins rapide, il reste un grand accablement; les malades se plaignent de ressentir de grandes lassitudes et et des douleurs dans les membres; quelquefois un premier accès est unique; mais le plus souvent il survient, d'une manière irrégulière, un nombre indéterminé d'atteintes, dont les intermissions, l'intensité et la durée sont elles-mêmes très-variables.

L'hystérie peut alterner avec une autre affection, ou se convertir en d'autres maladies. Le docteur *Alibert* rapporte, dans ses *Nouveaux Élémens de Thérapeutique*, qu'une femme ressentait tour à tour les symptômes d'une fièvre catarrhale, et les accès violens d'une maladie hystérique. *Backer* parle d'une dame qui éprouva pendant plusieurs années des attaques d'hystérie auxquelles succéda un asthme convulsif très-violent, qui alternait avec des crampes d'estomac fort intenses. Au rapport de *Cheyne*, l'étisie tuberculeuse (ou phthisie) est souvent la suite des fortes hystéries. *Sydenham* a vu cette dernière affection se convertir en hématémèse, étisie, goutte, apoplexie, paralysie, syncope;

mais rappelons-nous que ce médecin, si justement célèbre, a cependant confondu l'hystérie avec l'hypocondrie.

Pendant la grossesse, la névrose de l'utérus se trouve en quelque sorte suspendue : *Hystericæ tempore graviditatis quo impetum principii vitalis uterus attrahit, à spasmis et affectibus nervosis liberæ sunt. Hoffmann* nous a transmis plusieurs exemples qui pourraient étayer cette opinion, mais nous nous bornons à citer le suivant, que nous abrégeons (*obs.* 4). Une femme, âgée d'environ trente ans, est prise tout à coup de convulsions à la suite d'un refroidissement ; elle tombe à terre ; sa tête et ses pieds offraient les mouvemens convulsifs les plus singuliers, tandis que les mains en étaient exemptes : elle vociférait et se mordait les lèvres. Les paroxysmes revenaient vers l'époque des règles, et sans signes précurseurs ; ils étaient suivis de lassitudes, etc. Cette dame devint enceinte, et pendant toute la durée de sa grossesse, elle n'éprouva aucun accès, et accoucha heureusement. Vers le dixième jour, les lochies diminuèrent et furent remplacées par une sérosité sanguinolente ; la malade était en outre très-constipée : les maux de tête, les vertiges, les flatuosités, les convulsions, etc., revinrent ; mais enfin les lavemens carminatifs et huileux, les pilules tempérantes, balsamiques, le castoréum, le safran, et l'usage des eaux miné-

rales contribuèrent efficacement à la guérison de cette maladie. Cependant les femmes enceintes, quoique exemptes en général des accès hystériques, n'en sont pas constamment à l'abri ; ils dépendent alors presque toujours de l'influence qu'exercent les affections morales. *Exemple :* Une demoiselle sujette, par suite d'une menstruation irrégulière, à des atteintes d'hystérie, se marie à l'âge de vingt et un ans : le désordre cesse ; mais dès le quatrième mois de son mariage, de violens chagrins ramènent les accidens hystériques, qui continuent pendant la grossesse et l'allaitement, et se dissipent enfin avec le retour du calme moral. D'autres fois cette névrose n'est que suspendue pendant un certain laps de temps, ou durant le cours d'une autre maladie. Une femme hystérique éprouve à la suite de ses couches un abcès auquel succède un ulcère sinueux ; pendant six mois, il ne se manifeste aucun mouvement convulsif ; mais l'hystérie reparut dès que l'ulcère fut guéri. (*Reil.*) J'ai vu, dit-il, une autre hystérique qui n'éprouva point d'accès pendant toute la durée d'une fracture. Certainement, ajoute-t-il, dans ce cas-ci, aucun transport d'humeur n'avait lieu. *Aliam vidi mulierem, spasmis hystericis subjectam, cui, cùm os frangeretur, paroxysmus non accidebat; certè in hâc specie nulla materiæ migratio facta erat.* (*Reil*, p. 179, *Médecine clinique.*)

L'hystérie peut encore se terminer par une paralysie. *Lepois* rapporte qu'une religieuse, sujette depuis plusieurs années à des accès d'hystérie, en fut délivrée une première fois par la paralysie du bras et de la jambe gauches, et une seconde fois par la paralysie du bras seul.

On voit, dans quelques cas, cette névrose offrir une terminaison funeste, comme nous l'avons annoncé déjà ; mais de plus, elle conduit quelquefois à d'autres maladies très-graves : c'est ainsi que mon ami le docteur *Nacquart* a vu une dame qui avait conservé de son état hystérique des borborygmes perpétuels : elle avait été obligée de se retirer du monde, et est morte phthisique, peu de temps après, à l'âge de trente-cinq ans.

En parlant des complications, nous fournirons, en assez grand nombre, des exemples de ces terminaisons fâcheuses.

Crises de l'Hystérie.

Les crises de l'hystérie sont variées et nombreuses, moins cependant que celles de l'hypocondrie. Comme nous ferons connaître ces dernières avec détail, nous indiquerons très-succinctement les particularités relatives aux crises de l'hystérie : celles-ci, en outre, peuvent être complètes ou incomplètes. Cette affection se juge par les différens modes de crises, par des

éruptions qui se manifestent sur le système cutané, par des sueurs, des sécrétions diverses, des abcès ou des suppurations dans le tissu cellulaire, par des hémorrhagies, par des diarrhées propres au système muqueux intestinal, par des urines très-abondantes, le plus ordinairement par la sécrétion du mucus vaginal, et quelquefois par une émission spontanée de la liqueur muqueuse ou *spermatique*, émission qui peut être accompagnée d'un sentiment voluptueux; enfin par d'autres maladies qui se terminent elles-mêmes promptement et favorablement.

Une jeune fille, au rapport de *Zacutus Lusitanus* (*obs.* 94), en proie aux spasmes hystériques les plus violens, n'éprouvait aucun soulagement des moyens réputés antihystériques, et fut guérie par une sensation voluptueuse excitée vers l'utérus, et par une émission spermatique abondante : *Titillatione et fervore quodam in utero concitato, copiosum semen excernens, ab accessione sævâ superstes remansit. Zacutus* demande ensuite si ce moyen peut être permis par un médecin religieux, et n'osant résoudre la question, il renvoie à d'autres autorités : *Raphael Moxius, lib.* 2, *de curandis morbis muliebribus*, 17, *etc. Carrerius disput.* 69, *ad lib.* 6, *de locis affect. Galen : et apologia tertia doctoris Didaci Morani Lusitani, in quâ de epilepsiâ hystericâ egit luculenter.*

Nous sommes loin de penser qu'un pareil expédient puisse être autorisé par les médecins; nous croyons au contraire qu'il doit être interdit ou laissé dans l'oubli, quand ceux qui entourent ces malades n'en ont pas connaissance. En effet, si les accès sont peu intenses, il faut les abandonner à la nature, ou s'efforcer de les guérir de quelque autre manière; si au contraire ils sont portés au degré le plus violent, à ce point, qu'on rencontre très-rarement, de menacer la vie des malades, nous doutons que ce moyen réussisse à les sauver du péril auquel elles sont exposées; cette condition serait cependant la seule qui pourrait faire enfreindre la mesure prohibitive et générale.

CHAPITRE VII.

Complications de l'Hystérie.

Nous distinguerons les complications de l'hystérie en accidentelles et en conséquentes ou dépendantes de la maladie première : ainsi une péripneumonie qui surviendrait chez une femme hystérique serait une complication accidentelle, tandis qu'une nymphomanie, une aménorrhée, une phthisie pulmonaire, une manie érotique, seraient la conséquence de l'affection hystérique : ces dernières maladies peuvent être encore une conséquence médiate ou immédiate de l'hystérie;

ainsi l'aménorrhée, la nymphomanie, les lésions organiques de l'utérus dérivent immédiatement de la névrose de ce viscère, tandis que la manie érotique, la phthisie, peuvent bien, à la vérité, en dépendre, mais indirectement.

Nous allons parcourir succinctement les affections qui, par leur fréquence, leurs rapports et leurs sympathies, ont une sorte d'affinité avec l'hystérie. De ce nombre sont, la phthisie pulmonaire, l'aménorrhée, l'hypocondrie, la mélancolie, la manie, la nymphomanie, l'épilepsie, l'aphonie, les lésions organiques de la matrice et de ses annexes.

Rarement l'hystérie vient-elle se joindre à une phthisie bien confirmée; il semble que l'irritation qui existe alors vers la poitrine garantisse les organes sexuels; mais souvent les retours multipliés des accès hystériques troublent les fonctions du poumon par les agitations convulsives dont ces malades sont affectées. Ce viscère qui, après le cerveau, est celui dont la texture est la plus délicate, devient le siége d'un trouble ou d'une lésion dont il importe singulièrement d'arrêter le plus tôt possible les progrès ultérieurs. Aussi n'est-il pas rare de rencontrer, dans la pratique médicale, de jeunes personnes qui, contrariées dans leur inclination, deviennent sujettes à des accès d'hystérie plus ou moins violens: si leurs vœux les plus chers ne sont point exau-

cés, la santé dépérit, et l'habitude des agitations convulsives ne tarde pas à établir vers l'organe pulmonaire un foyer d'irritation.

L'aménorrhée est plus fréquemment cause que complication de l'hystérie; cependant elle peut compliquer celle-ci, ou même en être le résultat. Citons quelques exemples à l'appui de ces assertions.

L'impression du froid détermine chez une femme la suppression des règles, et par suite les accès hystériques surviennent : dans ce cas, l'aménorrhée a produit l'hystérie. La dissertation de M. *Royer Collard* renferme l'observation intéressante d'une suppression de menstrues, à laquelle l'hystérie s'est jointe consécutivement (1).

Celle-ci, chez une autre malade, est provoquée par des affections de l'âme très-pénibles : la santé générale se dérange, les règles s'annoncent, et l'invasion d'un accès convulsif les supprime. Ici l'hystérie a bien évidemment occasionné la suppression des menstrues.

Une jeune personne, âgée de dix-huit ans, était depuis long-temps sujette à des atteintes de cette névrose. Elle éprouve un jour une vive frayeur dans l'instant de sa menstruation; celle-ci s'arrête, et ne reparaît plus. Dans ce troisième

---

(1) Voyez *Dissertation sur l'Aménorrhée*, par M. *Royer Collard*, page 45.

exemple, l'aménorrhée est indépendante de l'hystérie, et constitue encore une complication. Toutes les maladies auxquelles l'aménorrhée ou le dérangement des menstrues donnent si fréquemment naissance, peuvent alors compliquer la névrose utérine. L'hypocondrie et cette dernière sont souvent associées l'une à l'autre, et cette réunion a sans doute contribué à faire admettre leur prétendue identité. Pour éviter l'erreur dans ce cas, il faut d'abord se rappeler que cette complication ne peut pas exister chez l'homme, ainsi que nous l'avons démontré, et se garder ensuite de prendre pour une véritable hystérie quelques symptômes nerveux plus ou moins prononcés, et analogues à ceux qu'éprouve la femme atteinte de cette dernière affection.

Dans l'observation ci-jointe, *Frédéric Hoffmann* nous a transmis un exemple assez bien caractérisé d'hystérie hypocondriaque.

Une jeune veuve, âgée de trente ans, ne fut pas, pendant ses couches, exempte de ses accès hystériques. Quelque temps après la mort de son mari, elle se livre à une vie dissipée, danse avec excès, s'expose à des refroidissemens subits en s'asseyant presque nue sur le gazon, fait ses délices des fruits de la saison et des acides. Bientôt ses forces et son estomac s'affaiblissent au point qu'elle éprouve des anxiétés précordiales, de la gêne à respirer, des douleurs dans le dos et de

la constipation ; une sérosité visqueuse, qui coule à l'époque des règles, et même après, remplace cette hémorrhagie, et s'arrête elle-même à la suite d'un froid vif ressenti vers le bas-ventre. Une tumeur large de quatre doigts et longue d'un palme, avec douleur pongitive, survient à l'aine ; il s'y joint d'autres symptômes graves : tout à coup la malade tombe à terre privée de mouvement, de sentiment et de connaissance ; la figure était gonflée et rouge, les seins très-enflés, et sa sueur teignait le linge en rouge ; le ventre était distendu par des vents, le pouls plein et fort, les pieds étaient froids. Une saignée dissipa promptement cette attaque : le même accès se renouvela plus de cinquante fois avec plus ou moins de force dans moins d'un mois, sans toutefois amener une grande perte de forces, bien qu'on ne pût diminuer ou dissiper les accidens qu'à l'aide de la saignée. *Hoffmann* défendit des saignées si fréquentes, et surtout du bras ; il conseilla les pédiluves tièdes, les lavemens huileux et carminatifs, des poudres tempérantes, etc. Bientôt la malade se trouva un peu mieux ; et s'étant mariée, elle fut dès-lors parfaitement guérie.

Je suis très-porté à croire que le mariage a fortement contribué à la guérison de cette veuve, et cette opinion me confirme dans l'idée d'une affection hystérico-hypocondriaque.

Les aliénations compliquent parfois l'hystérie. *Zacutus Lusitanus* a consigné l'observation d'une jeune personne qui, à la suite d'un amour contrarié, devint hystérique, et tomba ensuite dans une sorte de lycanthropie : elle hurlait comme un loup, mais elle ne se croyait pas changée en cet animal.

Le penchant au suicide peut aussi s'associer aux affections hystériques. *Forestus* nous a conservé l'histoire d'une jeune personne qu'il vit en proie aux accès d'hystérie les plus violens. La malade résolut de périr d'inanition ; mais ce médecin, ayant reconnu la cause de son désespoir, engagea ses parens à la marier selon ses désirs, et la promesse de cet hymen assura sa convalescence.

On trouve dans *Chambon* (tom. II, p. 167) l'exemple d'une jeune femme très-libertine, qui, après un retard de quatre mois, fut atteinte d'accès hystériques, puis de manie, et enfin de convulsions générales, auxquelles elle succomba.

La réunion de l'hystérie et de l'épilepsie offre une des complications les plus fâcheuses : elle est heureusement assez rare. J'en emprunte un exemple au docteur *Maisonneuve*. (*Observation analysée.*)

Élisabeth **, d'une forte constitution, d'un caractère très-turbulent et presque maniaque, naquit de parens sains et aisés. A quelques fièvres

intermittentes près, sa santé avait toujours été bonne jusqu'à douze ans, époque où elle éprouva un premier accès épileptique, occasionné par la peur qu'elle eut d'une poupée. Conduite à la Salpêtrière, elle y fut traitée par les bains, les saignées, et eut peu d'attaques jusqu'à 13 ans.

L'écoulement menstruel parut alors accompagné de beaucoup de maux d'estomac; il fut régulier pendant quinze mois, et durant tout ce temps elle n'eut pas un seul accès. De retour dans sa famille, un retard de deux mois ramena les accidens, pendant huit jours consécutifs, à cinq ou six reprises.

Elle fut ramenée à la Salpêtrière, où elle est depuis deux ans et demi. Ses accès sont relatifs, pour la fréquence et l'intensité, à l'état des règles. L'accès arrive tantôt subitement, tantôt après des symptômes précurseurs, étourdissemens, agitation, sentiment de strangulation, puis chute, perte de connaissance, contraction tétanique des muscles, des membres, de la tête qui se penche en arrière, mouvemens convulsifs par intervalles, tension de diverses parties. Les yeux sont ouverts, fixes, louches, des tremblemens, des agitations, des mouvemens violens de tout le corps se succèdent; la respiration est laborieuse et bruyante, le visage rouge; les jugulaires sont gonflées; il y a peu d'écume à la bouche; le pouls est insensible. Par instans, la

malade frappe sa tête avec force à poings fermés; et délire. Les accès sont plus ou moins forts; il s'y joint quelquefois une tension partielle des muscles de la face; ce qui rend le visage hideux. D'autres fois le cou se gonfle, la figure est livide, etc.; et alors il y a beaucoup d'écume à la bouche.

Cette maladie nous offre très-probablement l'exemple d'une complication hystérico-épileptique; toutefois elle présente bien aussi quelques rapports avec les hystéries épileptiformes dont nous avons parlé pag. 81 et suiv.; mais ce qui nous décide à reconnaître dans ce cas l'existence d'une complication, c'est d'abord l'opinion d'un observateur tel que M. *Maisonneuve*, et la cause première de la maladie, la frayeur, d'où provient si souvent l'épilepsie. La réunion de ces deux maladies a pu être méconnue, et aura conduit quelques praticiens à les identifier. Pour reconnaître la complication, il faut une attention réfléchie et des recherches multipliées; par cet examen, on découvrira peut-être les causes spéciales de l'une et l'autre affection, leur invasion successive ou même simultanée, ce qui doit être beaucoup plus rare; enfin leurs symptômes respectifs, etc. Nous les exposerons incessamment en parlant du diagnostic de l'hystérie.

M. P**, praticien très-distingué, assure que l'hystérie, qui résiste aux moyens rationnels, ou

qui se perpétue faute de traitement, ou par une sorte d'habitude, dégénère à la longue en épilepsie. Cette assertion me paraît un peu hasardée, et surtout beaucoup trop générale; je pense au contraire que les accidens, dépendans de la sensibilité organique de la matrice, s'affaiblissent ou se dissipent souvent faute d'aliment, c'est-à-dire par la cessation de la vie particulière à l'organe qui en était le foyer. Les exemples que nous avons rapportés pages 81 et 83 en sont la preuve, et la saine physiologie nous semble devoir confirmer cette opinion, ainsi que les faits que nous avons rapportés à l'appui.

L'aphonie pourra compliquer cette névrose, quand surtout celle-ci aura été causée par la suppression des menstrues : cette complication est spécialement produite par les rapports sympathiques qui existent entre l'utérus et le larynx (1); mais si l'aphonie est incomplète, si elle

(1) Cette connexion nous est démontrée par les phénomènes qu'éprouve la voix lors de la puberté, par l'affaiblissement et la perte de cette faculté après l'accouchement. J'ai connu trois jeunes femmes qui avaient chacune un talent très-distingué comme cantatrices, et toutes les trois ont été fort long-temps sans recouvrer pleinement l'étendue de sons qu'elles possédaient avant leurs couches. On peut encore remarquer que, passé quarante-cinq ans, il est fort rare de trouver chez une femme un beau talent pour le chant : nos théâtres n'en offrent aucun exemple, tandis qu'on en voit plusieurs chez des acteurs de cinquante à soixante ans.

dure depuis peu de temps, ou si elle provient de la même source d'où dérive l'hystérie, par exemple la suppression des règles, on doit la considérer plutôt comme un symptôme que comme une complication ; mais quand la perte de la voix est complète, quand son origine est étrangère à la cause d'où est émanée l'affection hystérique, elle forme alors une véritable complication. *Horstius* en cite un exemple.

La matrice étant le siége de l'hystérie, et cette affection sévissant avec une sorte de prédilection chez les femmes vers l'âge de retour, il est présumable que cette double disposition peut favoriser les altérations organiques de l'utérus, d'autant que celles-ci sont un des tristes attributs de cette période, qui, sous ce rapport, est bien justement nommée *époque critique.*

Rapportons maintenant l'exemple d'un désordre extraordinaire, qui peut-être n'a pas été un résultat de l'hystérie, mais dont la marche a été modifiée par cette névrose.

Une dame âgée de soixante-six ans, éprouva, vers sa quarante-sixième année, des symptômes hystériques, tantôt une boule qui se portait de l'hypogastre à la poitrine et au cou, tantôt un sentiment de strangulation et de constriction spasmodique vers le larynx ; d'autres fois il s'y joignait des mouvemens convulsifs avec syncope incomplète. Ces accidens subsistèrent très-

long-temps ; par la suite ils s'affaiblirent, mais leur diminution fut le signal d'un autre ordre de phénomènes. Le ventre acquit un développement qui fit des progrès sensibles pendant plusieurs mois, et resta ensuite stationnaire ; au travers des parois abdominales on reconnut une tumeur dont la nature parut squirrheuse, et dont un des ovaires fut présumé être le siége. Des douleurs vives survinrent dans l'abdomen ; elles partaient de l'utérus qui devint, ainsi que tout l'appareil génital, le siége d'une irritation particulière et d'un écoulement muqueux très-abondant. Cette dame était quelquefois tourmentée par ses vapeurs hystériques ; plus souvent elle était en proie à des douleurs insupportables dans l'abdomen, et surtout vers l'utérus et dans le vagin. Par l'effet des progrès de la maladie, et peut-être aussi par suite des convulsions hystériques, la tumeur du bas-ventre parvint à séparer les muscles droits, à ce point qu'on pouvait la cerner et l'isoler en la saisissant avec le bord cubital de l'une et l'autre main, au travers des tégumens, où elle faisait hernie. Cette dame succomba après de longues souffrances.

L'ouverture nous offrit une tumeur grosse comme la tête d'un fœtus à terme, qui était isolée, mais qui tenait à l'ovaire gauche par un pédicule d'une à deux lignes d'épaisseur, et long de sept à huit pouces. Le kyste ouvert, on

vit une matière huileuse, entremêlée d'adipocire, et en dernière analyse, une petite portion osseuse, analogue au germe d'une dent; et des cheveux bien distincts, dont la quantité fut évaluée à deux onces : c'était le résultat d'une grossesse, ou plutôt d'une conception extra-utérine.

Les complications accidentelles sont encore plus fréquentes, mais n'ont point un rapport aussi direct avec l'affection hystérique. On trouve dans la plupart des recueils d'observations, et particulièrement dans *Hoffmann*, des exemples nombreux de ces complications accidentelles.

Nous bornerons nos citations, en ce genre, aux deux suivantes :

Une femme de quarante ans, sujette à des accès d'hystérie, était du reste bien portante. A la suite d'un effort, le bas-ventre devint dur et tendu; elle éprouvait des douleurs et une angoisse inexprimable vers la région précordiale, des palpitations du cœur violentes et continuelles; le cœur et les deux carotides offraient 130 pulsations dans une seule minute, et, dans le même laps de temps, on ne sentait que 70 pulsations à l'artère radiale. Au bout de quatorze jours, l'ascite survint, l'angoisse et les palpitations cessèrent, mais la mort arriva peu de temps après. (*Reid*, p. 204.) On peut soupçonner ici une hystérie qui a été compliquée et même terminée par une affection organique du cœur ou des gros vaisseaux.

Le docteur *Jacquemin* (*Journ. génér. de Méd.* t. XXX, p. 264) a recueilli le fait très-singulier d'une jeune demoiselle sujette à des convulsions hystériques, qui a eu trois ou quatre fois une éruption de vésicules sur l'avant-bras et la poitrine, de la grosseur d'une châtaigne; lesquelles ont formé, en s'ouvrant spontanément, une plaie semblable à celle des vésicatoires. Il paraît, ajoute l'auteur, que ce pemphigus était héréditaire.

Nous pourrions multiplier de semblables citations; mais les faits précédens feront suffisamment sentir la différence que nous avons établie entre les diverses complications de cette névrose. Nous allons maintenant indiquer la route qui nous paraît la plus propre à guider le praticien dans ses recherches pour parvenir à la connaissance de cette maladie, quand elle existe à l'état de simplicité; dans d'autres cas, pour la distinguer au milieu de ses complications; enfin, pour reconnaître une autre névrose simulant l'hystérie, et pouvant, par suite de cette similitude, donner lieu à des erreurs très-fâcheuses.

CHAPITRE VIII.

Diagnostic de l'Hystérie.

Il importe d'autant plus de bien établir le diagnostic de cette maladie, qu'on admet, en général, beaucoup trop facilement l'existence

des affections hystériques, et surtout de leurs complications. Une femme éprouve-t-elle un léger sentiment de boule hystérique ou un resserrement passager vers le larynx, souvent même un simple accident nerveux, dépendant de toute autre maladie, on proclame de suite qu'il existe une hystérie; mais entre l'influence qu'exerce la matrice sur l'économie et l'altération des propriétés vitales ou du système nerveux de cet organe, la distance est grande. Je le répète, pour qu'on puisse reconnaître la présence d'une affection ou d'une complication hystériques, il faut que les symptômes de celles-ci soient évidens, plus ou moins permanens, et suffisamment prononcés, par la même raison qu'on ne regardera ni comme un catarrhe pulmonaire, ni comme une pleurésie, la toux accidentelle, rare ou momentanée qui survient chez une personne bien portante d'ailleurs, ou atteinte d'une autre affection. Il est encore un autre genre de méprises pour les observateurs superficiels.

Une femme, en proie à une affection grave, se plaint-elle de symptômes nerveux analogues ou identiques à ceux de l'hystérie, on en conclut quelquefois qu'elle est simplement hystérique, et on néglige de reconnaître et par conséquent de combattre l'affection véritable ou la maladie la plus importante, lorsqu'il y a complication.

D'autres fois, l'erreur a pris source dans une

autre cause : on sait qu'un amour contrarié détermine fréquemment l'hystérie, et l'on a considéré, dans quelques cas, comme une affection hystérique, une maladie différente, parce qu'elle provenait d'une inclination malheureuse : telle nous paraît avoir été la méprise qui a été commise dans le cas ci-contre. L'auteur l'intitule : *Hystérie prise pour une phthisie* (1). Je n'affirme point positivement qu'il ait existé une phthisie pulmonaire chez cette malade ; mais je me permettrai, contradictoirement avec l'auteur, de ne point reconnaître une névrose utérine dans l'ensemble des accidens qu'a éprouvés la jeune personne dont il est mention. Il se fonde sans doute, pour désigner ainsi la maladie, sur la cause qui l'a occasionnée ; mais les maladies produites par un amour contrarié ne sont pas toutes identiques, et ne constituent pas toujours l'hystérie ; l'identité de causes n'amène pas toujours les mêmes résultats, de même que l'identité des résultats ne prouve pas toujours la similitude des causes. Je passe maintenant à l'exposition du fait, sur lequel je reviendrai.

« Une demoiselle âgée de vingt-neuf ans, » d'une constitution assez bonne, mais un peu » nerveuse, fut atteinte d'un amour qu'elle

(1) Observation extraite d'un Journal de Médecine. *Paris*, 1811.

» n'osait déclarer, et qui la jeta dans la con-
» somption. Des médecins la crurent phthisique,
» parce qu'elle avait la poitrine étroite, le dos
» voûté, de la toux, du dégoût, les pommettes
» rouges, etc. Le traitement de la phthisie étant
» infructueux, on crut que la maladie était ré-
» duite à une simple affection nerveuse, et les
» eaux minérales furent prescrites »; (l'auteur ne
dit pas quelles eaux minérales) « mais la malade
» y éprouva des symptômes prolongés, et voulut
» retourner dans sa patrie. Elle était alors d'une
» faiblesse extrême; son esprit s'aliéna en quelque
» sorte, et offrit parfois les caractères du som-
» nambulisme; elle conversait par demandes et
» réponses sur les objets qui la frappaient le plus,
» et répondait néanmoins assez juste aux ques-
» tions qu'on lui faisait. Cette altération de l'en-
» tendement revenait par accès irréguliers; l'on
» observa que la malade, qui était taciturne,
» triste, silencieuse durant les intervalles, deve-
» nait véridique, même à son détriment, gaie,
» babillarde, prête à faire un voyage, une partie
» de plaisir, à danser, quoique cela lui fût im-
» possible ». C'est dans ces accès que M. D**, qui
commençait alors à traiter la malade, parvint à
démêler la cause de tout ce désordre. Il ordonna
beaucoup de distractions agréables, l'eau mar-
tiale pour boisson, le jus ou la gelée de bonnes
viandes, et deux à trois cuillerées, par jour,

de teinture d'ellébore dans une tasse d'infusion d'armoise. Après avoir prescrit l'usage de cet emménagogue pendant trois jours de suite, il l'interrompit durant une semaine, et le fit reprendre ensuite. A cette dernière époque, les règles reparurent dès la seconde cuillerée. Le remède fut supprimé; l'appétit, les forces, l'embonpoint se rétablirent, et, un mois après, mademoiselle ** avait enfin recouvré pleinement sa santé.

Je le répète, rien ne me semble justifier le titre d'affection hystérique donné par l'auteur à cette observation, et j'y reconnaîtrais bien plutôt, et d'après son propre récit, une disposition à la phthisie pulmonaire. Je ne vois même aucun des symptômes, non-seulement pathognomoniques, mais même ordinaires de cette névrose; l'état de consomption, la poitrine étroite, le dos voûté, les quintes de toux, la rougeur des pommettes, appartiennent aux lésions des organes pulmonaires, et sont étrangers à l'hystérie. Plus bas l'historien ajoute : « Son esprit s'aliéna en quelque » sorte, et offrit parfois les caractères du som- » nambulisme ». Cette aliénation, cette altération de l'entendement et des facultés morales, caractérisent la manie. Quant aux accès de somnambulisme, je suis porté à croire que c'est tout simplement l'agitation que l'on rencontre chez la plupart des maniaques pendant la nuit.

En résumé, et sauf erreur de ma part aussi, je considère cette maladie comme une disposition à la phthisie (par suite d'un amour contrarié), à laquelle la manie s'est associée : l'une et l'autre affection ont été guéries par le traitement très-rationnel que M. D** a mis en usage.

Mais poursuivons le diagnostic de l'hystérie, sur lequel nous ne présenterons qu'un petit nombre de considérations, afin d'éviter des répétitions inutiles; d'autant que l'histoire de cette maladie, telle que nous l'avons tracée jusqu'ici, peut suffire pour éclairer le médecin quand il aura à prononcer sur l'existence d'une affection hystérique : il devra surtout prendre en considération l'âge de la malade, la cause qui a donné naissance aux accidens, la nature des symptômes idiopathiques, le globe et le clou hystériques, la syncope, qui arrive le plus souvent sans perte absolue de mémoire, le sentiment de strangulation, les mouvemens convulsifs avec accès irréguliers; enfin, l'absence des phénomènes propres aux autres affections qui s'en rapprochent. En effet, ce n'est point sur un seul symptôme isolé que doit reposer le diagnostic des maladies : leurs caractères se déduisent des causes spéciales ou propres à chaque affection, de la marche et de l'ensemble de leurs phénomènes, de leurs complications, de leurs terminaisons, du résultat des moyens curatifs, etc.

Quoique l'hystérie soit facile à distinguer de toute autre affection, on l'a cependant très-souvent méconnue. C'est ainsi qu'on l'a fréquemment confondue avec l'épilepsie. Pour faire éviter dorénavant de pareilles erreurs, nous allons établir les différences qui existent entre ces maladies analogues (1).

---

(1) Il importe à l'humanité, au bonheur des familles et à l'ordre public, que ces maladies soient bien distinguées l'une de l'autre. Combien de fois n'a-t-on pas fait enfermer, dans des maisons destinées aux épileptiques, de jeunes personnes affectées d'hystérie! Quel spectacle pour ces jeunes malades, que celui d'une compagne en proie à une attaque d'épilepsie! et quel chagrin devait leur faire éprouver l'idée d'être réduites au même sort, destinées à la même condition, à devenir à leur tour un spectacle de douleur et d'horrible commisération! Dans un recensement que fit le docteur *Pinel* parmi les personnes du sexe détenues à l'hospice de la Salpêtrière comme épileptiques, ce médecin reconnut un très-grand nombre de jeunes filles et de femmes qui n'étaient qu'hystériques. On sentira combien cette distinction est importante, si l'on réfléchit que beaucoup de jeunes personnes ont été et sont encore, par suite de cette méprise, repoussées de la société dont elles feraient l'ornement, repoussées par leurs parens dont elles seraient le bonheur ou l'orgueil, mais dont le cœur se brise et se dessèche à l'idée d'une maladie..... qui n'existe pas.

PREMIÈRE SECTION.

Différences de l'Hystérie et de l'Épilepsie.

Les circonstances qui amènent le développement de l'une et l'autre de ces affections varient singulièrement. Les causes les plus fréquentes de l'hystérie sont la privation des plaisirs de l'amour, les chagrins relatifs à cette passion, et les dérangemens de la menstruation. L'épilepsie, au contraire, est le plus souvent déterminée par la frayeur. Sur dix femmes ou filles hystériques, neuf le sont par continence; sur dix épileptiques, on en trouvera six, sept, et quelquefois huit qui le sont devenues à la suite d'une peur subite (1). *Ira atque terror inter causas epilepsiæ haud ultimum sibi vindicant locum* (2). HOFFM.

---

(1) Cette dernière assertion paraîtra peut-être hasardée; elle est cependant la conséquence d'une observation attentive et multipliée. Tout récemment encore j'ai soigné une jeune épileptique âgée de douze ans; je demandai si l'enfant n'avait point éprouvé de frayeur, on me répondit négativement; mais de nouvelles informations m'apprirent, au bout de quelques jours, qu'on avait fait une peur violente à cette jeune fille: un vésicatoire sur l'endroit d'où partait l'*aura epileptica* l'a parfaitement guérie.

(2) D'après cette assertion d'*Hoffmann*, on serait porté à croire que la colère est une des causes les plus fréquentes de l'épilepsie; cependant elle n'a contribué au développement d'aucune des histoires particulières qu'il rapporte; et parmi

Sur six observations de mal caduc rapportées par *Hoffmann*, et dont il indique les causes, quatre, suivant son rapport, ont été le résultat d'un effroi subit. La peur, dit *Tissot* (1), est sans contredit la cause qui produit le plus souvent l'épilepsie, et celle qui la renouvelle le plus ordinairement. Sur soixante observations, dont les causes sont exposées dans l'ouvrage du docteur *Maisonneuve*, quarante ont été occasionnées par la frayeur. Mon honorable ami, le docteur *Esquirol*, cite vingt faits pareils, dont huit proviennent d'épouvante (2). Cette névrose succède quelquefois aux aliénations mentales, et spécialement à la manie : l'hystérie, au contraire, n'est presque jamais la conséquence de la folie. Les approches de la puberté et l'âge critique forment l'époque du plus grand nombre des affections hystériques ; tous les âges de la vie sont accessibles aux invasions de l'épilepsie : toutefois l'enfance, plus susceptible des impressions de terreur, en est plus souvent atteinte ; d'où vient sans doute que des auteurs l'ont appelée

---

un assez grand nombre d'épilepsies que j'ai observées, je n'en ai pas trouvé un seul exemple qui fût déterminé par cette affection morale. Enfin M. *Maisonneuve*, dans son intéressant et volumineux recueil, ne la mentionne que deux ou trois fois.

(1) Traité de l'Épilepsie, p. 45.

(2) Art. ÉPILEPSIE, *Dict. des Scienc. médic.*

morbus infantilis ac puerilis. Quelquefois on apporte cette dernière maladie en naissant, ou elle est transmise par les parens; tandis que l'hystérie ne paraît, en général, que long-temps après la naissance, et ne se développe ordinairement qu'aux approches de l'âge pubère, pendant tout le cours de la vie sexuelle et jusqu'à l'époque critique. Il est rare de voir des accidens hystériques au-delà de cette période (qui est à la vérité plus ou moins différée, suivant le tempérament des individus, leurs habitudes, ou la température du climat); au-delà de ce terme, les fonctions et les sympathies de l'utérus s'affaiblissent sensiblement. *Chambon* dit cependant avoir observé des symptômes d'hystérie chez une de ses parentes, âgée de quatre-vingt-quatre ans; mais alors les accidens doivent être peu prononcés. Cette affection est exclusive à la femme : l'épilepsie, au contraire, est commune à l'un et l'autre sexe. L'abus des plaisirs de l'amour, et surtout l'onanisme, feront naître ou aggraveront les attaques du haut-mal, tandis que les accidens de l'hystérie dérivent rarement de cette source. Le premier dépend, dans quelques cas, de l'imitation ou de l'empire de l'exemple; mais l'autre affection en provient plus rarement. Cette influence sympathique peut produire l'épilepsie dans tous les âges; elle est surtout favorisée par la frayeur; ce qui explique pourquoi l'une de ces

maladies est plus que l'autre susceptible de cette sorte de contagion, et plus ordinaire aux enfans et aux personnes du sexe.

On observe, en général, entre l'époque des règles et l'invasion des accès hystériques, une coïncidence très-sensible; tandis que les retours de la menstruation n'influent que très-peu sur les attaques d'épilepsie; cependant celles-ci coïncident chez quelques femmes avec l'époque de l'écoulement menstruel, quand surtout il est irrégulier.

Les changemens rapides de température et les fortes détonnations électriques provoquent bien plus souvent les accès épileptiques que ceux d'hystérie. Les premiers sont plus sous l'influence des révolutions lunaires, et surtout de la nouvelle et de la pleine lune. Toutes les fois que les accidens hystériques ne sont point entretenus par une cause permanente ou très-énergique, ils disparaissent pendant plus ou moins de temps, et ne se reproduisent ordinairement qu'alors qu'une cause particulière vient les renouveler. Souvent, au contraire, l'épilepsie reparaît spontanément, et sans qu'aucun accident la provoque. L'ivresse rappelle parfois l'attaque du mal caduc, mais n'a pas la même efficacité pour la production des accès hystériques: ceux-ci sont ordinairement augmentés par l'inspiration de l'acide acétique, de l'ammoniaque,

de l'éther, etc., qui paraissent prévenir l'invasion ou diminuer la violence des crises épileptiques. J'ai vu cependant un exemple contraire chez une dame hystérique : dès l'instant qu'elle sentait de la constriction vers la gorge, des demi-bâillemens, symptômes qui chez elle étaient communément les avant-coureurs d'un violent accès, si elle respirait de l'éther, elle voyait disparaître de suite ces symptômes, et faisait avorter le paroxysme : quand elle ne pouvait se procurer assez promptement cette liqueur, l'accès se développait avec la plus grande intensité, et se terminait toujours par une évacuation utérine considérable.

Les affections de l'âme tristes et pénibles aggravent les accidens de l'une et l'autre maladie ; mais la moindre contrariété relative à l'inclination de la jeune hystérique suffit pour en renouveler les atteintes. L'habitude des travaux du cabinet est très-défavorable aux épileptiques : si cette habitude se rencontrait chez une personne hystérique, elle n'aurait presque aucune influence fâcheuse sur cette dernière névrose ; elle serait au contraire, comme moyen de diversion, plus propre à en affaiblir l'intensité ou à en éloigner les retours qu'à les aggraver ou à les renouveler.

Dans l'épilepsie, les maux de tête sont habituels ; ils n'existent qu'accidentellement dans

l'autre maladie. La première se rapproche plus des affections convulsives; la seconde se rattache davantage aux vésanies par ses causes, sa nature et ses diverses terminaisons, comme semble le prouver la tendance qu'ont eue les auteurs, et surtout *Sydenham*, à identifier l'hystérie et l'hypocondrie.

Les accès épileptiques sont en général beaucoup moins longs que les paroxysmes hystériques, qui se prolongent parfois pendant toute une journée, et même au-delà. Les premiers, dans le principe, sont rarement très-rapprochés; ils le deviennent quand la maladie est fort ancienne, et plus ou moins disposée à se terminer par la mort.

Mais aussi l'affection hystérique n'a point de retours fixes, constans; et l'on observe, au contraire, presque toujours une sorte de périodicité dans les attaques du haut-mal. Un accès d'hystérie peut être unique ou suivi d'un petit nombre d'autres paroxysmes; dans l'épilepsie, les attaques se succèdent ordinairement avec une intensité croissante, et ne sont annoncées ordinairement par aucun phénomène précurseur; souvent les personnes sujettes à l'hystérie sont averties de l'orage qui les menace par un malaise général, de la constriction vers la gorge, des demi-bâillemens, ou quelques autres accidens, qui sont pour elles un indice certain. Ceux-ci se déclarent

le jour, ou du moins ne les voit-on presque jamais survenir pendant le sommeil; ceux-là se manifestent souvent la nuit, au milieu du sommeil le plus profond, et s'élèvent ordinairement de l'extérieur du tronc ou de l'extrémité d'un membre; les premiers semblent toujours partir de la région occupée par la matrice.

Quand l'épilepsie commence, ou n'a encore acquis que peu d'intensité, souvent on ne remarque qu'une sorte de distraction, un air de préoccupation, avec léger mouvement convulsif qui ne dure que deux ou trois minutes au plus. Un médecin était dans l'état que je viens d'indiquer, et les personnes qui vivaient habituellement avec lui s'en apercevaient à peine; mais depuis son mariage les symptômes ont singulièrement augmenté. La disposition, même la plus légère aux névroses utérines, présente d'autres signes.

Dans le mal caduc, la chute soudaine et brusque de la personne (comme dans la syncope complète), et la perte plus ou moins absolue de connaissance, précèdent l'accès, c'est-à-dire, l'ensemble des phénomènes convulsifs; tandis que, dans l'hystérie, les contractions spasmodiques, et parfois même les mouvemens convulsifs signalent la perte, ordinairement incomplète, de connaissance, et la chute du corps, qui n'arrive que dans les cas les plus graves. Chez les épileptiques, l'écume à la bouche est bien plus ordi-

naire et plus abondante, leurs mouvemens convulsifs sont plus constans et plus universels, cependant plus forts quelquefois d'un côté ou dans les membres thorachiques, les convulsions des muscles de la face sont plus violentes, et la rendent hideuse; le tronc et les membres se roidissent; les bras sont portés dans la pronation ou une extension continuelle; c'est une sorte de roideur et de tremblement tétaniques qui diffèrent encore de l'agitation convulsive propre aux hystériques; chez ces malades, les membres sont tour à tour portés dans la flexion et l'extension, plus rarement dans la pronation et la supination; ils sont agités tous à la fois ou successivement.

On a donné comme caractère distinctif et constant la perte absolue de la mémoire et du sentiment chez les épileptiques, tandis que la femme hystérique conserve presque toujours un souvenir plus ou moins exact de la crise qu'elle a éprouvée; toutefois la perte de la mémoire, dans le premier cas, n'est pas toujours absolue, car dernièrement encore j'ai vu, à assez peu d'intervalle, deux hommes tomber dans les convulsions du mal caduc; au milieu des contractions les plus violentes, de la perte de connaissance et de l'insensibilité la plus complète, du moins en apparence, ils indiquaient manifestement, et tous les spectateurs le reconnurent, la poche de leur

habit dans laquelle était un flacon d'éther. Il me paraît hors de doute que la mémoire subsistait au moins partiellement chez ces individus, dont le paroxysme présenta tous les phénomènes de l'épilepsie. Le flacon qu'ils portaient sur eux prouve que cette affection était sujette à des retours.

Une femme veuve éprouve des accès épileptiques dont elle attribue l'origine à une frayeur vive : ces accès, dont la date est antérieure à son mariage, n'ont pas été diminués par ce changement d'état, ce qui contribue à éloigner l'idée d'une affection hystérique. Autrefois ils s'annonçaient brusquement par une syncope des plus prononcées, par la chute du corps, et s'accompagnaient de mouvemens convulsifs et d'écume à la bouche. Depuis que cette malade a été soumise à mes soins, les attaques sont beaucoup moins fortes, la malade ne tombe plus à terre ; elle a le temps de s'asseoir, et se rappelle en grande partie les accidens qu'elle vient d'éprouver. Ainsi voilà une épilepsie qui a été d'abord avec perte absolue de connaissance, et qui maintenant n'offre plus ce phénomène. Joignons ici un dernier exemple. Une pauvre femme est prise d'une attaque d'épilepsie dans la rue ; elle tenait sur son bras gauche, qui était serré contre sa poitrine, un jeune enfant ; avec le bras droit elle frappait le pavé : tout son corps était en convulsion. On

crut devoir, par prudence, lui ôter son enfant; mais pendant toute la durée de l'accès, cette infortunée, par ses regards, ses cris, et même ses gestes, semblait le réclamer : la mémoire existait donc chez elle.

On peut cependant assurer que la perte de la mémoire et du sentiment est bien plus entière et bien plus ordinaire dans l'épilepsie : en effet, toutes les fois qu'une attaque est complète, le malade est plus ou moins insensible aux irritans les plus forts, et ne conserve le plus souvent aucun souvenir de son accès; dans l'hystérie, la perte de connaissance peut exister, mais la femme est sensible aux divers stimulans, et surtout garde la mémoire des événemens qui lui sont survenus. Ce caractère distinctif, apprécié à sa juste valeur, est un fanal qui concourt à éclairer le diagnostic du médecin.

La physionomie est autrement altérée dans l'un et l'autre cas; dans l'épilepsie, elle est plus ou moins rouge; à la fin de l'accès, elle est sombre, affaissée, et annonce une sorte de stupeur; les yeux sont renversés; dans l'autre affection, la physionomie est en général moins rouge, moins bouleversée, et revient plus tôt à son état naturel; les yeux sont animés, égarés, souvent recouverts par les paupières. Le pouls des épileptiques est ordinairement plus fort, plus développé; ceux-ci respirent manifestement : chez les fem-

mes hystériques la respiration paraît suspendue. Dans le haut-mal seul, en général, on remarque la contraction comme tétanique du pouce dans l'intérieur de la main; l'hystérique éprouve presque toujours une constriction très-forte avec gonflement vers la gorge, et des douleurs de poitrine et d'estomac, dont elle désigne le siége en portant les mains sur ces parties. Les épileptiques restent ordinairement dans le même cercle; ils n'exercent qu'une locomotion très-peu étendue. On voit des femmes hystériques tomber, se relever ou changer de place plusieurs fois de suite; elles perdent et recouvrent successivement le libre exercice de leur entendement. Dans ce dernier genre d'affection, il y a des rémissions qui durent quelques instans ou des heures entières, et d'autres qui se prolongent pendant plusieurs jours; de sorte qu'on peut considérer les accidens ou comme une suite d'accès, ou comme un paroxysme très-violent, interrompu par des rémissions d'une longueur indéterminée. Rarement, pour ne pas dire jamais, l'attaque d'épilepsie offre-t-elle des intermissions aussi prononcées : celle-ci est en général plus courte et plus violente que le paroxysme hystérique. A la fin des accès, les femmes ont l'air de se réveiller; elles éprouvent des borborygmes et des écoulemens vagino-utérins étrangers à l'épilepsie. Les envies fréquentes d'uriner, l'in-

continence d'urine pendant l'accès, l'issue d'une urine limpide, et les évacuations utéro-vaginales, leur sont du moins plus familières.

Plus on examine les causes, la nature, les symptômes, etc., de ces deux maladies, mieux on apprécie leurs différences. Tout annonce dans l'hystérie une affection essentielle de l'utérus, à laquelle le cerveau participe quelquefois, mais d'une manière peu intense et momentanée; tandis que l'observation la plus attentive nous démontre au contraire, dans l'épilepsie, une lésion constante et plus ou moins profonde de l'organe cérébral, sans aucune participation de l'utérus; lésion presque toujours idiopathique, quelquefois cependant sympathique, du moins dans le principe de la maladie. Les attaques d'épilepsie exercent sur les facultés de l'entendement une influence consécutive très-marquée : l'altération ou plutôt l'abolition des facultés intellectuelles, la perte de la mémoire et même l'idiotisme en sont souvent la suite; les traits grossissent, les yeux restent hagards, et la physionomie hébétée (1). Les paralysies, la cécité, les affections comateuses, les hydropisies mortelles, sont fré-

(1) Ceci nous donne raison du grand nombre de figures laides qu'on rencontre parmi ces malades; tandis que, parmi les hystériques, on compte beaucoup de femmes d'une physionomie agréable et jolie, d'un caractère sensible, aimant et aimable.

quemment déterminées par l'épilepsie, et longtemps avant le terme ordinaire de la vie humaine. L'hystérie conduit quelquefois à la phthisie, à l'hypocondrie, à la manie érotique ou à la nymphomanie (1).

Lorsque les personnes sujettes à l'affection épileptique succombent après des attaques violentes et rapprochées, on trouve le plus souvent des lésions ou des traces d'un désordre très-sensible dans l'organe cérébral. C'est ainsi que le docteur *Hébréard*, dans son excellent mémoire sur la *Gangrène*, couronné par la Société de Médecine de Paris, rapporte avoir souvent observé après la mort, sur des épileptiques, des portions de cerveau noires et gangréneuses; il ajoute que l'état des parties voisines semblait démontrer que cette desorganisation était ancienne (2). On peut

---

(1) On trouve un exemple de cette dernière conversion dans les *Éphémérides des Curieux de la Nature* (*Déc. III*, *ann. I*, *obs.* 12); il est intitulé ÉPILEPSIE; mais pour nous c'est une hystérie. *Epilepsia diuturna virginis, post congressum cum viro sublata, sed eo denegato, posteà in furorem uterinum mutata.* Il s'agit ici d'une demoiselle qui depuis dix ans passait pour épileptique; elle fut guérie de ses accès par le conseil d'un empirique, qui lui garantit que l'union des sexes était le remède souverain de cette affection; mais séparée par la suite de son amant, elle devint sujette à la fureur utérine ou nymphomanie.

(2) Peut-être pourrait-on révoquer en doute cette dispo-

consulter sur cet objet *Morgagni*, *Mekel*, *Borrichius*, *Tissot*, *Esquirol*, *etc.*

Nous verrons au contraire, dans la suite de ce travail, que chez les hystériques le cerveau reste constamment intact, quand leur maladie est exempte de complications, et que le désordre, lorsqu'on en rencontre, existe presque toujours dans l'utérus ou dans les ovaires.

L'épilepsie se complique avec les aliénations mentales, et surtout avec la manie et l'idiotisme. Le plus souvent cette complication est mortelle, ou au moins incurable; l'hystérie compliquée de manie est rare, et cette complication, quoique grave, n'est pas ordinairement rebelle aux efforts de l'art : en général, les complications de l'épilepsie sont bien plus dangereuses que celles de l'hystérie. Dans les cas de complication de l'hystérie et de l'épilepsie, la distinction des phénomènes propres à chacune des deux maladies n'est pas aussi facile à établir, et c'est peut-être cette difficulté qui a contribué en partie à les faire méconnaître ou confondre, soit que leurs accès se succèdent, soit qu'ils se manifestent simultanément.

Un caractère distinctif très-marqué se tire encore de la différence de leur pronostic. Souvent

---

sition gangréneuse du cerveau, et n'y voir qu'une altération profonde du tissu cérébral.

l'épilepsie est incurable, et tôt ou tard elle conduit à la mort; tandis que l'hystérie est très-accessible aux secours de l'art bien dirigés, à l'empire de la médecine morale ou des moyens de diversion, et se guérit presque toujours dès que le vœu de la nature est rempli; de plus elle s'affaiblit avec l'âge : *Maximè ætatis mutatione certissimè debellatur.* Bagl. Le contraire s'observe presque constamment dans la névrose épileptique. On concevra facilement ce qui rend l'une de ces maladies beaucoup plus grave que l'autre, si l'on se rappelle que, dans la première, c'est le cerveau altéré dans sa texture qui réagit en quelque sorte sur toute l'économie; tandis que dans l'hystérie, au contraire, l'utérus n'est lésé que dans sa sensibilité organique, et c'est de cet organe que dérive très-probablement et communément l'irritation de tout le système nerveux.

L'union des sexes est souvent le remède spécifique des affections hystériques, de toutes celles qui reconnaissent pour causes un amour contrarié, une continence volontaire ou forcée, et qui sont dans la proportion de sept ou huit sur dix : de plus, l'exercice, les voyages, le séjour à la campagne, les moyens de diversion préviennent ou contribuent fréquemment à dissiper les vapeurs hystériques. Quelquefois les plaisirs de l'amour physique n'augmentent ni ne dimi-

nuent les accès épileptiques; dans d'autres cas, ils les modifient en bien, mais le plus souvent ils les aggravent d'une manière sensible, ce qui tient aux diverses circonstances et à la nature des causes efficientes. L'abstinence des liqueurs est bien plus importante dans cette affection que dans l'autre. Les antispasmodiques, tels que la valériane, et surtout son extrait, la pivoine, l'huile animale de *Dippel*, l'huile de térébenthine, l'opium, l'oxide de zinc, la cautérisation, et les autres moyens qui quelquefois affaiblissent et même dissipent les attaques d'épilepsie, n'ont pas une égale influence sur les accidens de l'hystérie; celle-ci cède souvent aux emménagogues et aux moyens propres à rappeler le cours des règles, quand leur dérangement a produit la maladie; celle-là est plus rarement guérie par l'éruption ou les retours du flux menstruel. Quand l'*aura epileptica* s'élève de l'extrémité d'un membre, en comprimant ou en attirant avec force la partie ou le point de départ au moment de l'accès, on le fait en quelque sorte reculer; du moins est-il vrai qu'on peut souvent le retarder, ou même le diminuer: de semblables tentatives seraient inutiles et déplacées contre les paroxysmes de la névrose utérine.

Éloignez les hystériques des réunions où elles peuvent rencontrer des hommes ou celui dont elles sont éprises; interdisez-leur la lecture des

livres érotiques et la vue de tous les objets qui exaltent l'imagination et les sens; faites-leur entendre le langage de la raison; enfin dirigez leur esprit vers les idées religieuses et les principes d'une saine morale, et vous obtiendrez la diminution, ou peut-être la guérison des accidens : en tenant la même conduite envers les personnes atteintes d'épilepsie, vous n'en retirerez, dans tous les cas, aucun avantage. Le traitement moral peut donc revendiquer de nombreux succès dans l'hystérie; il est sans but et sans application dans les affections épileptiques.

Les caractères de ces deux maladies, tels que nous les avons établis, ne peuvent se rencontrer que dans l'hystérie et l'épilepsie très-intenses; mais, pour les bien distinguer, il nous a fallu prendre ces deux affections parvenues à leur plus haut degré, et non leurs nuances les moins prononcées, et comparer un grand nombre d'histoires particulières, afin d'en bien saisir les caractères généraux, les vrais phénomènes distinctifs.

DEUXIÈME SECTION.

Différences établies entre l'Hystérie, l'Épilepsie les Convulsions, etc.

Les convulsions diffèrent également de l'hystérie et de l'épilepsie par leurs causes, leurs phénomènes, leurs terminaisons et les moyens curatifs qu'on y oppose et qui les modifient. Nous voyons en effet que les convulsions reconnaissent des causes différentes et très-multipliées; les plus fréquentes et les plus spéciales sont les efforts de la dentition, les dispositions vermineuses, le travail de l'accouchement, la piqûre d'un nerf, l'impression du froid, l'éruption difficile des maladies, comme la variole, la rougeole, etc. Ces causes sont presque étrangères à la production des deux autres névroses : les convulsions, très-communes, ainsi que l'épilepsie, à l'un et à l'autre sexe, se manifestent, par prédilection, chez les enfans, quelquefois dans la jeunesse, très-rarement dans l'âge adulte; elles se bornent le plus souvent à un petit nombre d'accès plus ou moins prononcés. L'hystérie offre des retours plus ou moins fréquens; ceux de l'épilepsie sont, en général, plus nombreux, plus réguliers, et se rapprochent avec l'âge.

Qui ne sait que l'épilepsie offre communément, chez un grand nombre de malades, une intensité à peu près égale. Les convulsions, qui sont par-

fois précédées de symptômes avant-coureurs, et les accès hystériques sont tantôt plus, tantôt moins prononcés. L'attaque du haut-mal ne se prolonge, dans le plus grand nombre de cas, que pendant dix, vingt et trente minutes; la durée des accès convulsifs et celle des accès hystériques sont indéterminées, mais elles persévèrent en général plus long-temps. On voit les premiers céder, suivant les circonstances, à la section complète d'un nerf, à l'enlèvement d'une pièce d'os, d'une esquille, etc.; aux bains tièdes, aux antispasmodiques, aux vermifuges, à l'application des sangsues chez les enfans, à la saignée chez les femmes pendant le travail, etc.; souvent ils se terminent par la sortie de quelques vers, par la pousse de quelques dents, par l'invasion des maladies éruptives, quelquefois par une parotide critique, comme j'en ai vu dernièrement un exemple chez un jeune enfant; plus souvent par des évacuations abdominales copieuses, par des hémorrhagies ou des éruptions critiques. Un premier accès de convulsions est souvent mortel; l'hystérie ne se termine presque jamais d'une manière funeste; dans l'épilepsie, au contraire, le malade succombe fréquemment, mais au bout de plusieurs années, et après des attaques fort multipliées. Si nous examinons le siége des altérations organiques que l'autopsie met en évidence chez les personnes qui ont péri

par suite de ces maladies, nous verrons qu'il diffère également. A la suite des convulsions il varie singulièrement, et beaucoup plus que dans les autres maladies, en raison des causes qui sont plus nombreuses. Tantôt on trouve les intestins corrodés et perforés par des vers; tantôt les gencives sont soulevées, gonflées et phlogosées; d'autres fois on rencontre un engorgement sanguin vers le cerveau, un épanchement dans une cavité, ou un corps étranger engagé dans quelque partie, etc. etc. Du parallèle de leurs terminaisons on peut conclure que le prognostic de l'hystérie est constamment favorable, sauf quelques exceptions extrêmement rares; que celui des convulsions est presque toujours incertain, et que dans l'épilepsie le médecin doit en général porter un jugement très-fâcheux. Enfin nous dirons que le traitement de l'hystérie et des convulsions est subordonné à la cause qui leur a donné naissance; tandis que celui de l'épilepsie est plutôt relatif à la nature même de la maladie, et communément étranger à la cause qui l'a produite.

D'après cet exposé, nous ne croyons pas devoir, à l'exemple d'un savant accoucheur (1), appeler *épilepsie hystérique* les convulsions qui se manifestent pendant le travail de l'enfantement, quoique les muscles de la vie nutritive et de

(1) Traité des Accouchemens, par M. *Gardien*.

la vie de relation soient affectés simultanément, et qu'il existe perte de connaissance et de sentiment. Les mouvemens convulsifs qu'éprouvent les femmes en couches diffèrent de l'hystérie en général, et même des accès hystériques qui se manifestent chez les femmes pendant la durée de leur grossesse. Les premiers sont produits par le travail de l'accouchement ; ils ne sont point sujets à des retours, et ne s'accompagnent point des symptômes caractéristiques des attaques d'hystérie. S'ils diffèrent de celle-ci, ils ont encore bien moins de rapports avec celle-là, dont la cause, la durée, le traitement, etc. etc., sont tout autres.

On doit, suivant nous, les considérer comme des convulsions, puisqu'elles sont déterminées presque toujours par l'engorgement sanguin du cerveau. D'ailleurs, elles ont une marche différente de celle des deux autres maladies, et se dissipent constamment aussitôt après la fin de l'accouchement, soit spontanément, soit par la saignée, quand leur terminaison est favorable ; ce qui arrive le plus souvent.

Nous admettons, avec MM. *Pinel* et *Gardien*, comme un des symptômes caractéristiques de l'épilepsie, la perte de connaissance et de sentiment ; mais il faut de plus, suivant nous, la succession des accès et l'ensemble des symptômes qui sont propres à cette affection spasmodique.

Enfin, avec *Rivière*, nous distinguerons l'hystérie de l'apoplexie par une perte des sens et du mouvement moins complète, par une respiration peu ou point stertoreuse, et le souvenir que conservent les femmes hystériques. A ces traits distinctifs nous croyons pouvoir ajouter les suivans. L'apoplexie attaque indistinctement tous les sexes, et surtout les personnes d'un âge avancé, ou celles qui joignent à beaucoup d'embonpoint un tempérament sanguin, etc. Dans ce cas, il existe un état comateux, la locomotion est abolie, et les mouvemens convulsifs sont moins fréquens et moins prononcés.

En traçant le parallèle de ces diverses maladies, nous avons fait pressentir l'opinion qu'on doit se former de l'issue probable de l'hystérie; voyons maintenant plus en détail les circonstances propres à modifier le jugement que le médecin en devra porter.

CHAPITRE IX.

Pronostic de l'Hystérie.

Il existe une grande différence entre le jugement prononcé par les médecins de l'antiquité et celui des modernes, sur les diverses terminaisons dont cette névrose est susceptible. Le pronostic des anciens dut être plus fâcheux, soit parce qu'elle offrait réellement plus d'intensité dans ces temps reculés, soit parce que nos devan-

ciers jugeaient moins le danger de cette maladie que celui des complications ou des autres affections avec lesquelles des médecins ont pu la confondre. Les accidens de l'hystérie présentent un spectacle vraiment terrible, et capable d'effrayer tous ceux qui, sans la connaître, l'observent pour la première fois; peut-être même cette impression a-t-elle influé sur l'opinion que beaucoup de personnes en ont conçue. Toutefois nous reconnaîtrons que l'honneur d'avoir bien jugé cette névrose peut être revendiqué par *Hoffmann : Ut valdè terribilis hic videtur morbus, in se tamen non adeò periculosus est;* et par *Mauriceau.* Ce dernier nous a conservé l'histoire d'une jeune femme qui n'éprouva qu'un seul accès d'hystérie, et qui depuis lors jouit d'une bonne santé. Telle fut l'inquiétude des parens, qu'ils lui firent apporter l'extrême-onction; mais *Mauriceau* les consola aussitôt en leur assurant que ce n'était qu'une maladie passagère. (Voy. *Mauriceau,* obs. xx.) Si donc plusieurs affections, par une apparence bénigne, inspirent souvent une sécurité perfide, celle-ci, au contraire, est, par le désordre dont elle s'accompagne, propre à faire naître, dans bien des occasions, des craintes exagérées.

Passons maintenant en revue les diverses circonstances qui peuvent modifier l'opinion qu'on doit se former sur la terminaison de l'hystérie.

Un âge peu avancé, que l'on considère en général, et avec raison, comme une disposition favorable à l'issue heureuse des maladies, n'offre pas le même avantage dans le cas présent. En effet, l'observation semble avoir démontré que cette affection, considérée exclusivement sous le rapport de l'âge, est quelquefois plus grave, plus intense et plus rebelle lors des approches de la puberté et dans les premières années qui lui succèdent, qu'à des époques plus éloignées : ce qui dépend de l'exaltation des sens ou du système utérin particulière à cette période de la vie, et de l'énergie même de la constitution; souvent aussi de l'intensité des causes. Plus tard, et à mesure que les malades acquièrent des années, les accidens perdent de leur violence (sauf les différences qu'apportent le tempérament et d'autres circonstances); et l'on doit d'autant plus espérer des efforts de l'art ou de la nature, que ces personnes avoisinent ou ont dépassé le terme de la vie départie aux organes sexuels. Un tempérament sanguin, un caractère ardent ou lascif, une organisation très-robuste, sont assez souvent l'indice d'accès violens, tandis que la prédominance du système lymphatique annonce une hystérie peu intense et plus facile à guérir. Toutefois cette constitution lymphatique et débile, que l'on rencontre chez quelques femmes nerveuses, peut leur faire contracter une sorte d'habitude

hystérique qu'il est difficile de déraciner. Quand la terminaison des accès est accompagnée de l'émission du liquide spermatique et d'une sensation agréable, la maladie ne tarde pas à se dissiper entièrement.

Si la jeune malade est condamnée, par état ou par les circonstances dans lesquelles elle se trouve, à l'inaction, à l'isolement ; si elle est privée des moyens de diversion, des consolations de l'amitié, ou exposée à rencontrer l'objet de son inclination ; si enfin ses vœux ne peuvent être exaucés, les chances défavorables prédomineront, l'organisation physique sera fortement affectée, le moral participera bientôt au désordre, et la manie érotique pourra se déclarer, ainsi que nous en avons vu plusieurs exemples. Lorsque l'hystérie a été produite par une cause physique ou morale très-énergique et inamovible, on doit s'attendre à éprouver plus de résistance dans l'application des moyens curatifs. Si c'est la suppression des règles qui a déterminé la maladie, celle-ci sera plus accessible aux efforts de la médecine que l'hystérie, résultat d'un violent chagrin non susceptible d'être affaibli ou détruit.

Mais quand une inclination raisonnable est la cause morale des accidens, quand nul obstacle ne s'oppose à l'hymen désiré par la jeune personne, que le vœu de la nature est rempli, il ne reste le plus souvent aucune trace de cette affection. En

général, si la maladie est récente, on doit espérer un prompt rétablissement ; mais lorsque l'hystérie est développée depuis long-temps, le pronostic sera moins favorable, parce qu'il est à craindre que la malade ne soit sous l'empire d'une sorte d'habitude. L'expérience apprend que cette névrose simple et peu intense est plus facile à guérir que celle dont les accès sont violens ou qui est compliquée; cependant l'intensité des accès n'ajoute que très-peu aux craintes que peut inspirer l'hystérie. Quand il s'y joint une complication, le danger relatif à cette dernière doit modifier le pronostic. Si la maladie persévère, la cause connue étant enlevée; si elle est rebelle aux soins les plus éclairés, aux ressources de l'art les mieux éprouvées, ce qui n'arrive que très-rarement, on doit craindre alors qu'elle ne soit entretenue par quelques altérations dans le tissu des organes génitaux. L'examen de ces divers désordres fera le sujet des considérations que nous présenterons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE X.

Autopsie cadavérique.

Pour bien connaître les altérations organiques que produit l'hystérie, il faut consulter les anciens auteurs qui peut-être ont été plus à même de l'observer exempte de complication, et se terminant par la mort. De nos jours, cette affection, lors-

qu'elle est simple, n'est presque jamais mortelle (1); mais l'hystérie peut conduire à d'autres maladies qui sont funestes, et dont les traces mises en évidence par l'autopsie cadavérique sont le plus ordinairement étrangères à l'affection hystérique, et souvent même aux organes qui en sont le siége principal; on ne pourrait donc en tirer presque aucune induction relative à l'hystérie, ou applicable aux modifications qu'elle apporte dans l'organisation. *Riolan*, *Binninger*, *Blancardus*, *Vésale*, *Diemerbroeck*, *Morgagni*, ont tous vu les ovaires plus ou moins altérés, remplis, ainsi que les trompes, d'un liquide de différentes couleurs, de densité variée, et plus ou moins augmentés en volume.

Ainsi *Riolan* dit, *in Anthropographiâ*, avoir reconnu chez les jeunes filles hystériques les ovaires remplis par une liqueur *spermatique*, et surpassant la grosseur du poing : de plus, la trompe était agrandie et très-dilatée. Rappelons aussi que *Vésale* (lib. V, *de hum. corp. Fabricâ*, cap. 15) affirme avoir observé, dans des occasions analogues, les ovaires de la grosseur d'une balle à jouer, et remplies d'une humeur fétide,

---

(1) L'observation que nous avons rapportée page 70, est la seule qui nous ait offert une terminaison aussi funeste, terminaison qu'on aurait sans doute prévenue, si on avait secouru la malade.

de couleur variable; et suivant *Binninger* (cent. II, obs. 90), les ovaires, les vaisseaux spermatiques et les trompes étaient gonflés, et remplis d'une matière en partie stéatomateuse. Nous dirons encore que *Blancardus* a consigné, dans son *Anatomie pratique*, obs. 55, l'ouverture d'une femme qui avait été sujette aux passions hystériques, et dont le mésentère était parsemé de glandes squirrheuses, de volume et de forme différens. Un liquide, ressemblant à du lait coagulé, distendait l'utérus, les ovaires, ainsi que les trompes. Si *Diemerbroeck* annonce qu'il a rarement rencontré quelques altérations dans l'utérus, il convient cependant avoir vu cet organe et les ovaires gonflés par une liqueur spermatique épaissie.

Enfin *Morgagni* rapporte quatre observations d'ouverture de femmes mortes hystériques : deux de ces observations lui sont particulières.

I. Une femme, qui menait une vie débauchée, mourut dans un accès d'hystérie : on trouva, 1°. un petit globe attaché par un court pédicule à la face postérieure du fond de l'utérus; il était de la couleur, de la grandeur et de la forme d'une petite cerise avant sa maturité; 2°. un pareil globe, dans l'épaisseur des parois de l'utérus; 3°. le col de cet organe enflammé superficiellement; 4°. une mucosité blanchâtre, renfermée dans les trompes; 5°. les cellules de cha-

que ovaire distendues et pleines de sérosité ; une seule de ces cellules contenait un pus blanc.

II. Une autre observation est celle d'une femme très-libertine, et qui, depuis quatre mois que ses menstrues étaient supprimées, était sujette à des accès d'hystérie ; elle devint maniaque, et mourut ensuite dans des convulsions universelles. On reconnut que les ovaires étaient durs, blancs, squirrheux, d'une grandeur inégale, appliqués comme par leur poids à l'utérus ; le fond de la cavité de cet organe était enduit d'une mucosité sanguinolente, et à la surface, il s'élevait de petits tubercules, semblables à des verrues.

III. Une fille fut ouverte en 1667 ; elle avait succombé à la suite d'accès hystériques ; on ne trouva d'autre cause de mort que du sang coagulé dans les ventricules du cœur.

IV. Chez une dame tourmentée depuis plusieurs mois par des vapeurs violentes, et morte dans une syncope, on découvrit dans le ventricule gauche un polype de la longueur d'un doigt, et épais de trois lignes.

Parmi ces divers désordres que nous a montrés l'autopsie, plusieurs peuvent appartenir aux complications : qui sait d'ailleurs s'ils étaient effet ou cause de la maladie? Dans l'une et l'autre hypothèse, ces observations ne sont ni assez complètes, ni assez exemptes de complications pour nous permettre d'en tirer aucune consé-

quence positive. Dans les affections nerveuses des viscères abdominaux, des poumons, du cœur et des organes génitaux, l'autopsie cadavérique se tait, et ne répand le plus souvent aucune lumière. Le flambeau qui conduit l'anatomiste ou le médecin dans le labyrinthe de l'organisation humaine ne leur est fréquemment d'aucune utilité, lors des recherches qu'ils font pour connaître la cause immédiate de ces névroses; tandis que dans les altérations organiques de ces viscères, dans leurs engorgemens ou inflammations, l'autopsie jette au contraire le plus grand jour, et rend raison de presque tous les phénomènes morbifiques, soit réguliers, soit anomaux, que l'on observait pendant le cours de la maladie. Or, comme il arrive fréquemment, qu'on n'aperçoit dans ces mêmes parties, chez les femmes hystériques, aucune disposition différente de l'état ordinaire, on doit considérer les altérations que l'on a observées quelquefois comme des phénomènes qui peuvent avoir été produits par l'hystérie, ou en être tout-à-fait indépendans, et qui, dans un très-petit nombre de circonstances, ont pu donner naissance à cette névrose. Cette explication est également applicable aux cas de complication, puisque alors les altérations, dans le tissu des organes, sont indépendantes des accidens hystériques, et existeraient lors même qu'il n'y aurait

pas complication d'hystérie, mais ne se rencontreraient pas dans les cas d'hystérie simple. De tous ces faits on peut conclure :

1°. Que l'hystérie, le plus souvent, existe sans aucun changement perceptible par nos sens, dans les organes génitaux de la femme;

2°. Qu'elle peut même se manifester pendant très-long-temps chez une personne, sans apporter aucune altération dans les organes intérieurs de la génération; et c'est ce qui arrive le plus ordinairement;

3°. Que cette névrose peut déterminer, ou très-promptement, comme dans le fait rapporté page 70, ou lentement (*voyez* les pages 141 et suiv.), des lésions organiques, et que parmi ces désordres on doit placer au premier rang les altérations du tissu de l'utérus ou de ses annexes, et surtout celles des ovaires.

4°. Que ces lésions organiques peuvent exister primitivement, et l'hystérie venir s'y joindre ou en être le résultat; ce qui n'est pas très-fréquent. L'hystérie serait alors consécutive.

5°. Enfin que ces deux maladies, l'hystérie et une altération organique de l'utérus, peuvent toutefois exister simultanément; ce qui constitue une complication.

CHAPITRE XI.

Traitement général de l'Hystérie.

Pour bien réussir dans le traitement d'une affection quelconque, il faut en avoir approfondi l'histoire entière, les causes, les degrés et les terminaisons, enfin ses variétés et ses complications ; il faut avoir observé la maladie tantôt abandonnée à elle-même, tantôt combattue par les moyens que l'art recommande de lui opposer : aux résultats d'une observation exacte et judicieuse il faut joindre un jugement sain et un esprit exempt de prévention et dégagé de toute idée systématique. Fort de ces avantages, le médecin marche d'un pas plus assuré dans la carrière ; heureux quand l'affection qu'il doit combattre est accessible aux secours de la médecine, et ne le réduit pas aux moyens palliatifs, au rôle de consolateur, à calmer les souffrances physiques et les peines morales, sans espoir d'en détruire la cause ou d'en arrêter les effets. L'hystérie, par bonheur, n'est pas du nombre de ces dernières affections ; il est même peu de maladies dont le traitement fasse plus d'honneur à la science que celui de cette névrose ; presque toujours le médecin en découvre la cause qui était cachée ou ignorée, dissipe les inquiétudes des parens et justifie leur confiance par une prompte guérison.

Le traitement de l'hystérie se divise en préservatif, en curatif et en consécutif (ou prophylactique des rechutes). On distingue en outre le traitement des accès et celui de la maladie.

Examinons d'abord les moyens préservatifs de la maladie et des accès.

PREMIÈRE SECTION.

Traitement préservatif de la maladie.

Le traitement préservatif de l'hystérie est en quelque sorte une introduction aux moyens de curation de la maladie elle-même : il est entièrement du ressort de l'hygiène, et consiste essentiellement à écarter les dispositions et les causes déterminantes de cette affection. La médecine prophylactique n'existe point à la rigueur, car on ne peut combattre une maladie non encore formée ; mais elle existe réellement, quand on la considère comme l'art d'éloigner les causes qui dérangent notre économie, de prévenir un désordre qui n'est qu'imminent, ou des altérations d'un degré à peine perceptible.

Ces préceptes prophylactiques sont d'une telle importance, qu'on ne saurait trop se persuader de leur utilité, ni assez les recommander.

Le premier conseil que le médecin doit donner, est de veiller avec intérêt au développement physique et moral des jeunes personnes, de fortifier

leur constitution lorsqu'elle est débile ; de leur prescrire l'exercice et des promenades fréquentes, ou un séjour prolongé à la campagne.

On leur permettra les plaisirs de la danse, pourvu qu'elle ne soit ni lascive ni portée jusqu'à la fatigue ; on insistera, en outre, sur l'exercice à cheval ou sur un âne, quand les circonstances le permettront.

Le travail de la menstruation revendique aussi notre sollicitude ; il faut en favoriser l'apparition, puis en régulariser le cours avec tout le soin possible : c'est surtout aux approches de la puberté qu'il importe d'observer les jeunes personnes : si la constitution physique annonce une force suffisante, si déjà les formes se prononcent, il faut opposer aux premiers accidens qui signalent le travail de la menstruation les moyens que prescrit la saine pratique : tels sont la vie active, les pédiluves tièdes, les bains de fauteuil rendus irritans et pris le soir ; l'application de serviettes chaudes sur l'hypogastre ; les frictions sèches sur les lombes et les membres abdominaux ; les infusions d'armoise, etc. Si les symptômes produits par la pléthore sanguine persistent avec intensité, on a recours aux sangsues, que l'on fait appliquer à la vulve, aux jambes ou aux cuisses, quelquefois à une saignée de la veine saphène. Souvent ce désordre revient périodiquement chaque mois ; il est alors conve-

nable de choisir pour cette opération l'époque indiquée par les efforts de la nature.

Quand les règles sont arrêtées par la présence d'une membrane contrenature, il faut l'inciser, pour donner issue au flux menstruel.

Lorsqu'il existe une suppression, une déviation, ou même une diminution des règles, on les rappelle par les moyens usités en pareil cas.

L'abus de la bonne chère, les caprices de l'appétit, la vie sédentaire, peuvent retarder ou déranger cet écoulement, et doivent être remplacés par un bon régime et un exercice journalier.

A la pléthore sanguine générale, ou à une congestion, un afflux du sang vers l'utérus, on oppose les rafraîchissans et la saignée du bras quand les menstrues ont cessé de couler, ou s'il existe une ménorrhagie. Au contraire, lorsque les règles manquent, et quand l'aménorrhée tient à la faiblesse de la constitution qui n'est point en rapport avec l'âge de la jeune personne, il convient d'avoir recours aux fortifians, à l'eau ferrée, aux eaux minérales ferrugineuses, à une nourriture succulente, aux vins d'absinthe et de quinquina. aux infusions de safran, d'armoise, aux différens emménagogues, aux bols d'extrait de quinquina, de gentiane, de cannelle, de limaille de fer. Chez les jeunes personnes d'un tempéra-

ment lymphatique, ou disposées à la chlorose, on seconde ces moyens par les frictions sèches ou irritantes pratiquées sur les lombes, le bassin et les extrémités inférieures. Plus tard, on met en usage les bains sulfureux et les commotions électriques à la circonférence du bassin.

Existe-t-il une pâleur et une débilité presque incompatibles avec une nourriture saine et fortifiante, et avec l'intégrité des organes, il faut craindre alors l'influence sourde et pernicieuse des habitudes que le mauvais exemple ou de perfides conseils font trop souvent contracter. On éveille en même temps, mais avec ménagement, la sollicitude des parens, qui, par une vigilance active et les avis du médecin, arrêtent les funestes effets de l'onanisme. Cette fatale habitude est malheureusement très-répandue, et surtout dans les réunions de jeunes personnes. Lorsque le médecin veut insinuer qu'il serait possible que les accidens dépendissent de cette cause, on rejette presque toujours cet avertissement; il doit alors demander aux parens qu'ils veillent avec soin et qu'ils s'assurent que ses craintes ne sont pas fondées. C'est encore une précaution utile que de faire connaître aux jeunes personnes les circonstances qui dérangent si fréquemment leur santé en troublant le cours naturel de la menstruation.

Comme la conduite et la moralité de la jeu-

nesse dépendent presque toujours des premières impressions qui lui sont communiquées, les parens ou les instituteurs doivent être convaincus qu'ils ne sauraient trop surveiller les compagnes ou les suivantes qu'ils placent près de leurs enfans, ni apporter assez de soin pour empêcher les mauvais exemples, les conversations dangereuses, les expressions trop libres; en un mot, tout ce qui exalte l'imagination; qu'ils cherchent surtout à gagner leur confiance, et à leur inspirer par la douceur et la raison ces principes de morale qui sont les germes de la vertu, et d'où dépend souvent le bonheur de toute la vie. Sans la religion, on peut voir naître ces heureuses dispositions, mais alors elles sont plus rares et plus étonnantes. Aussi les parens ont-ils constamment lieu de se féliciter lorsqu'ils fortifient l'esprit de leurs enfans de toute la puissance que donne la morale religieuse, si douce et si entraînante, quand elle est conforme aux principes de l'Évangile.

Lorsqu'une jeune personne douée d'une grande susceptibilité éprouve un vif chagrin, il faut écouter ses doléances et la plaindre : en paraissant partager sa peine on lui procure déjà une sorte de consolation. Est-on chargé de lui apprendre un événement malheureux, on évite une précipitation dangereuse, et on ne l'en instruit que par degrés et avec discrétion; il serait même

prudent, avant de lui faire une pareille confidence, de s'assurer qu'elle n'est pas à l'époque de ses règles.

Outre une société choisie, des mœurs douces, l'habitude de modérer les élans d'une sensibilité trop vive, d'une imagination trop ardente, on doit conseiller aux jeunes demoiselles un exercice raisonné de leurs facultés intellectuelles; des lectures bien dirigées, et une application non continue aux arts ou aux sciences.

Lorsque leur constitution est développée, que le flux menstruel s'est manifesté, qu'il est régulier, il faut prendre en considération les besoins de leur âge, et s'ils se font sentir impérieusement, le mariage sera le préservatif le plus assuré des affections hystériques.

DEUXIÈME SECTION.

Traitement préservatif des Accès.

Pour empêcher le retour des accès chez les personnes sujettes à cette névrose, il faut éloigner d'elles les causes qui ont coutume de provoquer ces paroxysmes; de plus, on leur conseillera un bon régime, une vie active et régulière, des vêtemens chauds et une température douce; on les engagera encore à éviter les refroidissemens et les dérangemens de la transpiration ou des autres sécrétions.

L'expérience indique souvent aux personnes hystériques les moyens de s'opposer à l'invasion d'une attaque ; chez l'une l'inspiration de l'éther amène cet heureux résultat ; pour une seconde, c'est un autre agent. On écarte de ces malades les objets qui produisent sur les organes des sens des impressions très-vives ou antipathiques. On pourrait à la longue, et par une habitude progressive ou une ferme volonté, vaincre ces antipathies ; mais tant qu'elles peuvent donner lieu à des accidens, il faut préserver les femmes de leur influence, afin d'en faire éviter les résultats.

Les efforts du médecin doivent aussi avoir pour but de prévenir les causes morales d'où proviennent ordinairement les accès : on sait combien la sensibilité des femmes nerveuses est facile à irriter, et avec quelle promptitude une sensation trop brusque peut occasionner de nouveaux troubles. Il convient donc d'apporter le plus grand soin à leur épargner toute surprise brusque et inattendue, soit terreur, crainte, ou même plaisir, et spécialement les peines qui résultent des obstacles qu'on oppose à leur inclination, à leurs passions amoureuses. Quand les désirs de la jeune personne ne peuvent être accomplis, il faut employer les ressources les mieux éprouvées d'une diversion agréable, la société de quelques personnes d'un caractère

gai, pour qui elle ait de l'amitié, des récréations, des jeux, des promenades variées, etc. On s'efforcera, du reste, de donner aux affections de l'âme et aux facultés intellectuelles une direction conforme aux principes que nous établirons plus loin. Mais passons au traitement spécial de l'hystérie, qui présente deux indications générales : 1°. l'on doit combattre les accès, 2°. s'efforcer de guérir la maladie elle-même en prévenant ses retours.

TROISIÈME SECTION.

Traitement des Accès.

En général, les accès du premier et du second degré sont rarement dangereux, et on peut alors surveiller seulement les malades; mais on serait blâmable de négliger les moyens propres à dissiper les paroxysmes, quand surtout ils sont parvenus à une très-grande intensité.

L'étude et l'application de ces moyens constitue la première indication générale; mais convenons aussi que le traitement des accès offre des points de contact si intimes et si multipliés avec celui de la maladie elle-même, qu'ils semblent très-souvent se confondre.

Le médecin appelé auprès d'une femme en proie à une atteinte d'hystérie doit faire enlever tous les objets qui pourraient devenir causes de

contusion ou de blessure. Il s'assure ensuite qu'il n'existe aucune ligature, aucune compression autour de la poitrine, de l'abdomen ou des extrémités.

C'est une sorte d'inspiration qui porte ordinairement les personnes qui approchent ces malades à leur ôter tous les vêtemens trop serrés, ou à les mettre en liberté dans leur habillement. L'air qui les environne doit être pur et frais : c'est pourquoi, loin de les renfermer ou de les environner d'un grand nombre de spectateurs, il faut au contraire les exposer à l'air extérieur, pourvu que la température ne soit extrême ni en chaud ni en froid; éloigner les personnes inutiles, et procurer, autant que possible, du calme à l'esprit : on place la malade sur un lit ou sur des matelas étendus par terre; on a soin de lui tenir la tête élevée; on cherche à maîtriser ses mouvemens sans avoir recours à la violence. Si cependant la durée ou l'intensité de l'accès rendait ces précautions insuffisantes, il serait indispensable d'employer un vêtement contentif, une sorte de gilet de force ou de longue chemise dont les manches et l'extrémité inférieure seraient attachées aux parties correspondantes du lit.

On essaie de diminuer l'intensité de l'accès en comprimant d'une main la région épigastrique, et de l'autre, en soutenant le dos : M. *Chambon* prétend avoir réussi dans quelques cas par ce

procédé. L'inspiration des substances aromatiques ou volatiles, des eaux de Cologne, de mélisse, de l'éther, et même de l'ammoniaque, pourra être essayée, mais avec ménagement, puisqu'elle agit, chez beaucoup de ces malades, d'une manière défavorable : quelquefois on a employé, dans la même intention, la vapeur de plumes ou de cuir brûlés; on frictionne les tempes avec des eaux spiritueuses; on applique sur le front des compresses trempées dans l'oxycrat, etc. etc. L'usage indique de recourir en même temps aux potions calmantes, dans lesquelles on fait entrer l'extrait gommeux d'opium, le sirop diacode ou le laudanum, le musc, la teinture de succin et de castoréum, ou même l'assafœtida, et surtout le sirop d'éther.

Pourrait-on employer les sternutatoires, fondé sur ce que l'éternuement fait cesser parfois l'accès? *Sternutatio si superveniat, citò paroxysmum claudit.* Mais en attribuant la cessation du désordre à l'éternuement, n'a-t-on pas pris l'effet pour la cause? Comme cette pratique est exempte d'inconvéniens, on pourrait toujours en faire l'essai, d'autant que *Horstius* rapporte une observation qui paraît en confirmer les avantages. Ce médecin fit souffler dans le nez d'une femme en proie aux accidens hystériques du castoréum et du poivre : elle éternua; l'accès fut terminé au même instant, et dès-lors elle n'eut plus d'at-

taque. Les linimens narcotiques peuvent amener un résultat favorable; on s'en sert pour frictionner la partie antérieure du cou, la colonne vertébrale, l'épigastre, le bas-ventre, et particulièrement la région hypogastrique. On les compose diversement. Celui ci-joint nous a paru, chez quelques malades, agir avec efficacité :

Huile d'amandes douces...	℥ j
Camphre.....	ʒ j
Gouttes de *Rousseau*.....	℥ ß
Éther sulfurique.....	ʒ ij.

Forestus a fait cesser un paroxysme en faisant frictionner la vulve avec un liniment composé d'huile de lis, de musc et de safran; mais pour dissiper la maladie, ou prévenir le retour des accidens, il donna le conseil aux parens de marier la jeune personne, qui était jeune, jolie, et très-disposée aux plaisirs. Le fait suivant semble déposer fortement en faveur de la teinture de castoréum : une jeune fille, âgée de treize ans, éprouvait à chaque quart d'heure des convulsions dans l'œil droit, la bouche et les extrémités inférieures; les paroxysmes se renouvelaient jusqu'à quarante fois par jour, etc. Cette terrible épilepsie hystérique (ou mieux *hystérie épileptiforme*) fut dissipée d'une manière surprenante par l'usage de la teinture de castoréum. (*Éphém. déc. II, ann. II, observ.* 150.)

Les embrocations aromatiques et calmantes faites sur l'hypogastre, sur le creux de l'estomac et le cou, ont amené un soulagement qui appartient, suivant quelques auteurs, autant aux frictions faites avec la main qu'à la nature des médicamens dont se composaient les embrocations.

Un lavement d'oxycrat, au rapport de *Rivière*, a terminé sur-le-champ une attaque violente. Un égal succès suivit l'application sur l'épigastre d'une compresse trempée dans le même liquide, et prescrite par ce praticien. C'est ainsi que *Diemerbroeck* a vu réussir les odeurs fétides inspirées par le nez, et les emplâtres préparés avec les gommes de la même nature et mis sur l'abdomen.

Albert. Bottonus accordait une grande confiance à la vapeur d'une poudre composée avec les excroissances verruqueuses qui viennent aux pieds des chevaux, et qu'on fait dessécher au four. On trouve dans *Chambon* (chap. 54) l'indication de plusieurs remèdes qui ont reçu de beaux éloges, mais contre lesquels l'expérience et le raisonnement doivent tenir en défiance. Les injections de laudanum dans le vagin ont réussi à notre célèbre *Bichat;* et les lavemens avec un gros d'assa-fœtida ont été recommandés par les docteurs *Pinel* et *Duvernoy*, qui en ont retiré quelques avantages.

Mais a-t-on suffisamment multiplié les obser-

vations pour s'assurer de l'efficacité de ces différens procédés ou agens? et n'a-t-on pas pris pour leur effet salutaire la fin naturelle et spontanée de l'accès qui coïncidait avec leur administration? Il faut attendre, pour prononcer sur leur degré d'utilité, des applications plus nombreuses, faites sans prévention et dans des cas d'hystérie bien constatés.

Lorsque les paroxysmes sont portés à une très-grande violence, que la vie des malades semble menacée, que les premiers efforts de l'art ont été infructueux, il faut alors recourir, en outre des moyens précités, aux aspersions et applications de vinaigre, d'eau froide ou de glace sur la tête, aux lavemens purgatifs, aux topiques irritans, tels que les linimens avec l'ammoniaque, aux vésicatoires, aux ventouses scarifiées, ou bien au moxa appliqué de préférence à la nuque ou sur les lombes.

Mais concurremment avec les agens physiques, on emploie les moyens moraux, qui souvent pourraient revendiquer à eux seuls tout l'honneur du succès. Il importe de soustraire ces malades à tout ce qui peut provoquer chez elles les affections pénibles de l'âme ou exalter leur sensibilité morale; car non-seulement les contrariétés, les chagrins sont à redouter, mais souvent même les impressions agréables trop brusques ajoutent à la susceptibilité, et doivent être écar-

tées avec le plus grand soin. On interdira également ces sensations mixtes qui se composent d'un mélange de douleur et de plaisir : telles sont, par exemple, toutes les circonstances qui sont propres à retracer des souvenirs douloureux, mais dont l'âme aime à se repaître, et dont le résultat constant est de rendre plus exquise notre susceptibilité.

Parmi les causes morales qui peuvent rappeler un accès d'hystérie, il en est qui sont amovibles, ou au moins susceptibles d'être affaiblies; et c'est contre celles-là que le médecin peut agir avec espoir de succès, soit en les dissipant, soit en atténuant l'impression qu'elles ont produite.

Si la présence d'un jeune homme détermine ou entretient chez une de ces malades un paroxysme hystérique, on doit engager un des deux individus à quitter momentanément la société où ils se trouvent réunis. Il arrive ainsi fréquemment qu'une attaque très-intense, et qui aurait pu se prolonger long-temps, diminue de suite, et se dissipe bientôt entièrement. Souvent alors la prudence conseille aux jeunes personnes de s'éloigner promptement avant que l'orage éclate : tantôt toute retraite leur est impossible; d'autres fois un sentiment impérieux et presque irrésistible les retient, en quelque sorte malgré leur volonté.

Quelques femmes très-nerveuses ont parfois

excité les accidens en s'attachant à contempler, soit des monumens de tendresse et d'amitié, soit des gages d'amour : nul doute que le meilleur remède ne consiste à leur dérober la vue de ces objets.

Chez d'autres personnes, les pratiques religieuses, celles consacrées aux pompes funéraires, ont ramené les paroxysmes hystériques. Dans ce cas, on recommandera aux malades de ne pas assister à ces cérémonies, qui excitent presque toujours des émotions trop vives.

De mauvais procédés ou des propos injurieux ont parfois renouvelé un accès que l'absence ou l'éloignement de l'agresseur et les consolations de l'amitié pourront terminer. Si on appréhende, à la suite d'un mouvement de colère, un semblable désordre, il faut, pour le prévenir, détruire les effets de l'emportement, paraître applaudir au juste ressentiment de la personne offensée, lui accorder que ceux qui l'ont contrariée ont eu réellement les plus grands torts, mais qu'ils en seront punis, ou qu'ils s'en repentiront spontanément, lorsque la réflexion viendra les éclairer sur leur conduite. Par cette précaution, on modère, on amortit les premiers élans d'une âme irritée : il suffit souvent de parer le premier mouvement de la colère pour la voir ensuite se dissiper spontanément (1).

---

(1) Tel fut le mobile de *Philocrate*, contre lequel les Athé-

Si la présence d'une autre femme excite un sentiment de jalousie propre à ramener de nouveau l'orage, c'est à ceux qui peuvent le prévoir à le conjurer en invitant cette personne à se retirer, quand toutefois le conseil est praticable.

Les moyens de diversion, ceux surtout qui résultent d'une conversation ou d'une promenade agréable et variée, sont toujours applicables dans les intervalles que laissent entre eux les différens paroxysmes d'une même attaque.

QUATRIÈME SECTION.

Traitement de l'Hystérie.

Le traitement spécial de la maladie doit embrasser trois objets principaux, savoir : les moyens moraux, le régime physique, qui comprend les lois de l'hygiène ; enfin la partie des médicamens. Cette division n'est que théorique, et le plus souvent on fait simultanément concourir au même but ces trois bases principales de la thérapeutique.

Avant de considérer isolément chacune de ces

---

niens étaient fort irrités. On lui demanda pourquoi il ne se présentait pas pour se justifier : « Il n'est pas encore temps, dit-il. — Et quand pensez-vous qu'il en sera temps ? — Quand j'aurai vu, répliqua *Philocrate,* faire le procès à quelque autre citoyen.

trois grandes divisions de la méthode curative, nous allons indiquer d'abord quelques principes généraux.

Le mode de curation doit varier suivant une foule de circonstances qu'il importe au médecin de prendre en considération.

L'âge, le tempérament, la constitution, l'idiosyncrasie, l'époque de la puberté, l'état de virginité, de nubilité, le lien conjugal ou une union illégitime; les phénomènes propres à l'apparition des règles, leurs anomalies, leur suppression, leur cessation naturelle ou accidentelle, précoce ou tardive, l'état des forces vitales et des affections morales, l'empire de l'habitude, le degré ou l'ancienneté de la maladie, enfin la nature de la cause qui l'a produite; toutes ces circonstances apportent de nombreuses modifications dans l'emploi des moyens de curation.

C'est la promptitude à déduire de ces nuances diverses les conséquences les plus justes qui signale le praticien supérieur.

Le médecin s'empressera de rechercher la cause des accidens : si elle n'est pas évidente, il se tiendra sur ses gardes, et se rappellera qu'elle peut être ignorée ou même dissimulée par la malade et les personnes qui l'entourent. Souvent la réflexion et les renseignemens qu'il a soin de recueillir mettent au jour la vérité; s'il existe un mystère dont l'amour-propre soit le mobile,

il cherche adroitement à le pénétrer, en provoquant la confiance, et en promettant une discrétion absolue ; mais il doit respecter le secret d'une famille, s'il en est le dépositaire, ou ne point solliciter un aveu qu'il serait pénible d'accorder.

La connaissance de la cause est fréquemment le point capital, ou le premier pas à faire dans le traitement des maladies, et surtout des névroses.

Souvent la découverte d'une cause dissimulée a mis en évidence la sagacité du médecin, et lui a assuré une réputation distinguée. La pénétration d'*Erasistrate* près d'Antiochus, celle de *Galien*, dans une circonstance analogue, ont contribué à rendre leur nom immortel.

Si cette névrose provient d'une hémorrhagie supprimée, le raisonnement et l'expérience indiquent au praticien quels moyens il devra prescrire. Peut-on soupçonner la suppression d'une leucorrhée habituelle, on cherche à rappeler cet écoulement par les injections stimulantes, et même un peu irritantes, ou par le tamponnement, etc. Mais cette dernière circonstance se rencontre rarement ; c'est une des causes de l'hystérie les moins fréquentes.

Toutes les fois qu'on ne pourra découvrir un dérangement de l'organisation qui ait donné naissance à la maladie, il faut en accuser quelque

inclination secrète ou contrariée, ou la prédominance du tempérament utérin, quand surtout la malade est une jeune personne.

Aussi une des considérations les plus importantes est celle de l'âge, quand surtout on y rattache celle de la puberté, qui est l'époque de la plus grande fréquence des affections hystériques. Souvent alors les accidens sont occasionnés par un amour malheureux, ou par l'empire des organes reproducteurs; d'autres fois l'imagination et l'organisation physique sont très-développées; mais la matrice l'est beaucoup moins : le sang destiné à fournir l'écoulement sexuel irrite cet organe et provoque le désordre nerveux. On peut en acquérir la preuve, si la constitution de la jeune malade est fort avancée, si les seins sont formés, si elle éprouve des maux de tête, des étourdissemens, des saignemens de nez, de la somnolence, des palpitations, des engourdissemens, des coliques, des douleurs aux lombes, de la pesanteur dans les membres abdominaux : il est alors convenable d'employer tous les moyens propres à favoriser l'apparition des menstrues.

Si rien n'annonce ce travail, et spécialement quand le développement de l'organisation physique n'est pas très-précoce, qu'il existe atonie et irritabilité, on oppose dans ce cas les calmans unis aux toniques, les ressources de la distrac-

tion, une vie active et occupée; enfin une nourriture restaurante.

L'âge intermédiaire entre la puberté et l'époque critique n'apporte aucune modification bien notable. A peine l'état de grossesse présente-t-il quelques particularités dignes de remarque : on sait que la sensibilité des femmes se trouve exaltée pendant la durée de ce phénomène; qu'à l'époque des couches et de l'allaitement, les sécrétions sont plus actives. Il importe donc, surtout alors, de ménager leur susceptibilité morale, et de favoriser toutes les fonctions dont le dérangement pourrait donner lieu aux accidens hystériques ou les aggraver.

L'état des règles apporte diverses modifications dans le traitement de l'hystérie; ainsi il faut tenir compte de la quantité de sang que les mois fournissent habituellement; car des menstrues très-abondantes ou une véritable ménorrhagie demandent un mode de curation différent de celui qu'on opposerait à un état de chlorose et d'aménorrhée, ou à une menstruation peu abondante. Rappelons ici que non-seulement toutes les femmes ne sont pas également réglées, et qu'une quantité de sang qui constituerait une perte chez une personne dont les menstrues sont habituellement peu abondantes n'est pour une autre qu'une circonstance ordinaire; mais encore qu'il existe des femmes, surtout lors-

qu'elles partagent les travaux les plus pénibles de l'homme, qui ne sont que peu ou point sujettes à ce tribut périodique. Or, dans un cas semblable, bien que l'application des sangsues pût diminuer les accidens, il serait inutile de s'opiniâtrer à établir un écoulement dont l'absence n'aurait nullement altéré la santé.

Appelé près d'une malade, le médecin doit toujours s'informer de l'époque où les mois reviennent périodiquement, et si leur cours s'opère régulièrement. Toutes les fois que l'ensemble des symptômes n'offrira point un danger imminent, et que la médecine expectante ne pourra aggraver les accidens, on suspendra, aux approches de la menstruation, et surtout pendant la durée de cet écoulement, les moyens actifs ou perturbateurs, lors même qu'ils sont indiqués très-positivement par les phénomènes de la maladie.

On sait que l'émétique, donné pendant le cours des menstrues, peut les arrêter, et produire l'hystérie, ou même de plus grands désordres. Je l'ai vu administrer dans cette circonstance à une femme affectée d'un simple embarras gastrique, qui aurait également cédé aux délayans ou à l'émétique pris quelques jours plus tard. Dans l'action même du vomitif, les règles s'arrêtèrent; deux jours après une hémoptysie survint. La malade négligea de réclamer des soins;

le sang continua d'affluer vers la poitrine, et détermina une phthisie mortelle.

L'émétique, administré à l'époque des règles, les a quelquefois provoquées ou fait reparaître; mais ce résultat n'est rien moins que constant, et la prudence doit engager à ne conseiller cet agent, surtout dans l'intention de les rappeler, qu'à des femmes douées d'une bonne constitution, et lorsque les moyens plus généralement avoués auront échoué.

Si l'on doit éviter l'époque des règles pour l'emploi d'un médicament capable d'en arrêter le cours, il faut au contraire saisir les approches de cet écoulement pour l'administration des moyens propres à le favoriser ou régulariser. C'est ainsi que les sangsues, par exemple, quand leur application est convenable, doivent être mises peu de jours avant l'apparition des menstrues, ou mieux, immédiatement après leur terminaison. Dans le premier cas, elles les rendent souvent plus abondantes; dans le deuxième, elles suppléent à la quantité de sang qui n'est pas sortie, ou les font reparaître de nouveau. Toutefois je pense que le moment le plus opportun pour ces sortes d'opérations est indiqué par la cessation du flux menstruel, quand celui-ci n'a pas été suffisant.

L'étude des tempéramens mérite également une attention spéciale. En général, c'est le tem-

pérament nerveux qui prédomine chez les personnes affectées d'hystérie : tantôt il est joint à une constitution molle et lymphatique, qui semble devoir exclure une sensibilité physique très-vive; tantôt on l'observe uni à une organisation très-sèche. On voit de ces femmes nerveuses qui sont dans un état d'irritation continuelle : le grand air, le froid, la chaleur, le vent, la pluie, tout ce qui excite en elles une impression, une sensation même opposée, leur est incommode, leur cause une excitation vive, importune. Le moral participe de cette disposition physique; presque toujours il reçoit l'impression, plus rarement il la communique. Ces anomalies de la sensibilité nerveuse influent sur le traitement et sur le résultat des moyens curatifs. En général, les bains tièdes, les délayans, l'usage du lait, un régime doux, les potions calmantes et huileuses, ainsi qu'une température égale et modérée, réussissent aux personnes pourvues d'une organisation sèche et irritable; tandis que les femmes dont la constitution est molle et lymphatique respirent communément avec avantage un air vif et agité, et se trouvent bien d'un sol aride, couvert de plantes aromatiques, d'une nourriture succulente, du vin pur, et d'un mélange raisonné de médicamens toniques et calmans.

Il est rare de rencontrer la prédominance du

tempérament musculaire chez les femmes hystériques, sinon parmi celles qui vivent habituellement à la campagne. Quant au système sanguin, il s'annonce, chez plusieurs de ces individus, par le coloris du visage, un pouls fort et des règles abondantes; il réclame une nourriture légère et végétale, les boissons délayantes, parfois le régime antiphlogistique, les saignées, etc. Un de mes confrères a soigné une dame douée d'un tempérament sanguin, pour une hystérie violente, dont les accès se reproduisaient tous les jours périodiquement à la même heure. Il fit précéder, pendant trois jours consécutifs, l'époque de l'invasion par une saignée du bras : dès-lors les accidens n'eurent plus lieu, et la malade fut entièrement guérie.

L'état des forces vitales doit encore influer sur le choix des mesures thérapeutiques; mais les conséquences qu'on peut en déduire sont faciles à saisir, d'après les réflexions que nous a fournies l'examen des divers tempéramens.

Il faut quelquefois, lorsque la constitution est très-affaiblie, s'occuper avant tout de rétablir l'énergie vitale. L'observation suivante nous en fournit la preuve. Une jeune personne, contrariée dans ses affections, devient hystérique; de fréquens accès se manifestent à des époques variées : ils sont caractérisés par une syncope incomplète, par des convulsions, une sorte de

trismus, des douleurs locales ou clous hystériques, le sentiment de strangulation, le mouvement oscillatoire ou la boule mobile, une sorte de frémissement dans la région hypogastrique, et fréquemment terminés par l'issue d'une sérosité qui lubrifiait les parties génitales, et l'émission d'une grande quantité d'urine claire et limpide. Divers médicamens, choisis parmi les antispasmodiques, sont mis en usage; et malgré leur emploi et un bon régime, la débilité fait des progrès, les règles se suppriment, la poitrine commence à s'affecter : il existait un péril imminent.

Les parens consentent enfin à l'hymen, objet des vœux de cette demoiselle; mais avant de le faire contracter, on s'occupa de dissiper le désordre, que la satisfaction morale diminua bientôt; on lui prescrivit de bons toniques, un régime restaurant, l'air de la campagne et un exercice modéré. Lorsque les forces furent rétablies, on sollicita le retour des règles, et l'hymen consolida bientôt la santé de la jeune malade.

Mais lorsque l'hystérie (ce qui n'arrive presque jamais) se prolonge même après l'accomplissement de l'union qui était désirée, il faut examiner si cette affection n'a pas été produite par une cause qui n'existe plus, mais dont les effets subsistent encore, ou si elle n'est pas en-

tretenue par le fait seul de son ancienneté ou par l'empire de l'habitude.

Pour qu'une maladie se perpétue par suite de cette influence, il faut qu'elle présente des intermissions ou une continuité de symptômes indépendans de la cause qui a produit le désordre. On sait que l'habitude, à notre insu, et souvent même contre notre volonté, nous entraîne à des actes qui ont eu lieu précédemment, par le fait seul de leur réitération antécédente. Dans d'autres cas, elle est favorisée par des circonstances particulières qui établissent une propension presque irrésistible vers ces mêmes actions.

Pour rompre le pouvoir de l'habitude, il convient d'écarter toutes les causes propres à en seconder l'action : ces causes sont, en général, les affections pénibles de l'âme, et tout ce qui les rappelle, le trouble des sécrétions, etc.

On doit, en outre, donner une autre direction aux facultés intellectuelles et aux mouvemens physiques; changer le régime, les rapports habituels; conseiller un voyage qui provoque de nouvelles sensations, etc.

Mais ces considérations ne sont pas les seules qui influent sur le traitement; le degré ou le caractère de la maladie le modifie souvent aussi : c'est ce que nous mentionnerons plus particulièrement en examinant les avantages qu'on peut espérer

des ressources de l'hygiène, et de l'application des médicamens à la curation de l'hystérie.

CINQUIÈME SECTION.

Hygiène.

En exposant l'histoire des causes, nous avons annoncé quelles étaient les circonstances qui favorisaient ou pouvaient déterminer cette névrose; nous avons ainsi fait pressentir l'utilité d'un bon régime, d'un sage emploi de nos forces, et d'une juste mesure dans nos rapports avec les objets extérieurs, en un mot, d'une vie régulière. Nous pourrions, en outre, indiquer ici quelques règles de conduite, comme nous l'avons fait en traçant le traitement prophylactique; mais devant développer ces considérations en traitant de la cure des affections hypocondriaques, et ces considérations étant susceptibles d'une double application, nous nous bornerons, en ce moment, à quelques principes généraux.

On recommandera aux jeunes personnes et aux femmes hystériques l'écart des causes qui aggraveraient leur état; on leur conseillera des vêtemens chauds, afin d'éviter les dérangemens de la transpiration, etc.; une habitation salubre; dans la belle saison, l'air de la campagne; une nourriture saine, légère, restaurante, plutôt qu'excitante; des boissons appropriées aux accidens, la bière, l'eau rougie; dans quelques cas,

le vin rouge; rarement les vins spiritueux de Lunel, de Malaga, de Madère, ou seulement à dose très-modérée.

Ne permettez pas que ces malades s'abandonnent à un repos trop absolu ou à l'oisiveté : exigez au contraire que leurs journées soient remplies par des occupations simples et variées, par des récréations convenables, par des promenades dans lesquelles on cherchera toujours à se proposer un but; c'est le moyen d'affaiblir ou de dissiper la passion dominante.

Otia si tollas, periére Cupidinis arcus. OVIDE.

SIXIÈME SECTION.

Médicamens.

Nous sortirions des limites que nous nous sommes imposées, si nous considérions ici avec détail l'application des principaux médicamens au traitement d'une maladie qui ne réclame en général qu'un petit nombre d'agens pharmaceutiques, et seulement dans un petit nombre de cas. Aussi n'examinerons-nous en ce moment que ceux des médicamens qui ont une application plus directe à la curation de cette névrose.

C'est surtout contre les accès du premier et du second degré qu'on dirige parfois avec un succès marqué les moyens intérieurs, et particulièrement les antispasmodiques et les calmans ou narcotiques.

Tous les médicamens revêtus du titre pompeux d'*antispasmodiques*, ont été mis à contribution pour calmer les accidens hystériques; mais leur action tend plutôt à faire cesser le paroxysme qu'à en prévenir le retour. Ils ont en outre si rarement obtenu cet avantage, qu'ils ne méritent qu'une confiance limitée; la liqueur minérale d'*Hoffmann*, l'éther, le musc (de dix à douze grains), le camphre, l'assa-fœtida, et surtout les teintures de succin et de castoréum, sont les plus accrédités, et ne produisent fréquemment d'amélioration sensible qu'alors qu'on les donne au moment où l'accès finit spontanément. La valériane a été également recommandée, bien qu'elle soit plus applicable au traitement de l'épilepsie.

Les calmans ou narcotiques, par petites fractions, sont préférables, quand leur usage est bien dirigé. La potion suivante, ou toute autre analogue, réussit assez souvent, sinon à dissiper, du moins à modérer les accidens :

℞ Eau distillée.....	℥ iij
Extrait gommeux d'opium....	℈ j
Sirop d'érysimum.....	℥ jß
Eau de fleur d'orange.....	℥ ß
Sirop d'éther.....	ʒ ij.

Nous rappellerons en même temps celle consignée dans plusieurs formulaires sous le nom de *potion antihystérique* :

℞ Infusion de fleur de tilleul.....	℥ v	
Sirop de capillaire.....	℥ ij	
Eau de fleur d'orange.....	ʒ iij	
Éther sulfurique dulcifié.....	a^m a g̃ xvj	
Vin d'opium composé.....		
Alcool de succin et de castoréum.	a^m a g^tes xv.	

L'on peut opter entre l'extrait gommeux d'opium, le laudanum, le sirop diacode ou de karabé, et les gouttes dites de l'abbé *Rousseau*, qui ne sont qu'un laudanum renforcé, et qui calment quelquefois, lorsque toutes les autres préparations narcotiques sont impuissantes. La thériaque et le diascordium conviennent surtout dans les cas d'atonie. En proposant les opiacés dans le traitement de cette vésanie, nous ne faisons que déférer au précepte donné par *Hippocrate*, qui conseille le suc du pavot somnifère, *in suffocatione uterinâ* (lib. II, *de Morbis mulierum*, sect. 5, p. 237).

Nous citerons encore la composition suivante, qui a été employée, non sans fruit, par *Rivière* (obs. X) :

℞ Assæ-fœtidæ.....	ʒ ij	
Castorei.....	a^m a ʒ j	
Feculæ bryoniæ.....		
Sem. rutæ.....	℈ j	
Croci.....	ʒ ß	
Laudan. Paracel.....	g̃ viij	

Un gros pour dose.

Les boissons délayantes, prises en trop grande quantité, pourraient déranger les fonctions di-

gestives ; en général, il convient d'ordonner une tisane légèrement amère. C'est pourquoi, afin de parer cet inconvénient, on prescrit une infusion de fleur de tilleul et de feuilles d'oranger, édulcorée avec un sirop acidule, ou avec du sucre et de l'eau de fleur d'orange ; on lui donnera plus d'efficacité, surtout s'il existe de l'irritation, en ajoutant deux ou trois gros de sirop diacode par pinte de boisson, et la teinture de castoréum, de vingt à vingt-cinq gouttes. Un thé ordinaire, ou fait avec les feuilles de mélisse, de menthe, d'hysope, ou les fleurs de coquelicot, obtiendrait les mêmes résultats.

On a proposé, et souvent employé des lavemens préparés avec une dissolution d'assa-fœtida, un gros sur une livre d'eau. Ce moyen doit être considéré comme révulsif et stupéfiant, et peut coopérer à une guérison radicale. L'odeur de cette gomme justifie si bien son nom, qu'on ne peut guère l'employer que de cette manière, ou sous la forme de bols. Nous avons essayé avec quelque succès des demi-lavemens faits avec une forte décoction de graine de lin, et un ou deux grains d'extrait gommeux d'opium. On donnait auparavant un lavement entier, composé avec une décoction tiède de graine de lin, de racine de guimauve ou de têtes de pavot.

L'émétique et les purgatifs ne sont ici que des moyens accessoires, et qui ne sont communément

applicables que dans les cas de complications, et surtout d'embarras gastrique. Leur action contre les affections hystériques est trop secondaire ou indirecte pour mériter un examen spécial. Nous annoncerons seulement qu'on a conseillé depuis peu, contre cette névrose, le traitement modifié de la colique de plomb; mais cette méthode peu rationnelle nous paraît offrir moins d'avantages que l'usage des moyens généralement avoués par le raisonnement et l'expérience, et quelques succès éphémères ne suffisent pas pour faire adopter une innovation qui compte déjà beaucoup de tentatives inutiles, ou même indiscrètes.

Rappelons ici qu'on a proposé l'emploi à l'intérieur des eaux minérales; les plus convenables sont celles de Vichy, de Spa, de Seltz, de Bourbonne, de Plombières, de Barège, de Bagnoles, etc. On ne peut y avoir recours qu'en été, si on veut les prendre à la source. Elles sont indiquées spécialement comme moyens préservatifs, tant à cause du déplacement qu'elles nécessitent, qu'en raison des diverses impressions morales auxquelles le voyage donne naissance.

Jos. Lanzonius rapporte avoir guéri par l'usage du lait d'ânesse deux malades affectées de passion hystérique, contre laquelle tous les médicamens antihystériques avaient échoué. Chez la première de ces malades, âgée de vingt ans, il

prescrivit d'abord un purgatif, et fit continuer le lait d'ânesse, pris le matin à jeun, pendant vingt-quatre jours, à la dose de ℥vj avec un peu de sucre blanc. Ce moyen est au moins exempt d'inconvéniens.

Passons maintenant à l'examen des agens extérieurs.

Les fumigations, les linimens, les fomentations aromatiques excitent l'action de la peau, et tendent à généraliser les forces vitales, lorsqu'on les applique sur une grande surface; et sous ce rapport, ils peuvent contribuer à la guérison de l'hystérie. Les mêmes topiques, rendus narcotiques, ont une application plus directe et plus efficace dans le traitement de cette maladie, comme nous l'avons déjà annoncé.

C'est ainsi que nous avons exposé la marche à suivre pour dissiper l'hystérie qui provenait de la suppression des règles, et toute répétition à cet égard serait inutile. Lorsqu'on soupçonne que le dérangement d'une autre hémorrhagie a donné lieu aux accidens, on s'efforce de les faire cesser en rappelant l'écoulement; si c'est un épistaxis, on en sollicite le retour par les sternutatoires et les fumigations dirigées vers les fosses nasales, ou on le remplace par la phlébotomie du bras. Le même procédé serait indiqué contre l'hystérie qui proviendrait de la négligence d'une saignée habituelle; et l'on tenterait de ramener

un flux hémorrhoïdal supprimé, par l'application des sangsues au fondement.

Un état de pléthore sanguine, agissant comme cause ou comme accident, serait combattu de la même manière, ou par l'usage des boissons acidules et un régime adoucissant. On ne doit pas, en général, pratiquer de saignées aux femmes par la lancette, ni par les sangsues, pendant la durée, ni même aux approches de l'écoulement sexuel; il convient, nous le répétons, d'y avoir recours dans la quinzaine qui succède à ce travail de la nature, plutôt que dans la semaine qui le précède, afin de ne point troubler les efforts de la nature, qui souvent prépare d'assez loin la révolution menstruelle.

Toutes les fois que la phlébotomie est jugée convenable, et surtout lorsqu'il existe un état de pléthore sanguine ou une ménorrhagie, etc., il faut recommander à la personne chargée de cette opération de faire le mouvement d'élévation très-étendu, et d'employer de préférence les lancettes dites à grain d'orge. Faute de cette attention, il arrive souvent que l'ouverture de la veine est très-petite, que la quantité du sang sorti est insuffisante, ou peut-être composée de la partie la plus liquide. Dans les cas d'inflammation, il est préférable, suivant quelques auteurs, d'obtenir par la phlébotomie un sang homogène (proportion égale), plutôt que la partie la

plus fluide d'un sang qui ne sort qu'avec peine par une petite incision pratiquée à la veine. Toujours est-il vrai qu'une saignée faite par une large ouverture qui permet à ce liquide de s'échapper librement et abondamment réussit beaucoup mieux que celle dont la petite ouverture ne laisse pas le sang sortir avec facilité. Dans le dernier cas, la saignée semble agir plus lentement, et d'une manière analogue au mode d'action des sangsues.

Le nombre et la quantité des saignées doivent toujours être subordonnés à l'état de la santé générale, de la constitution, à la fréquence et à la force des hémorrhagies habituelles aux malades.

Quand la femme hystérique est d'un âge à faire présumer la cessation prochaine du tribut périodique, quand déjà cet écoulement est irrégulier, ou lorsqu'il existe de fréquentes ménorrhagies, on se gardera bien de faire appliquer des sangsues à la vulve, ou même au fondement; dans ce cas, et surtout lorsque l'on peut craindre un commencement d'irritation vers l'utérus, la saignée du bras est, sinon la seule praticable, au moins bien préférable. Il faut alors détourner le sang de ce viscère, si l'on veut en prévenir les lésions organiques : nul doute que les saignées du bras et la continence ne constituent le meilleur préservatif de ces terribles désorganisations.

Mais lorsque la femme a franchi cette époque, que les règles sont finies, et quand la matrice est dans un état de calme absolu, si la malade éprouve les symptômes de la pléthore sanguine, on peut alors, après avoir pratiqué une saignée du bras, appliquer des sangsues au siége. Nous avons cru pouvoir exposer ces détails sur l'emploi de la saignée et des sangsues, parce qu'ils ne sont peut-être pas assez généralement connus.

Les bains ont été conseillés dans le traitement de cette névrose, et conviennent spécialement dans l'intervalle des accès : les bains tièdes relâchent et débilitent lorsqu'on y séjourne pendant un temps trop long, ou quand on y a recours à des époques très-rapprochées; mais si leur usage est convenablement dirigé, si on les prend à quelques jours de distance, ils réussissent en général très-bien. On les prescrira de préférence aux femmes nerveuses, sèches ou irritables. Le docteur *Nacquart* m'a cité l'exemple d'une dame sèche, ardente, qu'on tient pendant trois heures, chaque jour, dans un bain tiède : ce traitement dure depuis deux ans, et la malade s'en trouve fort bien; mais il est rare que ces personnes retirent avantage de bains aussi longs et aussi rapprochés. Non-seulement leur température doit être relative à la sensibilité individuelle, depuis 22 jusqu'à 28 et 30 degrés, mais leur usage demande en outre quelques précautions; les ma-

lades, avant de se mettre au bain, doivent être dans un état de calme physique et moral, et s'assurer de la chaleur de l'eau, qu'il ne faut jamais porter, même en hiver, à plus de 30 degrés. A l'issue du bain, elles feront enlever l'humidité qui recouvre le corps, par des frictions pratiquées avec un morceau de flanelle ou avec des serviettes chaudes; de plus, elles auront soin de se vêtir très-chaudement, ou se remettront ensuite au lit le plus tôt possible, afin de favoriser cette douce transpiration que les bains provoquent presque toujours.

Les bains froids très-peu prolongés, ou les immersions réitérées dans l'eau courante, et surtout dans la mer, ont une grande propriété stimulante; mais ils ne sont admissibles que dans les pays chauds, ou lorsque la température atmosphérique est au moins à 20 degrés : ils conviennent surtout aux constitutions lymphatiques.

Mais on peut employer encore d'autres bains, tels que les bains d'eaux minérales naturelles ou artificielles : ceux de Barège, de Bagnères, de Loech en Suisse, d'Aix-la-Chapelle, d'Aix en Savoie, qui sont sulfureux, conviennent comme moyens excitans; ils ont souvent l'avantage de provoquer les règles ou de les rendre plus abondantes. Les eaux de Plombières, de Bourbonne, de Vichy, de Balaruc, jouissent aussi d'une propriété stimulante, mais à un degré moindre. Les

premières ont, en outre, une application directe aux cas d'hystérie compliquée d'affection cutanée.

Lorsque cette névrose est occasionnée par l'irritation ou la répercussion d'une maladie de la peau, on pourrait obtenir beaucoup de succès des bains naturels ou artificiels de Barège, ou des bains sulfureux secondés par l'usage du lait, le régime végétal, et les autres médicamens appropriés au traitement antidartreux.

On trouve dans l'ouvrage du docteur *Chambon* l'exemple d'une femme de soixante-dix ans chez qui une affection, dont le siége avait souvent varié, occasionnait divers accidens, et des accès d'hystérie, quand elle était fixée vers la matrice. Un large vésicatoire et un traitement approprié la délivrèrent de cette maladie.

Mais ces différens médicamens intérieurs ou extérieurs ne sont susceptibles que d'un certain nombre d'applications particulières, et ne peuvent en général revendiquer qu'une action indirecte ou secondaire : le moyen qui offre le plus d'avantages, et dont l'influence est la plus directe et la plus générale, ce sont les plaisirs de l'hymen.

Hippocrate conseille le mariage aux jeunes filles atteintes de vapeurs hystériques ; *Forestus*, *Hoffmann*, *Deïn*, *Reid*, *Boërhaave*, et tous les bons observateurs anciens et modernes, ont adopté ce précepte, que l'expérience la plus con-

stante et la plus authentique confirme tous les jours. On ne peut opposer à de telles autorités qu'une prévention aveugle. *Pomme* soutient, contradictoirement à l'observation la plus journalière, que la virginité, c'est-à-dire, l'état de continence, ne contribue nullement aux affections vaporeuses, et que l'acte conjugal est toujours contraire au tempérament vaporeux. Il est impossible d'émettre une opinion plus paradoxale : *ex uno disce omnes.* Il faut l'avouer, le système de *Pomme* est en général très-dangereux, quoique susceptible d'un petit nombre d'applications utiles; puisqu'il est évident, d'après l'étiologie déduite de la connaissance des faits et l'expérience la mieux constatée, que, dans le plus grand nombre des cas, les rapports sexuels sont le remède assuré de cette affection. L'hystérie que l'on observe parfois, quoique rarement, dans les campagnes, ne réclame pas un autre traitement, quand elle dépend de la prédominance du système utérin. Il convient de s'en tenir à la médecine palliative lorsque la maladie existe chez une femme veuve ou éloignée de son mari, jusqu'au moment où les circonstances fixeront un terme au veuvage ou à l'absence; mais si l'affection hystérique, loin de reconnaître pour cause une continence absolue, dépend au contraire de l'abus des plaisirs, de la fatigue, de l'épuisement des organes génitaux, ou même de

l'onanisme, il faut exiger des malades la plus grande réserve, et leur faire sentir que non-seulement elles compromettent leur santé, mais qu'elles exposent même leurs jours par une conduite aussi honteuse; cette variété d'hystérie ne se rencontre que très-rarement. Telles sont les principales modifications qu'offre ordinairement l'application des agens physiques au traitement de cette névrose; mais quand la maladie est parvenue au troisième degré, lorsqu'il existe un danger imminent, et que tout fait appréhender une congestion cérébrale, il faut alors, *extrema extremis*, appliquer, et de préférence aux jambes, ou mieux aux cuisses, les irritans les plus actifs, les linimens, les sinapismes, les vésicatoires, les ventouses, quelquefois même le moxa, qu'on peut établir à la nuque, quand tout espoir semble perdu. Dans de telles circonstances les saignées dites *dérivatives* sont souvent nécessaires; on prescrit ensuite l'application des sangsues; l'on ordonne en outre les antispasmodiques, les boissons laxatives et les lavemens purgatifs; mais on se gardera d'employer les opiacés qui favoriseraient le *raptus* vers le cerveau.

SEPTIÈME SECTION.

Traitement moral.

Nous nous étendrons peu sur l'application des moyens moraux au traitement de l'hystérie, les

considérations relatives à la médecine morale devant recevoir un plus grand développement lorsque nous exposerons l'histoire des névroses qui ont leur siége dans le système de la digestion; toutefois nous examinerons d'une manière spéciale, 1°. la concordance qui existe entre l'époque des passions produites par l'amour et les révolutions de la vie sexuelle; 2°. les ressources qu'on peut, dans ces cas, retirer d'une bonne direction imprimée aux affections de l'âme et aux facultés intellectuelles.

Avec la puberté naît en nous le premier désir, le premier sentiment de l'amour : tout est vague, incertain avant ce moment, et ne doit être considéré jusqu'alors que comme le fruit d'une imagination déréglée, ou le penchant précoce d'un être dénaturé vers un libertinage hideux; mais quand cet élan est le résultat du développement naturel de nos facultés physiques, et lorsqu'il est bien dirigé, il concourt également au bonheur individuel et à l'avantage de l'ordre social. Plus vif, plus impérieux chez la femme, par suite d'une sensibilité en général plus exquise et d'une organisation particulière, ce sentiment est d'autant plus développé chez elle, que son éducation et ses habitudes lui auront plus tôt présenté ce but vers lequel tendent tous les êtres animés, et que les convenances sociales la forceront davantage à le taire.

Pour amortir l'influence de cette disposition, on peut alors conseiller la fréquentation des bals, des concerts, des spectacles, et de quelques autres moyens de diversion. Ces agens ont parfois une très-grande influence; mais il faut étudier les dispositions morales des individus, car ils peuvent être dangereux pour les uns, et très-utiles pour les autres. Il est aisé de sentir que leur effet sera tout différent chez une demoiselle d'un tempérament peu ardent, mais sensible, à qui l'on veut faire oublier un amour malheureux, qu'elle n'eût pas ressenti, s'il n'avait été provoqué par diverses circonstances, ou chez une autre personne qui n'a point encore formé d'attachement, mais dont l'imagination ardente et un tempérament lascif s'enflammeraient à la vue habituelle d'un homme doué d'un physique avantageux, au récit des passions les plus exaltées, au tableau séduisant de l'amour couronné: dans ce dernier cas, l'habitude des spectacles sera défavorable : l'on devra placer alors la plus grande confiance dans un autre mode de distractions, tel qu'un voyage, de fréquentes promenades, ou un séjour plus ou moins prolongé à la campagne au milieu d'une société choisie; il faut surtout opposer aux résultats d'un amour contrarié le doux charme de l'amitié, et les consolations qu'offre toujours l'union des familles.

Mais si la vue de tous les objets qui parlent

aux sens, si la fréquentation des sociétés nombreuses, des réunions où les yeux sont fascinés, où l'imagination reçoit tant d'impressions érotiques et lascives, favorisent le développement des névroses utérines, qui ne conçoit qu'une vie active, mais douce et tranquille, que le séjour au milieu des champs, qui n'excitent que des émotions paisibles, ne soient susceptibles de calmer les sens, et de rendre la jeune personne à la paix du cœur ?

Souvent il ne suffira pas de mettre sous les yeux de ces malades le tableau des avantages que doivent leur assurer une conduite pure et sans tache, et la pratique des vertus sociales ; il faut de plus faire naître, entretenir ou développer dans leur âme les principes de la religion. Dirigez leur esprit vers les idées religieuses ; faites-y germer les maximes de la plus saine morale, et vous apaiserez l'exaltation des sens, le délire érotique, ou même les accidens de l'affection nerveuse.

Si la malade est une jeune personne, on s'occupe ensuite de son établissement ; les parens doivent sans doute repousser une inclination qu'ils n'ont point permise, lorsque des raisons puissantes s'y opposent ; mais aussi combien n'a-t-on pas vu de ces liens qui semblaient mal assortis sous les rapports d'âge, de caractère, de rang ou de fortune, opérer le bonheur de ceux

qui les ont formés ; et ne sait-on pas que l'hymen qui, s'annonçant sous les auspices les plus favorables, semble réunir tous les avantages, ne produit souvent que de fâcheux résultats. Loin de nous l'idée de conseiller aux parens une déférence aveugle aux désirs parfois téméraires d'une jeunesse irréfléchie; mais qu'ils ne se préviennent pas légèrement, qu'ils soient indulgens, lorsque la raison et leur propre intérêt le leur commandent, et qu'ils se persuadent bien qu'une trop grande sévérité, loin de prévenir les fautes et les malheurs, les entraîne ou les rend en quelque sorte excusables. Combien de jeunes personnes trompées dans leurs espérances, offensées dans leur amour-propre, se sont précipitées dans tous les excès, ou ont péri victimes d'un désespoir horrible, et que la tendresse de leurs parens ou les consolations de l'amitié auraient rendues à la santé, ou rattachées à la vie! L'art d'attiédir une passion inconsidérée a ses règles, ses nuances, ses finesses; loin de leur présenter la séparation comme irrévocable, il faut d'abord ne pas leur ôter tout espoir; on élève avec adresse quelques doutes sur la réussite de leurs désirs; on les habitue à considérer ceux-ci comme le résultat d'une imagination exaltée, et à ne pas voir exclusivement le bonheur dans la possession de l'objet aimé. On leur fait entrevoir de plus grands avantages dans une autre union; on doit les ménager,

et, quand il le faut, les tromper, à quelque prix que ce soit, afin de ne pas irriter leur sensibilité, et de ne pas porter dans leur âme un découragement trop cruel; souvent l'espérance seule diminue la fréquence et l'intensité des accidens, qui, presque toujours, se dissipent spontanément aussitôt que l'hymen désiré par la jeune malade a couronné ses vœux.

Quand l'hystérie est le résultat d'une inclination ignorée des parens ou dissimulée par ceux-ci et la jeune malade, il faut avec prudence en solliciter l'aveu ou chercher à la découvrir.

« Le médecin doit s'introduire dans le cœur » humain pour y voir les désirs, les passions, » les besoins, les sollicitudes, les chagrins, les » attachemens, pour y agir sur les sensations et » les idées, pour examiner enfin ce que peuvent » sur l'économie animale tous les genres de sen- » timent et de pensée ». (*Nouv. Elém. de Thérapeutique*, ALIBERT.)

Tous les développemens de ce principe sont applicables au traitement des femmes hystériques, et sont susceptibles d'une foule de résultats utiles. En se transportant dans l'intérieur des familles, en provoquant la confiance, le médecin parvient à connaître les causes morales qui sont presque toujours secrètes, et obtient les succès les plus brillans, par la seule direction donnée aux facultés mentales.

Les mêmes motifs nous rapprochent ordinairement dans le monde ; les liens du sang et les rapports de l'amitié nous appellent dans la société qui se compose de nos parens, de nos amis et d'un certain nombre d'étrangers. La conformité des habitudes et des convenances amène la confiance entre les individus du même âge et de sexe différent : celle-ci s'établit d'autant plus facilement, que les goûts, les opinions, les plaisirs sont les mêmes, l'intimité succède, et les passions prennent alors naissance. Rarement une jeune personne, quels que soient les rapports sympathiques, éprouve-t-elle subitement une passion violente ; l'impression peut avoir été vive, mais elle n'est pas profondément gravée ; cette demoiselle n'est pas encore familiarisée, identifiée avec l'idée de cette passion ; il est facile aux parens d'en arrêter les effets, quand surtout ils ont habitué leurs enfans à trouver en eux leurs meilleurs amis, et quand de bonne heure ils ont su leur inspirer cette confiance absolue qui ne peut naître que dans un cœur parfaitement libre, ou du moins exempt de craintes.

Ce n'est point une vaine curiosité, mais l'amour de son devoir et le désir d'être utile, qui engage le médecin à connaître l'état moral des personnes qui réclament ses soins ; ces renseignemens sont nécessaires, et influent sur le choix des moyens

curatifs, qui doivent varier selon les circonstances.

Tantôt une jeune personne, affectée d'accès hystériques plus ou moins rapprochés, jouit d'une parfaite tranquillité d'âme, tandis qu'une autre éprouve cette disposition mélancolique, ce vide du cœur qui naît alors presque toujours du besoin de s'attacher; tantôt leur amour est partagé par celui qui en est l'objet, approuvé par les parens; mais le moment de leur union n'est pas encore arrivé, et cette attente seule détermine les accidens, qui, dans ce cas, sont rarement très-intenses.

Trop souvent une inclination contrariée amène un désordre d'autant plus grave, que la sensibilité est plus prononcée, et l'affection morale plus intense. Le médecin doit alors faire connaître aux parens la cause du désordre, les dangers qui peuvent en résulter, et les avantages certains qu'obtiendrait leur condescendance aux désirs de la jeune malade. Si cette union leur paraît inconvenante, il les engage à n'avoir recours qu'aux voies de persuasion ou de douceur.

Lorsqu'une femme mariée éprouve de semblables paroxysmes, on doit craindre des chagrins dissimulés, ou que l'homme avec lequel elle est unie ne soit pas celui qu'elle aime; car, pour dissiper cette maladie, il ne suffit pas toujours, nous le répétons, que le but de la nature

soit rempli, il faut en outre que le vœu du cœur soit exaucé. Combien alors devient difficile la position du médecin, qui sent le besoin de solliciter un aveu qu'on ne peut faire qu'en rougissant! Il s'efforcera d'opposer le langage de la raison au délire de la passion, recommandera une vie active, un voyage, ou un autre moyen propre à opérer une diversion puissante.

La direction donnée aux facultés intellectuelles peut également participer à la guérison de cette névrose. Lorsqu'une jeune femme sera sujette à des accès hystériques déterminés par une affection morale dont on voudra la distraire, une application modérée et journalière à l'étude du dessin ou de la musique, des lectures agréables ou utiles pourront amener des distractions favorables, diminuer l'intensité des accidens, et en éloigner la fréquence. Appeler, dans ce cas, la raison à son secours, prendre la ferme résolution de surmonter une inclination funeste, c'est prouver un bon jugement, c'est faire coopérer cette fonction intellectuelle à la solution d'une maladie qu'une direction mentale toute autre eût été susceptible d'aggraver.

En offrant à la mémoire et à l'imagination des jeunes personnes des souvenirs ou des objets variés, doux, agréables, mais dont la nature est propre à calmer l'effervescence des sens, en leur créant des rapports nouveaux, en occupant leur

esprit de soins domestiques, de travaux scientifiques légers, de jeux honnêtes, on prépare, on accélère, ou on décide leur guérison.

Le même mode de curation sera opposé aux différens effets de la douleur morale; et en adoptant ces mêmes principes, en étudiant tout le parti qu'on peut en retirer, on combattra presque toujours, avec plus ou moins de succès, les résultats des affections de l'âme les plus pénibles.

HUITIÈME SECTION.

Traitement des Symptômes.

Mais les considérations que j'ai présentées jusqu'ici sur le traitement de l'hystérie, soit dans son cours en général, soit dans chacun de ses accès en particulier, seraient incomplètes, si je ne spécifiais les modifications qui peuvent être commandées dans le traitement par quelques symptômes insolites ou prédominans. Dans cet examen rapide, je noterai ces symptômes ou accidens d'après les organes qui en sont le siége, ou d'après leur fréquence et leur importance.

Si, à la suite d'une attaque violente, il restait une forte douleur vers l'utérus ou tout autre viscère, on y opposerait des émolliens, des calmans, tels que des bains tièdes, des fomentations, des lavemens et demi-lavemens, qu'on peut rendre plus efficaces en y ajoutant l'extrait gommeux d'opium ou le laudanum. Dans d'autres

cas, on peut appliquer sur l'organe malade, ou dans son voisinage, des sangsues, et plus tard un vésicatoire volant.

Existe-t-il une syncope opiniâtre, on a recours aux excitans usités en pareil cas, tels que l'inspiration de l'éther, de l'alcali, d'un air frais, aux applications d'oxycrat ou d'eau froide, aux frictions irritantes. On donne quelques gouttes d'éther, d'alcali volatil étendu d'eau de Cologne; plus tard, on prescrit un peu de bon vin ou de bouillon.

Quand la respiration devient pénible et laborieuse, quand tout annonce une congestion sanguine vers la tête ou les poumons, on emploie la saignée, que l'on répète suivant l'état du pouls et des forces vitales, et l'on y joint les dérivatifs les plus puissans. Dans ce cas, le traitement doit beaucoup se rapprocher de celui qu'on dirige contre les affections comateuses. Si les symptômes résultent d'une irritation aux organes respiratoires, une boisson délayante, telle que l'infusion de fleurs de tilleul, de violette ou de coquelicot, ou une potion calmante avec le sirop d'éther et de diacode, suffisent ordinairement pour rétablir l'ordre; mais si la respiration est plus fortement compromise, et même après l'accès, il faut agir plus efficacement, et établir des irritations proportionnelles sur les extrémités.

Lorsque ces malades sont tourmentées par des

insomnies très-pénibles, on y remédie par les narcotiques légers. Si, au contraire, l'absence du sommeil tenait à une affection de l'âme, il faudrait recourir aux consolations morales, et produire, par l'exercice, une lassitude qui rendît le besoin du sommeil plus impérieux.

Quand le système musculaire, fatigué des secousses et des contractions tumultueuses que l'accès a provoquées, est le siége d'une douleur obtuse, d'un malaise général, d'une courbature, on doit recommander l'usage des bains tièdes et le repos.

Quelquefois il survient de l'inappétence et du dégoût; la bouche est pâteuse. Cet état ne diffère de l'embarras gastrique, proprement dit, que par son peu d'intensité et sa durée éphémère; on y remédie par la diète et les délayans. La répétition des accès amène-t-elle un trouble plus prononcé dans les fonctions digestives, si c'est un véritable embarras gastrique, on prescrit l'émétique, les boissons délayantes, et une ou deux potions purgatives. Au bout de quelques jours, on passe à l'usage des toniques, proportionnés à la faiblesse de l'individu. Quand au contraire le système digestif est plutôt embarrassé qu'affaibli ou surchargé, on s'occupe de suite des moyens propres à lui rendre son énergie. S'il survient du dérangement dans le flux menstruel jusqu'alors régulier, on se hâte de prévenir

des désordres ultérieurs; car il deviendra par la suite de plus en plus difficile de rappeler cet écoulement à sa régularité première.

NEUVIÈME SECTION.

Traitement des Complications.

En parlant du traitement des complications, nous n'indiquerons que d'une manière générale les moyens curatifs qui peuvent convenir aux maladies dont la complication offre un rapport direct avec l'affection hystérique; telles sont la phthisie pulmonaire, les lésions organiques de l'utérus et l'aménorrhée, quand elle est effet, et non pas cause; l'aphonie, lorsqu'elle constitue moins un symptôme qu'une complication, l'hypocondrie, la chlorose, la mélancolie, l'épilepsie, etc.

Si une phthisie confirmée est jointe à une affection hystérique, cette circonstance n'offre presque aucune ressource, et ne réclame qu'une médecine palliative; mais quand il n'existe qu'une disposition à la phthisie ou un premier degré de cette maladie, on s'empresse d'arrêter les progrès ultérieurs du mal; on fait sentir à la malade le besoin des passions douces et du calme de l'âme; on en expose l'importance à ceux qui l'entourent; de plus, on lui conseille un régime doux, toutes les pâtes, fécules, farines, les légumes herbacés de préférence, les poissons légers, l'usage du

lait, les boissons sucrées et gommeuses, les narcotiques à très-petites doses et à des intervalles rapprochés, et parfois les vésicatoires volans ou les exutoires à demeure. Deux moxas dans le dos ont sauvé une jeune personne hystérique qui offrait tout l'appareil d'une phthisie commençante. Enfin l'air de la campagne doit être présenté comme l'agent par excellence.

A la complication épileptico-hystérique on opposerait les antispasmodiques les plus actifs, le musc, le camphre, l'assa-fœtida, l'opium, et surtout l'extrait de valériane, la pivoine, les oxides de bismuth, de zinc, l'huile animale de *Dippel*, de huit à dix gouttes, l'huile de térébenthine, un demi-gros par jour; le quinquina, le fer, dans les cas d'épilepsie atonique, ou suite de la masturbation, etc. Contre un pareil désordre, avec symptômes de pléthore sanguine, ou suite d'hémorrhagie supprimée, on dirige les saignées copieuses, et même celles de la jugulaire, quand la malade est jeune et robuste; les sangsues, les ventouses autour de la tête, les irritans, comme les pédiluves animés, les frictions avec le liniment volatil sur les extrémités inférieures; et on s'efforce de rappeler l'hémorrhagie. On rétablit également un exutoire, un ulcère trop tôt fermés. Quand l'une et l'autre affection éludent ces premiers efforts de l'art, on doit redouter les lésions organiques du cerveau,

imminentes ou existantes. Dans ce cas, on a recours aux vésicatoires, au séton, que le docteur *Esquirol* a employé avec succès, au moxa ou à la cautérisation, qui a également réussi chez quelques malades *privilégiés*. (V. *Henricus ab Heers*, *Pouteau*, *Valentin*.) J'ai vu prodiguer les exutoires contre une hystérie compliquée d'épilepsie, qui résista à tous les moyens mis en usage. On cherchera donc à guérir d'abord l'épilepsie, comme l'affection la plus grave; et si la malade était une jeune personne, après la guérison de cette affection spasmodique, on indiquerait les rapports sexuels comme le complément des conseils thérapeutiques qui conviennent en pareille occasion.

Si la jeune hystérique est dans un état de chlorose ou d'aménorrhée, on associe aux antispasmodiques, et même aux narcotiques, les médicamens et le régime fortifians. Dans cette complication, les martiaux et les toniques en général sont recommandés, et par la faiblesse générale, la langueur des digestions, et par l'absence ou le retard des règles; on prescrit donc alors l'eau ferrée, les bols avec la cannelle, le quinquina, la limaille de fer, le safran de mars, et l'extrait gommeux d'opium, à dose convenable. Les vins amers, ceux de Bordeaux, de Roussillon, de Malaga ou de Madère, qui ont l'avantage d'être pris avec plaisir, et les frictions pratiquées sur

la surface du corps, secondent fort bien les moyens précités.

Pour obtenir des frictions tout l'avantage qu'on peut en espérer, il faut les pratiquer soir et matin, avec une brosse dite *anglaise*, le long de la colonne vertébrale, et sur les côtés, sur les bras, et spécialement sur les lombes, le bassin, et sur toute l'étendue des membres abdominaux. On emploie quelquefois, dans le même but, les teintures aromatiques, de cannelle, de quinquina, l'essence de girofle, de muscade, de citron, etc.

L'utérus a une grande influence sur le larynx, comme le démontrent les changemens qu'éprouve la voix à l'époque de la puberté, l'impossibilité où sont certaines femmes hystériques de proférer aucune parole pendant leurs accès, enfin l'aphonie, qui résulte souvent de la suppression menstruelle, et qui complique parfois les névroses utérines. Tant que cette dernière maladie persiste, le traitement de l'aphonie est le même que celui que réclame l'hystérie. Mais il faut prescrire en outre le silence le plus absolu ; car dans les cas d'aphonie incomplète, ou même quand celle-ci est complète, les malades veulent presque toujours parler, ou du moins cherchent à se faire entendre ; ce qui aggrave du plus au moins leur état. Lorsque, après la guérison de la névrose utérine, l'aphonie subsiste encore, il faut

en détruire la cause, s'il est possible, employer les fumigations aromatiques sur le larynx, proportionner l'activité des moyens à l'intensité et à la persévérance du mal, et recourir, si le cas l'exige, aux linimens, aux vésicatoires, et même au séton, ou au moxa, qui a réussi dans un cas pareil au célèbre praticien *Dubois*. Je me rappelle un cas d'aphonie produite par la suppression des règles, et qui fut guérie par l'application des sangsues, auxquelles on revenait chaque fois que le flux menstruel n'avait pas lieu.

Quand l'hypocondrie complique l'hystérie, on combine le traitement de l'une et l'autre maladie ; mais comme en général ces deux affections réclament souvent des moyens analogues, on peut établir en principe qu'il faut faire concourir au même but les conseils moraux, un choix raisonné de médicamens simples, et insister singulièrement sur les ressources puissantes que nous offre l'hygiène. Si l'une des deux maladies offre une intensité plus grande, elle revendique dès-lors l'attention spéciale du médecin.

Le traitement de l'hystérie mélancolique sera dirigé d'après les mêmes préceptes, et l'on s'attachera en outre spécialement à combattre l'erreur partielle et exclusive; en un mot, la passion dominante de la malade.

Quand on redoute la complication d'une lé-

sion organique de l'utérus, on recommande la continence la plus absolue; à l'intérieur les adoucissans, les émolliens, les narcotiques à petites doses, mais rapprochées, les fondans, les lavemens et demi-lavemens avec six, huit gouttes de *Rousseau*, etc.; à l'extérieur, les bains, demi-bains et bains de siége tièdes, les saignées du bras, suivant les circonstances, rarement les saignées locales au moyen des sangsues; enfin un régime doux et végétal, un exercice très-modéré, et l'écart de tout excès, de toute fatigue. Dans certaines circonstances, on se trouvera bien d'établir des irritations sur les extrémités ou dans le voisinage du bassin; ces désorganisations sont souvent le résultat de maladies méconnues ou négligées, d'irritations dartreuses ou rhumatismales, etc., qui s'établissent vers l'utérus, dont on pourrait peut-être prévenir l'altération par divers exutoires, par les bains sulfureux et un traitement approprié; il nous semble du moins qu'on devrait tenter, dans l'origine, de pareils procédés, d'autant qu'ils sont sans inconvéniens majeurs et d'accord avec les principes de la saine physiologie. Mais autant ces ulcérations sont fréquentes, autant cette complication est rare; elle n'est même observée ordinairement que depuis trente-cinq jusqu'à cinquante-cinq ans.

Nous terminerons l'histoire de l'hystérie en

exposant quelques considérations générales, relatives au traitement consécutif ou prophylactique des rechutes.

DIXIÈME SECTION.

Traitement consécutif ou préservatif des Récidives.

L'attention du médecin doit veiller sur les malades au-delà même du terme des accidens, c'est-à-dire pendant leur convalescence; en effet, la convalescence n'est que la maladie atténuée, comme la disposition à la maladie en était un degré moindre, un état moins prononcé.

Plus, en général, on fortifie la constitution des jeunes personnes, plus on affaiblit leur sensibilité nerveuse, et on les rend moins accessibles aux atteintes et aux retours de cette névrose. Un bon régime, l'usage modéré d'un vin vieux, abondant en principe colorant, et un exercice journalier, mais jamais porté jusqu'à la fatigue; une vie active, remplie, bien ordonnée, des vêtemens chauds, relatifs à la saison; une attention continue à éviter les refroidissemens, etc. etc. sont autant de circonstances qui tendent à régulariser toutes les fonctions de l'économie, celles surtout qui sont particulières au sexe. On sait que la vie sédentaire, la mollesse, l'oisiveté, la solitude, ou une vie trop dissipée, la trop grande fréquentation des bals, des spectacles, l'abus des plaisirs, de la danse, les conversations las-

cives, la musique et les lectures érotiques, etc. disposent plus ou moins aux retours de l'hystérie. On doit donc éloigner tous ces excitans indirects des organes de la reproduction, écarter tout ce qui exalte les sens physiques, tout ce qui émeut trop vivement les sens moraux ou l'imagination, les impressions antipathiques, la vue d'un accès de convulsion, d'hystérie ou d'épilepsie, les contrariétés, les surprises, la frayeur, les craintes, les chagrins, etc. De plus, on surveillera les jeunes personnes; on leur recommandera l'habitude des affections douces, une sensibilité modérée, les principes aussi sages que propices de la morale et de la religion, enfin un exercice modéré de leurs facultés intellectuelles : c'est ainsi qu'on prémunit les personnes en convalescence contre les retours ou récidives de cette névrose.

Nous n'insisterons pas davantage sur le traitement prophylactique des rechutes, parce que, d'après ces données générales, et les développemens dans lesquels nous sommes entrés précédemment, il sera facile aux praticiens de saisir les indications qu'ils devront suivre, et même aux malades de connaître les causes qu'elles devront éviter, et parfois, les moyens de remédier à leurs résultats.

CHAPITRE XII.

Résumé de la première Partie.

D'après l'étymologie du mot *hystérie*, et la description que nous avons donnée de cette affection, nous pensons être fondés à dire que l'hystérie est une maladie nerveuse dont le siége réside dans l'utérus, et qui consiste dans une lésion du système nerveux ou des propriétés vitales de cet organe; non-seulement cette névrose est particulière au sexe, mais il n'existe aucune affection correspondante parmi celles que l'on observe chez l'homme. L'influence extraordinaire qu'exercent sur l'économie de la femme ses organes génitaux dépend de leur structure, de leur position, et surtout du rôle beaucoup plus important auquel ils sont appelés; en effet, outre leur part commune à la propagation, ils ont des fonctions qui leur sont propres, fournissent des écoulemens réguliers, dont les dérangemens sont une source féconde de maladies; ils sont chargés de la conception, de la grossesse, des accouchemens et de leurs suites; ils ont avec les seins et la lactation, avec le larynx ou l'organe de la voix, des rapports remarquables, et en quelque sorte exclusifs (1). Obser-

(1) L'influence qu'exerce sur la voix de l'homme une opération barbare ne peut infirmer cette opinion; ces change-

vons encore que, si leur rôle est beaucoup plus important, il commence et finit beaucoup plus tôt ; en général, après quarante-cinq ans, la femme n'est plus apte à devenir mère, tandis que l'aptitude à procréer se prolonge chez l'homme presque indéfiniment, comme si la nature avait voulu établir une compensation.

Une éducation physique et morale, molle, efféminée, et un genre de vie analogue, également propres à favoriser l'exaltation des sens ou de l'imagination, une sensibilité nerveuse, exquise, ou mieux, un tempérament ardent et lascif, constituent les dispositions à l'hystérie, qui reconnaît aussi des causes particulières : la plus constante et la plus puissante tient aux besoins qu'éprouvent les personnes du sexe, surtout à l'approche de la puberté ; les peines de l'âme, relatives aux penchans amoureux, et les dérangemens des règles, tiennent le second rang.

Cette maladie s'annonce presque toujours par un trouble particulier vers l'organe utérin ; elle se développe plus ou moins promptement, et avec une intensité variée : ce qui nous a fait diviser la succession de ses phénomènes en trois degrés ou en trois périodes successives : dans

---

mens sont le résultat d'une violence extérieure, tandis que ceux que nous avons notés, page 107, sont le produit de phénomènes naturels.

la première, on remarque des demi-bâillemens, une sorte de frémissement vers l'utérus, le sentiment d'un globe qui, par un mouvement oscillatoire, se porte de l'hypogastre au col, où il exerce un resserrement avec menaces de suffocation, des convulsions légères, enfin une lésion momentanée et incomplète des facultés intellectuelles.

La même série d'accidens portés à un plus haut degré signale la seconde période.

A la troisième se rattachent en outre tantôt l'agitation convulsive la plus violente, à laquelle succède un état plus ou moins prolongé de mort apparente, tantôt une sorte d'apoplexie hystérique dont la durée est fort variable.

L'hystérie offre plusieurs variétés; les plus notables sont l'hystéricisme, et l'hystérie épileptiforme. Celle-ci est surtout remarquable en ce qu'elle présente une analogie frappante avec l'épilepsie; mais elle en diffère, parce qu'elle ne se développe qu'aux approches de la puberté, et jusqu'à l'époque critique, parce qu'elle est constamment influencée par les différens états de l'utérus, par la continence, par les plaisirs vénériens, par la grossesse, etc.; enfin elle se dessine aussi par des phénomènes hystériques, tels qu'un frémissement ou mouvement obscur vers l'utérus, et, à la fin du paroxysme, des évacuations vaginales et l'émission d'une urine abondante, limpide, etc.

L'hystéricisme semble précéder l'entier développement de la puberté, et résulter des efforts que fait la nature pour opérer la révolution pubère. Cette variété dépend également d'une lésion des propriétés vitales de la matrice, à laquelle participe le système nerveux général. Ses symptômes, que nous n'avons qu'esquissés, s'affaiblissent ordinairement avec le temps, par les moyens d'hygiène, et surtout par l'apparition des menstrues. Si la constitution de ces jeunes malades était suffisamment développée, un mariage convenable fixerait un terme prochain à tous les accidens.

Les accès de l'hystérie, et l'affection elle-même, se prolongent plus ou moins : les premiers sont terminés par des borborygmes, *obmurmurant intestina*, par l'issue d'un liquide muqueux, et quelquefois spermatique, qui lubrifie les parties génitales, et s'accompagne rarement d'une sensation voluptueuse; enfin par l'émission abondante d'une urine claire et limpide.

La maladie, proprement dite, se termine presque toujours par le retour à la santé; elle se juge souvent par des sueurs ou l'apparition des règles, par des furoncles ou d'autres éruptions, par des urines copieuses et par des sécrétions de mucus vaginal, ou de liqueur spermatique, plus souvent précédées d'un sentiment de volupté.

Ses complications les plus ordinaires sont la

phthisie pulmonaire, l'aménorrhée, l'aphonie, l'hypocondrie, la mélancolie, la manie, la nymphomanie, l'épilepsie, enfin les lésions organiques de l'utérus et de ses appendices. Nous n'indiquons ici que les complications dépendantes, ou qui sont du plus au moins une conséquence de l'hystérie; nous ne devons aucunement mentionner celles qui sont simplement accidentelles.

Le diagnostic de l'hystérie est facile à établir; mais comme on l'a souvent confondue avec l'hypocondrie et l'épilepsie, nous allons indiquer les principaux traits qui la différencient de cette dernière affection : plus loin, nous la distinguerons également de l'autre névrose. L'hystérie ne s'observe pas avant l'époque de la puberté, et rarement après l'âge du retour; l'épilepsie, commune aux deux sexes, est surtout fréquente chez les enfans, *morbus infantilis ac puerilis;* l'une est provoquée par les besoins propres à la jeunesse, par la continence et les passions amoureuses; l'autre provient le plus communément d'une frayeur vive : les symptômes dans l'un et l'autre cas varient. Les accès d'hystérie prennent moins brusquement, reviennent à des époques irrégulières, et sont, en général, d'une plus longue durée. Dans ce cas, les malades ne tombent pas aussi promptement à terre; elles changent de place, et parcourent un plus long espace; leurs mouvemens convulsifs sont variés, étendus,

augmentent et diminuent successivement, et n'offrent pas cette roideur, ce tremblement, cette agitation, comme tétaniques, que présentent les épileptiques. Les personnes affectées d'hystérie éprouvent très-souvent un désordre, un mouvement sourd vers l'utérus, une boule, qui, de l'hypogastre, se porte à l'épigastre, à la poitrine et au larynx, où il existe une constriction plus ou moins violente. Dans l'hystérie, l'écume à la bouche est moins abondante, et la perte de mémoire moins complète. Presque jamais cette névrose n'altère consécutivement le cerveau et les fonctions intellectuelles; tandis que dans l'épilepsie les altérations organiques du cerveau sont très-fréquentes, et, sur la fin, constantes, soit comme cause, soit comme résultat. Tout annonce, dans le premier cas, une affection nerveuse de la matrice, à laquelle le cerveau participe sympathiquement et d'une manière indirecte; tandis que nous voyons presque toujours dans l'autre une lésion plus ou moins profonde de l'organe cérébral. Aussi l'anatomie pathologique nous fait-elle connaître des résultats qui diffèrent suivant la maladie. Dans la première, les lésions organiques sont assez rares; mais enfin, quand il en existe, c'est presque toujours vers l'utérus et ses annexes qu'on les rencontre. Dans la seconde, les altérations de tissu sont très-fréquentes, et on les observe

constamment alors au cerveau. (Voyez *Riolan*, *Binninger*, *Blancardus*, *Vésale*, *Diemerbroeck*, *Morgagni*, *Esquirol*, *etc.*)

Si nous passons au pronostic de l'hystérie, nous le trouverons bien présenté par *Hoffmann* : *Ut valdè terribilis hic videtur morbus, in se tamen non adeò periculosus est;* sentence qui est confirmée par l'observation journalière, et n'a besoin d'aucun développement. Cette maladie, en général, n'offrant pas de péril, le traitement doit en être simple : on s'oppose d'abord aux accès, en faisant respirer un air frais et doux, quelquefois de l'éther et par divers moyens que nous avons indiqués; on peut également les laisser suivre leur cours, quand ils ne sont pas portés au plus haut degré; dans le cas contraire, fort rare, à la vérité, il faut agir énergiquement. Afin de militer contre la congestion cérébrale et ses fâcheux résultats, on emploie les saignées dites *dérivatives*, suivies de l'application des sangsues à la tête, les irritans sur les extrémités inférieures, les lavemens purgatifs, qu'on seconde par les antispasmodiques à l'intérieur et à l'extérieur.

L'hystérie dépend-elle du dérangement d'une hémorrhagie, il faut rappeler celle-ci; mais la cause la plus ordinaire, c'est la continence, c'est l'union désirée par la jeune malade; en accédant à ses vœux, on satisfait son cœur, en même

temps qu'on rétablit sa santé. Tel est aussi le conseil donné par les maîtres de l'art, et que tout praticien doit prescrire, lorsque les circonstances le permettent; mais si des obstacles s'y opposent, il faut alors insister sur les consolations, sur une longue série de distractions agréables, et y associer une vie occupée, un exercice journalier, l'éloignement, ou un voyage.

Enfin, s'il est important de veiller à l'éducation physique et morale des jeunes personnes, afin de prévenir l'invasion de cette maladie, il n'importe pas moins de les entourer de soins, de conseils dans un âge plus avancé, de les éclairer, de les fortifier de tous les avantages d'une bonne direction donnée à leurs facultés mentales et aux ressources de l'hygiène, afin de s'opposer à la continuité, aux retours ou aux récidives de l'hystérie. On atteindra presque toujours ce but par une attention égale à calmer, à modérer la sensibilité, les sens ou l'imagination, et à fortifier, à l'aide de tous les moyens que l'art indique, la constitution physique des jeunes personnes, ou des femmes encore jeunes; enfin, en régularisant toutes les fonctions de l'économie, et en éloignant les causes susceptibles d'amener leur dérangement.

DEUXIÈME PARTIE.

DE L'HYPOCONDRIE.

CHAPITRE PREMIER.

Considérations.

ÉTYMOLOGIE. Le mot *hypocondrie* vient de deux racines grecques, d'ὑπο, *sous*, et χονδρος, *cartilage*. Cette expression a sans doute été destinée à désigner cette affection, parce que son siége paraît exister particulièrement dans les organes situés sous les fausses côtes ou dans les hypocondres (1).

SYNONYMIE. *Hypocondrie* des modernes, *hypocondria*, — MORBUS FLATUOSUS de *Dioclès* et *Aëtius*,

(1) Le sens moral qu'on attache au mot *hypocondre*, et l'espèce de répugnance que manifestent les personnes atteintes de cette maladie contre le nom qu'on lui a donné, nous avaient inspiré l'idée de changer cette dénomination; mais l'exactitude de son étymologie nous a décidés à ne rien innover à cet égard. Nous observerons seulement qu'on devrait peut-être écrire *hypochondrie*, et non *hypocondrie*, parce que le χ des Grecs est représentatif du *ch*; mais la plupart des auteurs, et surtout le *Dictionnaire de l'Académie*, écrivent *hypocondrie*, et nous déférons à l'usage et à l'autorité.

— MATER SCORBUTI de *Barbette*, — MORBUS RESICCATORIUS, *quòd in aliquibus corpus exsiccet et manifestè emaciet.* — MORBUS RUCTUOSUS, *quòd plurimos nimirùm excitet ructus.* — MORBUS NIGER *nomine, vel quòd ægroti humores nigros evomant, vel quòd corporum illorum color quasi lividus et niger.* — MORBUS CORRUPTORUM, *quòd nimirùm corpus corrumpat et destruat.* — MORBUS MIRACHIALIS des Arabes, de *mirach*, qui signifie ventre, épiploon ou péritoine : *Ab Arabibus mala hypocondriaca mirachialia nominata fuerunt, quoniam* mirach *apud ipsos membranam illam cui intestina alligata sunt significat.* — KUTUBUTH *Arabum.* — Υποχονδριακος παθος ἡ φυσωδες, maladie hypocondriaque avec gonflement; — Ανανλὴ d'*Hippocrate* et des autres médecins grecs.

ORDRE NOSOLOGIQUE. *Sauvages* range l'hypocondrie dans la classe des vésanies; *Linnée,* parmi les affections mentales; suivant *Vogel*, elle doit appartenir aux maladies spasmodiques, et d'après *Cullen*, aux névroses. Elle a été placée par le professeur *Pinel* dans la classe des névroses, ordre vésanies, et nous nous conformons à l'avis de ce nosographe célèbre. L'hypocondrie a été connue dès l'enfance de l'art : l'oracle de Cos nous en a transmis les principaux caractères; il l'a surtout bien isolée de l'hystérie, et les principes de traitement qu'il indique contre l'une et l'autre de ces deux affections formeront les bases

de la méthode curative que nous développerons dans les diverses parties de notre travail. La plupart des chefs de la médecine, suivant son impulsion, ont bien distingué cette maladie d'avec l'hystérie; mais il faut l'avouer, ils l'ont très-souvent confondue avec la mélancolie.

Par la suite, on a de plus en plus méconnu ou négligé la distinction précise de ces deux névroses : *Sydenham* le premier, et beaucoup d'autres, à son exemple, ont considéré l'hypocondrie et l'hystérie comme une seule et même affection; toutefois cette opinion n'a pas été adoptée par ceux qui ont apporté le plus de zèle et de soin dans l'étude des maladies et dans la recherche de leurs caractères distinctifs : ainsi tous les nosographes ont rivalisé d'efforts pour bien faire ressortir les différences qui existent entre elles, pour assigner leurs phénomènes caractéristiques; mais l'erreur n'en a pas moins prévalu, et jusque vers la fin du siècle dernier, les névroses, et principalement les vésanies, étaient rarement bien isolées dans les histoires générales que renfermaient les divers traités de médecine, et surtout dans ceux publiés au commencement du dix-huitième siècle. C'est en consultant les histoires particulières, éparses dans un grand nombre d'ouvrages, que l'on a retrouvé le chemin de la vérité et de la bonne observation; c'est dans les écrits des médecins observateurs qu'on

a découvert quelques débris du feu sacré ; ce sont les nobles efforts des professeurs de l'École de Paris, ce sont les bonnes monographies sorties de cette Faculté, justement renommée, dont l'ensemble a puissamment contribué à débrouiller ce chaos, à éclairer l'histoire des diverses maladies internes, ou de la pathologie médicale, et spécialement celle des affections nerveuses.

L'hypocondrie est une maladie de tous les temps, de tous les pays, qui se manifeste dans toutes les saisons et dans toutes les températures, commune à l'un et l'autre sexe, mais qui n'affecte indistinctement ni tous les âges, ni toutes les classes de la société. Sa fréquence (1) est

(1) *Zacchias*, en 1671, demandait si cette névrose était nouvelle, et si elle était plus fréquente de son temps que dans les siècles qui l'avaient précédé. Cette question ne peut être résolue que d'une manière relative. La fréquence de la maladie dépend de la multiplicité et de l'intensité des causes, et celles-ci tiennent à une foule de circonstances physiques et morales, générales ou particulières, qu'il n'est pas facile d'apprécier sous ce rapport ; seulement on peut avancer qu'une impulsion générale vers l'étude des sciences et des lettres, et surtout les désastres publics, doivent en multiplier les exemples. A l'époque où écrivait cet auteur, les progrès de la civilisation, l'amour et l'étude de la littérature, enfin les événemens politiques du siècle, malgré les brillans succès de Louis XIV, contribuèrent sans doute au développement d'un grand nombre de ces maladies ; mais combien les vingt-cinq années de révolution que nous venons de traverser doivent

jusqu'à un certain point, en raison directe du développement de l'entendement humain, et des progrès de la civilisation; c'est assez dire qu'elle est plus souvent observée de nos jours que dans les siècles passés; plus rare, sans doute, dans les pays encore peu civilisés, et surtout quand ils sont étrangers aux horreurs de la guerre ou des dissentions intestines. On l'observe fréquemment en Angleterre, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne; elle n'est pas non plus inconnue aux Mahométans, à ce peuple ignorant, fanatique par religion, chez qui l'abus des narcotiques, des plaisirs vénériens, une vie molle et sédentaire, une indolence nationale, et les principes du fatalisme, nous offrent tous les inconvéniens de l'état social, dépouillé des avantages qui forment à nos yeux une douce compensation pour les privations qu'il nous impose.

C'est parmi les hommes de lettres, les citoyens livrés aux travaux assidus du cabinet, les artistes, les poètes, parmi les littérateurs les plus distingués, et surtout au milieu des personnes douées de l'imagination la plus ardente, ou de la plus vive sensibilité, qu'elle choisit de préférence ses victimes (1).

---

revendiquer une influence plus énergique. Remarquons enfin celle qu'a dû exercer, sur l'observation de ces névroses, l'attention des médecins excitée par de bonnes descriptions, etc.!

(1) Je pourrais citer plusieurs de nos premiers juriscon-

Cette observation n'a point échappé aux philosophes de l'antiquité. Aristote, si connu par son amour pour la vérité, *amicus Plato, sed magis amica veritas,* assure que tous les grands hommes de son temps étaient mélancoliques ou hypocondriaques. *Cur homines qui ingenio claruerunt, et in studiis philosophiæ, vel in republicâ administrandâ, vel in carmine fingendo, vel in artibus exercendis melancholicos omnes fuisse videamus?* (Arist. *Probl.* sect. 30.)

Le mot de *Sénèque, non est magnum ingenium sine mixturâ dementiæ*, ne serait-il pas une traduction élégante de cette même pensée? et ne peut-il pas offrir une consolation aux hommes, qui, sans paraître s'élever au-dessus de la nature humaine, sont cependant fort au-dessus de la sphère commune?

L'hypocondrie sévit avec d'autant plus de force contre ceux qu'elle attaque, qu'ils peuvent être enchaînés sous l'empire des causes, obligés de rester en butte à ses traits, soit par la nature

---

sultes, de nos auteurs les plus distingués, des sculpteurs, des peintres et des musiciens de France les plus célèbres. Les états voisins nous en offriraient également un grand nombre. Le trop fameux Kotzebue a décrit lui-même une partie de ses affections nerveuses : on peut consulter l'année la plus remarquable de sa vie, p. 153, t. I. *Colin d'Harleville*, *Gretry*, *Bernardin de Saint-Pierre*, ont également parlé de leurs nerfs dans les ouvrages qu'ils nous ont laissés.

de leurs professions, soit par la force des circonstances. L'histoire de cette vésanie, que nous commencerons par l'exposé des causes, nous fera mieux connaître ces particularités; mais tâchons d'abord de bien présenter les sources principales d'où elle dérive, et indiquons avant tout, d'une manière sommaire, la nature, le siége et les caractères principaux de l'hypocondrie.

C'est une affection éminemment nerveuse, qui paraît du moins résider dans une irritation, ou une manière d'être particulière du système nerveux, et principalement de celui qui vivifie les organes digestifs : les symptômes essentiels qui lui appartiennent sont nombreux; le plus souvent trouble et lenteur des digestions, sans fièvre et sans indices d'une lésion locale, flatuosités, borborygmes; exaltation de la sensibilité générale, spasmes variés, palpitations, illusions des sens, et surtout de la vue et de l'ouïe, succession rapide de phénomènes morbides ou morbifiques, qui simulent la plupart des maladies, état réel, mais variable, de souffrances diverses, d'où naissent des terreurs paniques ou des inquiétudes exagérées, versatilité morale, exagération habituelle, spécialement sur tout ce qui tient à la santé, ou à l'énoncé des accidens de la maladie.

Mais d'où provient cette névrose? de sources aussi nombreuses que variées, et dont nous allons exposer le tableau.

CHAPITRE II.

Causes de l'Hypocondrie.

L'ÉTUDE des causes de l'hypocondrie doit captiver l'attention du médecin : celle des causes finales qui échappent, dans presque toutes les sciences, à la pénétration humaine, ne doit pas également exciter ses efforts; mais la recherche des causes qui commencent et complètent en quelque sorte l'histoire d'une maladie, et qui influent si puissamment sur le mode de curation, réclame une application suivie et une sagacité délicate. Ces causes, aussi nombreuses que variées, servent encore à établir le diagnostic, ce qui, dans une névrose où les méprises ont été si fréquentes, n'est pas d'un faible intérêt. Nous allons les examiner à peu près dans le même ordre que nous avons adopté en traitant de l'hystérie, sans nous attacher à la distinction des causes en disposantes et en déterminantes, parce que le même agent peut constituer tour à tour une disposition ou une cause efficiente, suivant son intensité ou la disposition de l'individu.

PREMIÈRE SECTION.

Causes physiques.

Chaque période de la vie est marquée par des rapports organiques, et par une disposition à

diverses maladies, qui en constituent en partie les attributs physiques; on sait, en effet, que dans l'enfance les maladies cérébrales prédominent; que dans la jeunesse les affections de poitrine sont les plus fréquentes; et qu'à l'âge adulte appartiennent spécialement les névroses et les lésions organiques des viscères abdominaux. Aussi l'hypocondrie se déclare-t-elle bien rarement avant l'âge de vingt ans et après celui de soixante; si elle persiste au-delà de ce dernier terme, elle est quelquefois remplacée par les altérations organiques des viscères abdominaux et de ceux de la poitrine.

L'âge viril est l'époque où se manifestent les passions les plus orageuses, où les intérêts les plus puissans, où tous les mobiles sont mis en jeu, se froissent et se heurtent; c'est l'époque des orages, des bouleversemens et de l'ambition avec laquelle marchent l'inquiétude, la crainte, et une perplexité sans cesse renaissante; c'est alors aussi que l'homme se concentre dans ses méditations, que le philosophe se livre aux réflexions les plus profondes, et que le métaphysicien s'enfonce dans ses abstractions; le sculpteur ne quitte plus son ciseau, le peintre sa palette, le graveur son burin, le littérateur consacre à l'étude ses plus belles années, le poète s'abandonne à son imagination; tous sont éga-

lement tourmentés par le désir de laisser un nom, et de pouvoir répéter avec Horace :

Non omnis moriar, multaque pars mei
Vitabit Libitinam.

Lib. III, od. XXIV.

Mais la fortune n'est pas à tous également favorable, et beaucoup sacrifient, à de vaines et trompeuses illusions leur santé, et quelquefois même leur existence. C'est donc à l'âge viril que l'on doit rapporter la plus grande fréquence des aliénations et de l'hypocondrie.

On n'a peut-être jamais observé celle-ci chez les enfans : toutefois le fait que nous allons rapporter démontre jusqu'à un certain point que les vapeurs ne sont pas étrangères à l'âge tendre.

Un jeune enfant de sept à huit ans, né d'un père très-nerveux, et d'une mère délicate, vivait dans une heureuse intelligence avec son frère âgé de dix ans ; celui-ci fut enlevé par une fièvre maligne. Long-temps on cacha au cadet la perte qu'il avait faite ; mais au bout de cinq mois, après l'avoir bien disposé à recevoir cette triste nouvelle, on la lui annonça ; aussitôt il fondit en larmes, resta deux ou trois jours sans demander de nourriture, et pendant plusieurs mois il fut très-affligé. On avait espéré que le temps et la distraction le consoleraient ; mais l'on s'aperçut bientôt que, toujours tourmenté par la mort de son jeune compagnon, il avait perdu l'ap-

pétit, et qu'il ne digérait qu'avec peine. Souvent il se retirait pour verser des larmes; d'autres fois il s'abandonnait à une gaîté insolite. Il parut pendant long-temps dépérir, et revint ensuite à un état satisfaisant. Sans doute ces symptômes ne constituent point une hypocondrie véritable, mais ils s'en rapprochent, et en forment une nuance. On peut encore joindre à cette observation l'histoire rapportée par *Zimmermann*, d'un homme hypocondriaque dès l'âge de six ans. Toutefois, je pense que long-temps l'hypocondrie de ce malade ne fut qu'une disposition à cette névrose, que l'on aura confondue par la suite avec la maladie bien déterminée. On ne voit pas, du moins en général, cette affection dans l'enfance; mais on rencontre parfois une propension à cette maladie dès les premières années de notre vie : j'en ai connu plusieurs exemples.

L'organisation délicate de la femme la rapproche, sous ce rapport, de celle des enfans, et ne la dispose pas à l'hypocondrie autant qu'on pourrait le penser. Aussi cette maladie affecte-t-elle plus souvent les hommes que les femmes, qui sont dévolues à d'autres névroses. Cependant, quoique l'hystérie soit une affection exclusive chez elles, et qu'elles l'éprouvent plus fréquemment que l'hypocondrie, elles sont encore assez exposées aux accidens de cette dernière

maladie, surtout lorsqu'elles ont dépassé l'âge de retour, ou l'époque critique; car il est trop vrai que la plus faible et la plus intéressante partie du genre humain a reçu en partage la plus forte portion des souffrances et des maladies. Cette névrose est assez fréquente chez quelques personnes du sexe, qu'un tempérament plus nerveux que porté pour les plaisirs de l'amour, a préservées des affections hystériques; elle est spécialement produite alors par les chagrins, les dérangemens qu'éprouvent les fonctions particulières au sexe, et par une vie trop uniforme ou trop sédentaire (1). Chez les femmes, la plus grande fréquence de l'hypocondrie s'observe plutôt après l'époque de la puberté qu'aux approches de cette révolution. On voit cependant de jeunes personnes, qu'une débilité générale maintient dans une disposition chlorotique, dont les symptômes diffèrent peu des accidens ordinaires à cette névrose. Quant à la cessation des règles

(1) J'ai donné plusieurs fois des conseils à une jeune femme qui est constamment en proie aux accidens nerveux les plus multipliés, en un mot, à tous les symptômes de l'hypocondrie; ses journées tout entières sont habituellement consacrées aux détails d'un commerce d'épicerie très-considérable : à peine a-t-elle passé huit jours à la campagne, qu'aussitôt elle recouvre une santé parfaite. Rappelée aux soins de sa maison, elle endosse de suite ce qu'elle nomme *son manteau hypocondriaque*.

vers le terme assigné par la nature, elle exerce une influence très-marquée sur le développement des affections hypocondriaques, et spécialement quand les femmes s'affligent vivement de l'âge du retour et de la perte des avantages qu'elles avaient conservés jusqu'à ce moment. La crainte des maladies qui les déciment particulièrement lors de cette révolution ajoutera quelquefois encore à la part que celle-ci peut revendiquer, et qui sera d'autant plus prononcée, que son action sera favorisée par le tempérament ou d'autres dispositions physiques.

On sait que l'équilibre le plus parfait entre les différens systèmes qui composent l'admirable édifice du corps humain formerait la constitution par excellence; mais cet heureux accord n'existe presque jamais : le plus souvent tels systèmes sont prédominans, ou tel organe est doué d'une vie plus active que la plupart des autres.

On distingue en général les tempéramens en nerveux, musculaire, lymphatique et sanguin, et cette division semble confirmée par la nature et l'observation ; mais on doit remarquer, outre ces tempéramens généraux, des tempéramens mixtes et des tempéramens particuliers, ou résultat de la prédominance de certains viscères. Nous avons observé déjà la singulière prédominance, et l'influence non moins remarquable

des organes de la génération chez quelques individus du sexe féminin; de même, nous verrons un surcroît d'énergie, soit du cerveau et des viscères de la poitrine, soit de l'estomac et des intestins, soit des organes biliaires, dont l'action très-sensible, quoique exagérée peut-être par les anciens, fit admettre le tempérament bilieux.

Parmi les tempéramens généraux, ceux qui influent plus singulièrement sur la production de l'hypocondrie sont le nerveux et le sanguin; à ce dernier se rattache l'examen du rôle que jouent dans le développement de cette maladie les hémorrhagies, les menstrues et les hémorrhoïdes, qui peuvent être considérées comme causes, comme symptômes ou comme moyens curatifs de cette névrose, et dont nous parlerons plus loin.

L'examen des tempéramens particuliers nous apprend que la prédominance du système hépatique est fréquemment celle qui dispose davantage à cette maladie. En effet, un teint bilieux ou jaunâtre, la sensibilité de l'hypocondre droit, l'habitude des vomissemens bilieux, l'abondance des évacuations, ou une constipation opiniâtre, annoncent parfois une disposition à cette affection nerveuse, dont cet ensemble de phénomènes forme dans d'autres cas autant de symptômes concomitans, ou même constituans.

L'influence du tempérament est favorisée ou

atténuée suivant l'âge, le sexe, le climat, la profession, les mœurs générales ou particulières du pays, et les circonstances spéciales de la vie : ces considérations ne seraient point étrangères à notre sujet; mais elles se rattachent principalement à l'histoire des tempéramens, et nous éloigneraient de notre but. On connaît aussi les effets étonnans d'une sensibilité physique très-exaltée; cette disposition organique peut être innée, héréditaire ou acquise; le plus souvent elle est inhérente à une complexion délicate, et résulte de notre éducation physique et morale. On l'observe dans quelques cas unie aux différens tempéramens, même au tempérament lymphatique, ou à une énergie générale très-prononcée; mais combien de degrés intermédiaires entre la sensibilité exquise de quelques femmes vaporeuses (1), et la fermeté de cette dame romaine qui, pour ne pas survivre au déshonneur de son mari, lui donne l'exemple d'une résolution violente et désespérée; et dit, en lui présentant le poignard, *Pœte! non dolet.*

L'influence du climat modifie également

(1) Voyez le Traité de *Melancholiâ*, par *Lorry*, ouvrage riche de son propre fonds, et enrichi de toute l'élégance de la langue latine. L'observation, *tenerrima fuit mulier quæ quindecim annos nata ab infantiâ delicatula et tenuis, cute roseâ et candidissimâ*, nous offre le *summum* de la sensibilité la plus prononcée (p. 73).

l'homme, et imprime à ses facultés morales et à sa constitution physique des caractères sensibles. Le parallèle des habitans du nord et des peuples du midi nous en fournit la preuve : ceux-ci sont aux premiers, sous le rapport physique, ce que l'Apollon du Belvédère est à l'Hercule Farnèse ; et la différence de l'organisation morale se tire de la comparaison établie d'une part entre Alcibiade, Périclès, Lucullus, Louis XIV, Richelieu, le chevalier de Grammont ; et de l'autre, entre Charles XII, Pierre-le-Grand, Suwarow, et les guerriers du nord.

Les climats brûlans de l'Inde, de la Haute-Egypte, quand surtout ils réunissent à leur température élevée la subversion des lois simples de la nature, sont très-propres à faire contracter des maladies nerveuses. Cette opinion n'est pas universellement adoptée ; *Hoffmann* et *Réveillon* regardent les pays froids comme une circonstance favorable à l'invasion de l'hypocondrie, tandis que *Van-Swieten* pense que les Espagnols sont spécialement disposés à cette névrose ; mais outre l'action du climat, il faut compter la paresse qui leur est naturelle, leurs habitations insalubres et leur mauvais régime, etc. Le commentateur de *Cullen*, l'érudit *Bosquillon*, estime aussi que les pays méridionaux disposent à l'hypocondrie, et que le froid en détermine particulièrement les paroxysmes.

Ces opinions, en apparence contradictoires, peuvent jusqu'à un certain point être conciliées; on peut en effet reconnaître que les deux extrêmes de la température produisent plus ou moins constamment une atonie générale. Dans les climats chauds, nous trouvons une vie molle, somptueuse, l'abus des épices, des aromates, des liqueurs, en un mot des plaisirs de la table, l'excès des jouissances, qui forment autant de circonstances énervantes; d'un autre côté, les régions boréales obligent beaucoup d'individus à la vie sédentaire, à l'isolement; le froid lui-même, quand son intensité est excessive, ou son action trop prolongée, produit un effet débilitant. C'est ainsi que l'immersion dans l'eau froide agit souvent comme moyen excitant; tandis que le bain froid, quand il est prolongé, exerce une action contraire. De même, dans la Russie, les hommes sont en général forts et vigoureux, et atteignent les extrêmes de la vieillesse. Si l'on avance vers le nord de l'Europe, comme en Laponie, où le froid est excessif, l'homme y est petit, faible, et ne parvient presque jamais, suivant le rapport de quelques voyageurs, à un âge très-avancé.

Hippocrate avait déjà remarqué que les mœurs et les formes des habitans participaient de la nature du pays : *Invenies hominum formas et mores regionis naturæ compares.* Mais n'exagé-

rons pas cette influence, qui semble démentie par le contraste de Rome ancienne et de Rome moderne, et par la disparité des Grecs d'autrefois et des Grecs qui leur ont succédé. Voyons en outre si certaines circonstances ne peuvent pas modifier les effets du climat.

Cheyne, dans son *Traité de la maladie anglaise*, indique pour causes de la grande fréquence des affections nerveuses en Angleterre, l'humidité du sol, les variations brusques de la température, une nourriture succulente, la vie molle et somptueuse que l'on mène dans les classes les plus riches de la société, enfin le séjour des grandes villes. Pourrait-on ajouter à ces causes éloignées, et peut-être plus actives chez les Anglais, 1°. le caractère national de ce peuple froid et mélancolique, que l'on entrevoit dans ce goût décidé pour les tragédies les plus noires, les catastrophes les plus sanglantes, et les romans les plus sombres, ou remarquables par une hardiesse gigantesque et monstrueuse; 2°. cette disposition innée, ce penchant profond ou même naturel à la méditation et aux sciences les plus abstraites; 3°. leur atmosphère charbonneuse, et l'usage presque exclusif des poêles; 4°. l'excès du thé et l'usage des liqueurs alcooliques, qu'ils portent jusqu'à l'abus le plus monstrueux, etc. etc.? Mais n'anticipons pas plus long-temps sur l'examen des autres causes.

En résumé, si nous considérons que l'imagination est exaltée chez la plupart des hypocondriaques, quand surtout la maladie a déjà fait des progrès, que le développement de l'imagination est en raison inverse de l'énergie des autres fonctions intellectuelles, que les climats chauds sont favorables à l'exaltation de cette faculté, tandis que le jugement prédomine dans les pays froids, nous serons très-portés à penser que les températures les plus élevées sont les plus fécondes en affections vaporeuses, à moins qu'un grand nombre d'autres causes n'ajoutent à l'action d'une température moderée, comme nous l'avons vu pour l'Angleterre.

Les saisons sont en quelque sorte des climats différens qui se succèdent, et font passer nos corps par les gradations diverses des températures les plus opposées, par les modifications les plus brusques. Mais la succession rapide de ces influences empêche qu'elles n'aient sur nous une action aussi profonde que les climats dont l'empire est constant dans ses élémens essentiels. Toutefois une température douce, et surtout un temps serein, agissent d'une manière favorable sur notre moral; ils semblent propres à réprimer les écarts de l'imagination, ils inspirent non-seulement une satisfaction réelle, mais souvent encore ils apportent plus de calme dans l'esprit, plus d'égalité et de douceur dans le caractère.

C'est ainsi que le froid sec et modéré de l'hiver, ou les beaux jours du printemps et de l'automne, durant lesquels le soleil échauffe l'atmosphère, excitent en nous des idées et des sensations agréables, provoquent l'appétit, et facilitent la digestion. On peut donc regarder ces deux états de l'atmosphère comme pouvant éloigner les maladies nerveuses; tandis que le froid très-intense, une température constamment humide, et surtout les chaleurs brûlantes de l'été, qui en général diminuent l'activité du système digestif, préparent fréquemment ces névroses, et plus souvent encore en déterminent les paroxysmes.

C'est encore un fait connu depuis long-temps, que l'intensité d'un froid continu est beaucoup moins à craindre que le passage subit d'une température élevée à un air très-condensé : ce sont les refroidissemens au moment d'une transpiration abondante, les boissons froides après l'impression d'une forte chaleur, qui donnent si souvent accès aux maladies, ainsi qu'aux névroses des fonctions digestives. Néanmoins l'action prolongée de l'humidité, celle qui résulte d'un séjour insalubre ou trop humide, est aussi une source féconde de maladies nerveuses; toutes les circonstances qui troublent ou diminuent la transpiration, non-seulement donnent naissance à ces affections, mais elles ont en outre l'inconvénient d'aggraver les phénomènes nerveux qui leur sont

propres, et de produire quelquefois des redoublemens. Cependant, il faut en convenir, la corrélation observée par *Réveillon*, entre les irrégularités de la transpiration et les anomalies nerveuses des hypocondriaques, nous paraît avoir été exagérée par ce médecin, qui ne reconnaît les chagrins que comme causes secondaires des névroses, et prétend que ces malades sont exempts de passions; nouvelle preuve de l'aveugle prévention que produisent les systèmes hypothétiques et les opinions exagérées ou exclusives.

Voulant éviter cet écueil, nous nous contenterons de reconnaître seulement ce qui nous est démontré par l'expérience et les autorités les plus décisives; que toutes les circonstances qui portent le désordre dans cette fonction sécrétoire sont susceptibles de provoquer les affections hypocondriaques, et d'en déterminer l'exacerbation. *Hippocrate* nous apprend aussi que la suppression des sueurs et le dérangement de la transpiration peuvent occasionner ces sortes de maladies. Non-seulement l'état de l'atmosphère, mais encore les émanations et les principes odorans qui y existent en suspension, agissent parfois comme irritant chez les individus très-nerveux; toutefois leur action est rarement assez continue ou assez puissante pour donner naissance à l'hypocondrie; elle se bornera à en aggraver momentanément

les divers symptômes. Mais les miasmes qui s'élèvent des matières animales ou végétales en putréfaction, ou des eaux stagnantes, exercent sur toute l'économie une influence très-préjudiciable, et peuvent, au milieu des nombreux désordres qu'ils occasionnent, donner lieu directement ou indirectement aux névroses des organes digestifs.

C'est par un mécanisme analogue qu'une dame, à laquelle je donne des soins, est devenue hypocondriaque. Elle jouissait habituellement d'une très-bonne santé, lorsqu'un jour elle fut exposée assez long-temps à la vapeur du charbon; elle éprouva, par suite de cette asphyxie, des accidens fort graves, qui se dissipèrent promptement; mais depuis lors sa santé fut toujours dérangée, et une hypocondrie des mieux caractérisées en a été le résultat.

Après avoir examiné la part des objets qui nous environnent au développement de cette maladie, nous allons considérer un autre ordre de causes, l'action des *applicata*, c'est-à-dire, des objets appliqués sur nous.

Toute compression, trop forte et trop continue, opérée sur nos organes, amène un résultat défavorable; de là l'influence fâcheuse des vêtemens qui comprimaient l'abdomen, et qui a fait adopter aux hommes l'usage des bretelles. Il est certain que le point d'appui, pris sur les épaules,

est moins dangereux que la pression exercée sur tous les viscères abdominaux. Cette innovation offrirait un nouvel avantage, si les bretelles étaient plus larges, ou mieux, si l'on rattachait au gilet l'autre vêtement, ainsi qu'on le pratique souvent chez les enfans : ce qui dispenserait de l'usage des bretelles.

L'habillement des femmes est bien moins exempt de reproches; la constriction qu'elles emploient pour faire *briller la taille* ou pour l'amincir, gêne les poumons, le cœur, le diaphragme, l'estomac, etc. Considérée en outre sous le rapport du goût, elle est du dernier ridicule; rien ne ressemble à une poupée, comme ces femmes qui ont l'air d'être dans une gaîne, ou dont la taille est en quelque sorte étranglée. La véritable élégance, *et la grâce, plus belle que la beauté*, repoussent toutes ces entraves; elles consistent spécialement dans l'exact rapport, dans l'harmonie de toutes nos parties, dans l'aisance, le naturel et le moelleux des mouvemens. Nous connaissons une jeune femme dont la taille est tellement serrée, qu'il existe autour de son corps une large bande noire, suite de cette compression; sans être gravement malade, elle passe sa vie dans une disposition constante à l'hypocondrie. Une autre dame éprouvait une tristesse très-grande, toutes les fois que ses vêtemens la comprimaient; mais depuis qu'elle en a reconnu

la cause, elle l'évite avec soin, et sa santé y a beaucoup gagné. Si les vêtemens ne doivent être ni gênans, ni trop étroits, on doit encore recommander qu'ils n'offrent aucune nudité; car, en découvrant sans grâce et sans mesure leurs bras, leur poitrine ou leur dos, non-seulement les femmes s'exposent aux affections hypocondriaques, mais elles semblent même de gaîté de cœur braver ou rechercher les maladies de poitrine, qui marquent tant de victimes dans leurs rangs.

Le froid a encore d'autres modes d'action; toute substance réfrigérante, appliquée sur une affection cutanée ou sur une douleur, soit rhumatismale, soit goutteuse, tout refroidissement ressenti, au moment d'une forte transpiration, sur une partie quelconque de notre corps, peut devenir parfois l'origine de cette névrose. Il en est ainsi de l'immersion volontaire ou accidentelle des mains ou des pieds dans l'eau froide, des ablutions, d'un bain froid, d'une averse reçue dans des circonstances analogues. On s'expose au même péril en quittant brusquement ses vêtemens, ou en changeant des tissus très-chauds contre d'autres beaucoup plus conducteurs du calorique, si surtout on fait succéder l'inaction au mouvement.

C'est une loi, sans exception, que tous les organes de la vie animale ne peuvent exercer

leurs fonctions qu'avec des intermissions, ou, en d'autres termes, qu'étant susceptibles de se fatiguer, ils ont besoin de repos. Ce temps, donné à la réparation des forces, prend le nom de repos, pour les agens dont les actes sont matériels, et de sommeil, pour ceux qui président à nos facultés intellectuelles; et s'il n'est pas moins constant qu'il existe entre toutes nos parties un *consensus* que trouble l'exercice immodéré d'une classe d'organes, on conçoit comment l'usage journalier, inconsidéré d'une fonction, porte détriment aux autres : c'est ainsi qu'en exerçant trop exclusivement les fonctions intellectuelles, et en laissant dans l'inaction les agens de la locomotion, on trouble l'équilibre, l'harmonie qui doit exister entre tous nos systèmes, entre toutes nos parties. Aussi les personnes qui, par profession ou par goût, sacrifient habituellement à l'application soutenue de leur entendement toute action des agens locomoteurs, exposent leur santé, et de même ceux qui, sans donner beaucoup d'essor à leurs facultés morales, languissent dans la vie sédentaire.

Les inconvéniens de cette inaction sont beaucoup plus sensibles dans la jeunesse et l'âge adulte, aux époques où l'exercice est le plus nécessaire; car dans la vieillesse le repos n'offre plus le même danger. C'est aussi chez l'adulte principalement que nous considérerons, sous le rapport du mou-

vement et de la locomotion (1), les différentes professions auxquelles se vouent les hommes qui composent la société. Nous verrons par cet examen que, plus les gens de lettres, les artistes, les avocats, les médecins, les hommes de cabinet, les négocians, etc., sont par leurs professions obligés à une vie peu active, plus celles-ci compromettent en général, et toutes choses égales d'ailleurs, la santé, et disposent même à l'hypocondrie. Un de mes amis, employé supérieur dans une administration, éprouve de fréquentes atteintes de vapeurs, lorsqu'il est obligé de se livrer trop long-temps au travail de tête. L'exercice au milieu des champs, ou plutôt un séjour un peu prolongé à la campagne, lui procurent constamment une amélioration sensible.

Parmi les divers métiers, on peut distinguer celui de portier, de tisserand, de tailleur, de cordonnier ou de ferblantier, dont les individus font peu de mouvemens, et restent le plus souvent assis; ceux de boulanger, de menuisier, de boucher, de brasseur, de serrurier, de maçon, de charron, etc., où les bras sont plus spécialement exercés, et où la locomotion est peu étendue; enfin celui de perruquier, de charretier, de jardinier, de marchand forain ou ambulant, qui

(1) Plus loin nous examinerons l'influence morale des professions, arts et métiers, comme cause de cette vésanie.

sont dans un exercice presque continuel. On doit encore, parmi ces états, noter ceux de cordonnier, de chapelier, de tailleur, de tisserand, etc., qui agissent sur les organes abdominaux d'une manière spéciale, en les comprimant avec plus ou moins de continuité, et qui peuvent, d'après *Ramazzini* et *Zimmermann*, devenir causes de l'hypocondrie. Il faut, d'une autre part, remarquer que plusieurs de ces professions, nécessitant une attention suivie, sans aucune forte contention d'esprit, agissent le plus souvent d'une manière moins désavantageuse qu'on pourrait le croire au premier coup-d'œil.

Les bateliers, les conducteurs de voitures, d'équipages, de cabriolets, de diligences, etc., occupés du soin de leurs chevaux, et surtout de leur maniement ou de leur direction, joignant à l'activité physique une sorte d'exercice moral, ont à cet égard peu à redouter de leur profession. Les travaux nécessités par la culture des terres sont encore plus favorables à la santé, quand on peut éviter l'extrême fatigue : aussi voit-on rarement les affections nerveuses, et surtout l'hypocondrie, parmi les habitans de la campagne.

Les militaires sont également peu accessibles aux névroses : outre les périls auxquels les expose le sort des armes, ils sont toujours en butte aux intempéries de l'atmosphère, aux refroidis-

semens consécutifs; souvent ils suppléent à la pénurie et à la mauvaise qualité des vivres par de fortes doses de liqueurs alcooliques mal préparées. Toutes ces circonstances font naître chez eux des phlegmasies aiguës, qui passent souvent à l'état de chronicité, ou des inflammations qui, dès le principe, ont une marche chronique. Les militaires, une fois dans les rangs, sont en général égoïstes, et plus exposés aux fatigues et à la misère qu'à la vie sédentaire, aux contentions d'esprit ou aux peines de l'âme, sources fréquentes des névroses; mais lorsqu'au tumulte des camps, au fracas des armes, ils font succéder le charme de la retraite, d'une existence douce et tranquille, ils deviennent sujets aux maladies des citadins. Le même sort est réservé aux commerçans, aux artisans, aux cultivateurs, et à tous ceux qui remplacent par le repos une activité plus ou moins continue.

L'observation suivante, transmise par *Réveillon*, nous en fournit la preuve.

Un militaire qui s'était distingué pendant plusieurs campagnes, et qui avait bravé tous les dangers de la guerre avec un sang-froid imperturbable, se retire au sein de sa famille; bientôt il ressent les mauvais effets du passage subit d'une vie active à l'inaction et à la vie sédentaire; il éprouve les symptômes de l'hypocondrie la mieux avérée, et celui que les plus grands périls

n'avaient jamais intimidé devint aussi craintif que la femme la plus pusillanime. Il ne pouvait passer d'une chambre dans une autre, parce que, disait-il, ses jambes se dérobaient sous lui. Une vie sobre, des alimens choisis, quelques doux stomachiques et un exercice soutenu, furent les seuls moyens employés, et dont le résultat fut une guérison prompte et solide.

J'emprunte au docteur *Maisonneuve* l'observation suivante que j'ai abrégée; elle mettra en évidence la possibilité de l'hypocondrie chez les cultivateurs, quand surtout ils se trouvent sous l'influence des causes qui agissent ordinairement sur l'habitant des villes. *Simon*, laboureur, âgé de trente-cinq ans, d'un tempérament lymphatico-sanguin, ayant travaillé toute une journée à l'air, par un temps froid et humide, en novembre 1800, rentra chez lui avec des douleurs dans tous les membres, et un accablement général; il ne soupa point, se mit au lit, et sua beaucoup. Le second jour, il se trouva faible et sans appétit; il crut n'avoir pas assez sué, entassa couverture sur couverture, mouilla six chemises, et n'en fut que plus mal. Il essaya de manger, et eut de la peine à digérer les alimens grossiers qu'il avait pris. Il consulta pour lors un chirurgien qui le purgea plusieurs fois, et lui fit boire une grande quantité de petit-lait. Les digestions en devinrent plus pénibles;

le malade sentait une pesanteur continuelle sur l'épigastre, une douleur obtuse et tensive sous les dernières fausses côtes droites; des contractions irrégulières de l'estomac et de l'œsophage se joignirent bientôt à une perte totale de l'appétit; l'inquiétude, le chagrin se mirent de la partie; enfin au bout d'un mois Simon devint un hypocondriaque décidé; il ne se levait qu'à midi, n'osant plus faire un pas; de fréquens sentimens de suffocation lui faisaient craindre à chaque instant d'expirer, et plusieurs fois il envoya au milieu de la nuit chercher un prêtre. Se livrant à tous les charlatans, il suivait aveuglément leurs conseils : l'un le faisait suer dans du lait chaud; l'autre lui faisait appliquer sur le côté douloureux un chat ou un chapon tué depuis peu; celui-ci lui couvrait la tête et la poitrine de persil et de bêtes pilés ensemble; celui-là lui donnait un purgatif drastique. Tous exténuaient sa bourse par leurs escroqueries, sa santé par leurs remèdes, et sa raison par leurs pronostics fâcheux ou leurs promesses extravagantes.

Le 16 mai 1801, son visage était pâle et un peu bouffi; il se plaignait d'un resserrement au gosier, d'une grande faiblesse dans les jambes, d'un sentiment de tension dans les hypocondres, d'une douleur dans le dos, et le côté droit; et surtout d'un défaut absolu d'appétit, avec gon-

flement et pesanteur à l'estomac, aussitôt qu'il avait pris quelque aliment. Il lui montait de temps en temps des chaleurs au visage; il éprouvait des fourmillemens incommodes dans les mains, et de temps en temps le sentiment d'une boule qui montait de l'estomac le long de l'œsophage. Il était en outre gêné par des borborygmes continuels et des éructations fréquentes. En parlant de ses souffrances, il employait des expressions exagérées, et refusait de croire à la possibilité de sa guérison, après tout ce qu'il avait tenté en vain pour l'obtenir.

M. *Maisonneuve* essaya de lui persuader que ses maux, quoique grands, n'étaient point cependant aussi incurables qu'il le pensait, et tâcha en outre de lui prouver qu'il avait fait et faisait encore tout le contraire de ce qu'il fallait pour guérir, etc.; enfin il lui conseilla de se lever avec le soleil, de travailler autant qu'il le pourrait, et en plein air, de se tenir bien couvert, et de changer de chemise, si la sienne était mouillée; de ne manger à ses repas que du pain bien cuit, de la soupe un peu poivrée, de boire de temps en temps un verre de bon vin, d'éviter la sueur du lit, et de chasser de son imagination toutes les idées noires. Travail, sobriété, gaîté, ce fut là les seules médecines dont il lui permit l'usage. Au bout de dix jours le teint était vermeil, son visage n'était plus bouffi, ses membres avaient

recouvré leur agilité; il avait fait quatre lieues, lui qui n'osait auparavant faire un pas hors de sa maison. Son appétit n'était pas encore prononcé; mais les digestions n'étaient plus pénibles, et les contractions irrégulières de l'œsophage étaient fort diminuées; cependant il éprouvait encore des fourmillemens dans les mains et quelques borborygmes. Vingt-quatre pilules aloétiques, une tous les matins à jeun, et la continuation du régime, achevèrent la cure; au bout de deux mois Simon était parfaitement guéri.

Dans ces deux histoires particulières, et surtout dans la seconde, on reconnaît l'action simultanée de plusieurs causes qui ont contribué au développement de cette névrose; mais il me semble que l'inaction et des habitudes sédentaires y ont coopéré très-fortement.

Non-seulement chez les hommes, mais encore parmi les femmes, on compte beaucoup de victimes d'un genre de vie trop exempt de mouvement et de locomotion : il est même certain que les occupations familières aux personnes du sexe les disposent à cette vésanie plus que les travaux mécaniques ordinaires à l'homme ne l'y exposent. Il n'est pas rare non plus de rencontrer dans la société, et surtout dans les classes aisées, des jeunes personnes qui éprouvent les mêmes inconvéniens d'un état de repos habituel, ou mieux

d'un célibat trop prolongé. Aussi ce sont moins les très-jeunes personnes dont nous faisons ici mention, que les demoiselles qui s'éloignent déjà plus ou moins de l'époque de la puberté. Celles-ci offrent fréquemment les symptômes les mieux caractérisés de l'hypocondrie simple, sans aucun des phénomènes propres à l'hystérie, et retrouvent presque toujours la santé aussitôt qu'elles font succéder à leur désœuvrement les soins d'un ménage, et au vide du cœur le charme d'une union conforme à leur besoin ou à leurs désirs. J'en ai rencontré, dans ma pratique, un assez grand nombre d'exemples, et, je le répète, sans mélange d'aucun symptôme hystérique : plusieurs de mes confrères m'ont assuré en avoir également observé.

Doit-on comprendre dans cette énumération des causes les grands exercices du corps, comme l'ont fait *Sydenham* et son commentateur? On ne voit, à la vérité, presque jamais l'hypocondrie parmi les individus livrés à une vie très-active ou à des travaux pénibles; cependant un exercice violent, des fatigues excessives, peuvent amener des accidens si multipliés, surtout chez les individus mal disposés, ou qui n'y sont pas habitués, qu'on ne doit pas rejeter d'une manière absolue l'action d'une telle cause sur le développement de cette névrose.

Après avoir examiné l'influence que produit

sur notre santé l'exercice excessif, et plus encore l'inaction de nos organes, nous allons passer rapidement en revue les effets sur notre économie des substances que nous y introduisons. On distingue les substances prises à l'intérieur en alimentaires et en médicamenteuses : les unes et les autres sont solides ou liquides.

L'abus des alimens, l'habitude d'une table trop recherchée, qui, par la variété des mets, provoque un appétit démesuré, fatigue fréquemment les organes digestifs, et entraîne à sa suite, tantôt leurs dérangemens accidentels, d'autres fois leurs névroses : cette cause sera d'autant plus puissante, qu'à l'issue de ces repas copieux on se livrera à des excès de différens genres, à une application trop soutenue, et surtout dans une position gênante pour l'estomac et ses annexes. On sait qu'à l'instant de la digestion les forces vitales sont en quelque sorte concentrées sur les organes qui sont les agens principaux de cette fonction importante : dans cette circonstance, toute contention d'esprit, toute application à des sciences abstraites, nécessite leur déplacement : les forces vitales sont appelées vers le cerveau; la digestion est suspendue ou languit; l'estomac, privé des forces nécessaires pour exécuter ses fonctions, éprouve un état de gêne qui se manifeste bientôt par un malaise général, et par la tension du diaphragme et des hypocondres. Ce trouble

augmente d'autant plus, qu'il se renouvelle plus fréquemment. Tels, et plus pernicieux encore, sont, un régime trop austère, une abstinence continue, des jeûnes multipliés, la privation absolue des nourritures succulentes et des boissons fortifiantes, ou enfin la mauvaise qualité des eaux. C'est à cette série de causes qu'il faut rapporter l'existence de cette névrose parmi les artisans livrés à une vie pénible et sans déplacement, ou privés d'une certaine aisance, et parmi les cultivateurs, qui, à des travaux très-rudes, joignent une nourriture insuffisante ou grossière et l'abstinence des liqueurs excitantes. L'usage excessif des boissons alcooliques, et surtout un état d'ivresse presque habituel, amène souvent le même désordre : à ce trouble physique se joint ordinairement un abrutissement moral, qui peut même conduire à l'idiotisme.

Une boisson très-froide ou à la glace, prise dans le moment d'une soif ardente et d'une forte transpiration, ne manque presque jamais d'occasionner de fâcheux résultats, au nombre desquels on peut placer l'hypocondrie. Une jeune femme bien portante, pour engager son enfant à prendre des eaux minérales ferrugineuses, en but elle-même, étant en sueur, un grand verre, qui produisit une vive irritation de l'estomac, et par suite une névrose des plus violentes : cette maladie fut long-temps rebelle, et enfin affai-

blie par l'usage des eaux sulfureuses d'*Enghien*.

On ajoute au péril quand, après avoir ainsi bu froid, on s'abandonne au repos ou au sommeil; on diminue au contraire le mal si, à la suite de cette imprudence, on se livre à un exercice très-prononcé. Citons, à ce sujet, le trait d'un général français. Après une marche forcée, au milieu des chaleurs brûlantes de l'été, une colonne, exténuée de fatigue et de soif, arrive au bord d'une rivière; le général défend aux soldats de se désaltérer de suite; mais ses efforts sont inutiles; une force involontaire les entraîne, et tous étanchent leur soif. Aussitôt il place en divers lieux les musiciens et les tambours, fait exécuter à ses troupes des marches militaires, et les sauve, par cette conduite ingénieuse, d'un danger qu'elles n'avaient pas même soupçonné.

Les médicamens donnés à l'intérieur, sous forme solide ou liquide, peuvent aussi occasionner cette vésanie, quand leur emploi est inconsidéré, leur usage trop long-temps continué, ou porté à une dose trop forte.

Nous allons prendre pour exemple les délayans que l'on administre si fréquemment; il est évident que, donnés dans une fièvre inflammatoire, bilieuse ou putride, ils peuvent, sans entraver la terminaison heureuse de cette maladie, laisser les organes de la digestion, et même toute l'économie, dans une telle faiblesse, que les accidens

de l'hypocondrie seront imminens, et que la moindre circonstance défavorable pourra déterminer cette affection. S'ils sont administrés en trop grande quantité, ou continués trop longtemps, leurs effets seront encore plus nuisibles; cependant rien n'est plus ordinaire que leur usage prolongé, même pendant les convalescences, et souvent rien ne s'oppose davantage au retour des forces ou de la santé, et ne favorise autant l'invasion d'une affection hypocondriaque. *Buchan*, *Tissot* et *Zimmermann*, accusent l'usage trop fréquent du thé d'être favorable à la production de cette névrose, et ce n'est sans doute que par une action analogue au résultat de l'abus des boissons délayantes. L'observation suivante en fera sentir les inconvéniens.

Une jeune femme, âgée de trente ans, d'une bonne constitution et d'un tempérament sanguin, était accouchée depuis onze mois d'un enfant qu'elle confia à une nourrice; lorsqu'il lui survint une fièvre bilieuse, d'autant mieux caractérisée qu'elle était simple et très-intense. Cette maladie parcourut ses périodes, et se termina après le troisième septénaire. Les boissons délayantes furent le principal remède mis en usage dès le principe, et qui ne fut pas interrompu, même pendant la convalescence. Aussi les forces ne revenaient pas, la malade se plaignait de malaises, de faiblesses; elle ressentait

de la lenteur à marcher, des engourdissemens, des borborygmes, des coliques; le ventre était gonflé, les digestions s'opéraient avec peine; il y avait céphalalgie, souvent de l'insomnie, et une constipation opiniâtre : le flux menstruel était moins abondant que dans l'état de santé. Le médecin appelé en consultation fut instruit des accidens que cette dame avait éprouvés; il reconnut que la fièvre bilieuse était depuis longtemps terminée, et soupçonna que ce nouveau désordre était entretenu par l'abus des délayans, que l'on continuait, sans y joindre aucun médicament propre à relever les forces. La malade était en outre soumise à un régime très-sévère, et ne sortait pas de sa chambre. Un exercice modéré lui fut conseillé; on la mit à l'usage du vin d'absinthe pour le matin, de l'extrait de genièvre avant dîner, et d'une potion calmante et tonique pour le soir.

On prescrivit une nourriture saine, peu copieuse, mais succulente, l'eau ferrée et un peu de bon vin. On y ajouta les bains de siége pour exciter les règles, qui reparurent plus abondamment dès le premier mois. Peu de temps après, les forces se rétablirent sensiblement; et au bout de trois mois, cette dame fut en pleine santé.

Si on avait prolongé dans ce cas-ci les boissons délayantes et la diète, et si on n'avait pas eu recours au régime tonique et à l'exercice, il serait

survenu très-probablement une hypocondrie des mieux caractérisées. Ce fait, entre mille autres, est une nouvelle preuve du soin qu'il faut apporter dans la pratique médicale pour reconnaître une maladie, en suivre la marche et les terminaisons ; il nous démontre aussi la nécessité d'avoir toujours égard, dans le traitement, aux divers temps de l'affection. Dans le cas suivant, cette névrose nous paraît encore dériver de la même source.

M. P** fut atteint d'une gonorrhée, à laquelle on opposa dès le principe et exclusivement l'orgeat à la dose d'une pinte par jour, et quelques gouttes de baume de *Copahu*. Le malade suivit ce régime pendant près d'un an : c'est vers la même époque qu'il éprouva les premiers symptômes de son hypocondrie, dont il attribue, non sans quelque raison, l'origine à ce traitement inconsidéré. Il est également avéré que les boissons rafraîchissantes, prises en trop grande quantité, et surtout dans les pays méridionaux, peuvent compromettre les fonctions digestives de la même manière.

C'est une remarque faite depuis long-temps, que l'excès du vin et des liqueurs alcooliques offre les mêmes dangers que la privation absolue de toute boisson excitante ; on peut donc dire que l'abus des toniques et celui des débilitans produisent le même effet. Un homme énervé par le défaut de

boissons excitantes, et l'individu plongé dans un état d'ivresse, ne paraissent-ils pas l'un et l'autre réduits au même degré, l'un de faiblesse directe, l'autre de débilité indirecte, ou par excès d'excitation? Les toniques, comme les boissons amères, les vins de même nature, donnés trop précipitamment, à doses excessives, ou pendant très-long-temps, dérangent par un procédé différent, mais dont le résultat est le même, les fonctions de notre économie. On sait encore que les fébrifuges, comme le quinquina, prescrits sans ménagement, convertissent parfois une fièvre intermittente en une hypocondrie très-pénible. Une consultation, que nous avons adressée en province, peut éclairer la question qui nous occupe. (*Hypocondrie par suppression d'une fièvre intermittente.*)

Madame D**, pour laquelle on réclame mes conseils, est âgée de quarante-quatre ans, et n'éprouve encore aucun dérangement dans ses règles; mère de neuf enfans, elle en a nourri huit. Il y a sept ans qu'elle fut prise, lorsqu'elle nourrissait, d'une fièvre intermittente, qui céda trois fois à de fortes doses de quinquina. C'est de cette époque que date sa maladie, et cette remarque est importante (parce qu'il arrive quelquefois que la guérison de ces fièvres, quand surtout elle a été brusquée, détermine des affections nerveuses, etc., quoique le plus souvent

on n'ait pas à craindre de suites semblables). Madame D** ressent une débilité générale, des étourdissemens, une compression autour de la tête, des faiblesses dans les mains et les pieds, qui s'opposent à tout exercice. Le mouvement et l'application augmentent ces accidens : il s'y joint de l'agitation, de l'insomnie, des palpitations, une sorte de tremblement intérieur et des crispations, des vents, des mucosités; la bouche est souvent pâteuse; du reste, l'appétit est bon, et il n'y a point d'amaigrissement; mais depuis deux mois la maladie ne donne aucun relâche, et fait même des progrès.

L'exposé de madame la consultante est, comme elle le dit, l'expression de la vérité : il est d'une exactitude assez rare, et ne nous laisse d'autres renseignemens à désirer que ceux relatifs au type et à la durée des trois attaques de fièvre intermittente; je suis également véridique dans l'assurance que je me plais à lui donner, que sa maladie, bien que fort douloureuse, est cependant peu inquiétante, et très-susceptible de guérison. Je l'engage à s'armer de courage, d'espoir et de confiance dans sa bonne constitution, qui n'est point sensiblement altérée. L'estomac lui-même n'est pas profondément affecté, il n'est qu'affaibli; sa sensibilité, et par suite celle de tout le système est exaltée : de là vient tout le désordre nerveux qu'éprouve madame D**.

En considérant que cette maladie a suivi de près la guérison de la fièvre intermittente, on peut croire que l'administration prématurée du quinquina, ou des doses trop fortes de ce médicament ont occasionné la névrose. Il nous semble également qu'il existe deux indications principales à remplir, et qui se confondent : 1°. diminuer l'exaltation de la sensibilité générale, 2°. relever, par l'emploi modéré et long-temps continué des toniques, l'énergie vitale qui est affaiblie ; c'est dans ce double but que nous proposons le régime suivant.

1°. Madame D** boira, tous les matins à jeun, et en trois verres, la décoction suivante :

Quina en poudre..... ʒ j
Faites bouillir dans eau..... ℥ xij
Ajoutez sirop de gentiane et antiscorbutique..... } ãã ℥ j.

2°. Avant dîner elle fera usage d'une prise du mélange ci-contre :

Rhubarbe..... }
Cachou..... } ãã ʒ j.
Crème de tartre..... }

Divisé en seize paquets.

3°. Madame prendra le soir, deux ou trois heures après souper, la valeur de quatre à six cuillerées à bouche de la potion suivante :

℞ Eau dist. d'hysope..... }
de menthe..... } ãã ℥ jß

Sirop de karabé..... ℥ ß
Sirop d'érysimum..... ℥ jß
Eau de fleur d'orange..... ℥ ß
Sirop d'éther..... ℥ ß

On en règlera la quantité d'après le plus ou moins de sommeil et de calme qu'elle provoquera. Madame pourra en prendre une cuillerée dans la journée, chaque fois qu'elle éprouvera de la souffrance ou une irritation vive.

4°. Le régime consistera en fruits bien mûrs, crus ou cuits, et en petite quantité; en légumes un peu amers, non farineux, en viandes douces et rôties, de préférence. Sa boisson ordinaire sera une eau de *Seltz* coupée avec un filet de vin, et parfois elle se permettra un peu de bon vin pur.

5°. Il importe que madame évite toute contention d'esprit, et qu'elle insiste sur un exercice modéré, progressif, en bon air, au milieu des arbres et de la végétation, en évitant l'excès de la chaleur et les refroidissemens subits; elle se livrera à diverses promenades, soit à cheval et au pas d'abord, soit en voiture, ou enfin à pied. Il faudra vaincre la répugnance qui s'oppose à ce moyen, parce qu'il est trop nécessaire pour être négligé.

Si, contre notre attente, cette névrose résistait à ces différens conseils, il est un procédé auquel on pourrait avoir recours au printemps, et qui consisterait à faire contracter une fièvre

intermittente vernale, par un séjour momentané dans un pays où cette maladie régnerait épidémiquement ou endémiquement. On n'y opposerait, pendant long-temps, qu'une simple tisane amère, sauf à faire cesser entièrement cette affection fébrile au bout de quelques mois; mais j'espère beaucoup que le traitement conseillé et bien suivi dispensera d'employer cette dernière ressource, dont l'expérience a quelquefois démontré l'efficacité.

Le quinquina, l'un des remèdes les plus utiles, peut donc ainsi devenir cause de maladie : cette circonstance a contribué sans doute à accréditer l'opinion qu'il était propre à causer des obstructions; mais, il faut en convenir, son usage bien dirigé n'est presque jamais susceptible de mauvais effets. Les engorgemens qui surviennent alors formaient la maladie essentielle, dont la fièvre n'était qu'un symptôme : ce qui me confirme dans cette opinion, c'est que j'ai vu le quinquina, administré à propos, dissiper des obstructions au foie ou à la rate, et des leucophlegmasies symptomatiques. On trouve plusieurs observations à l'appui dans le *Journal de la Société de Médecine*, t. 34, p. 129.

En nous rappelant la connexion intime des organes digestifs et leur sensibilité exquise, nous concevrons quel rôle jouent les purgatifs dans la production de cette maladie; si ces médicamens

constituent un des grands moyens de l'art de guérir, ils sont en même temps un de ceux dont on abuse le plus. Leur administration inconsidérée ou trop multipliée donne lieu très-souvent à des irritations vives, d'où découle cette vésanie, mais plus fréquemment encore ils aggravent l'hypocondrie quand celle-ci commence, ou quand elle n'a pas jeté des racines profondes. Ces considérations s'appliquent également aux émétiques, dont cependant l'emploi irréfléchi concourt plus spécialement aux lésions organiques de l'estomac.

Nous avons signalé l'abus des purgatifs comme une des causes les plus puissantes de cette vésanie; nous ferons également remarquer que les narcotiques donnés inconsidérément sont susceptibles, en arrêtant les sécrétions, de préparer les mêmes résultats. On connaît leur mode d'action, d'abord sur l'estomac, puis sur le cerveau, et enfin sur les facultés mentales; mais c'est le trouble qu'ils opèrent dans les fonctions digestives et les sécrétions dont on doit spécialement redouter l'influence fâcheuse. *Hoffmann* (1) rapporte l'exemple d'un homme de trente-deux ans, chez qui la suppression d'une diarrhée habituelle, par une dose excessive d'opium, entraîna une affection hypocondriaque, qui fut long-temps

(1) *De Malo hypocondriaco*, p. 75, t. III.

rebelle. C'est ainsi que *Grimaud* reproche, et avec raison, à l'usage même modéré, mais continuel des narcotiques, d'être cause de l'hypocondrie; aussi voit-on ceux qui abusent ainsi des médicamens opiacés détruire l'énergie de leur système digestif, et marcher vers cette névrose. Si on porte accidentellement la substance narcotique à une dose très-forte, elle produit une irritation vive et l'empoisonnement. L'opium agit, chez les Musulmans, comme excitant; il les provoque également aux combats de Mars et aux plaisirs de l'amour; mais s'ils en outrent à la fin la dose, alors sa vertu excitante devient nulle : il n'agit plus que comme stupéfiant et débilitant; toutefois s'ils en quittent trop tôt et brusquement l'usage, leurs organes digestifs, privés de l'excitant accoutumé, sont tôt ou tard frappés d'une très-grande débilité. On peut quelquefois opposer les substances opiacées et les astringens à certaines diarrhées chroniques qui sont sans fièvre, et entretenues par la seule faiblesse du malade; mais il faut n'avoir recours d'abord qu'aux moins énergiques, surtout quand la nature est habituée à cette évacuation; en même temps on ranime peu à peu les forces par un régime restaurant doux et modéré, et par les légers toniques, dont on augmente la dose ou l'énergie d'une manière progressive. Dans d'autres cas, l'ignorance ou le charlatanisme recom-

mande les astringens même les plus actifs ou les narcotiques, contre des phlegmasies intestinales avec dévoiement, soif et douleur : leur usage est alors très-dangereux, et peut donner accès aux affections hypocondriaques, etc.

Les premiers ont un mode d'action analogue aux effets qui résultent de l'impression du froid; ils resserrent le diamètre des vaisseaux, et empêchent le sang d'arriver à l'extrémité des capillaires. En s'opposant à son cours, et surtout aux élaborations qu'il doit éprouver, ils arrêtent les sécrétions. Les acides blanchissent les lèvres en répercutant le sang : ce qu'ils produisent à l'extérieur, les astringens l'opèrent à l'intérieur; et l'on conçoit en partie comment ils dérangent ces fonctions. C'est ainsi que des lavemens à l'eau froide, ou composés avec des substances astringentes, suppriment, par une action indirecte, les règles, les ménorrhagies, les leucorrhées, etc; et par une action directe, les diarrhées ou flux de ventre.

Dans le fait suivant nous verrons une hypocondrie déterminée par l'abus de ces médicamens. M. P**, d'une haute stature et d'une constitution délicate, éprouve une gonorrhée, et la combat pendant plus d'un an par des pilules faites avec l'alun et le baume de *Copahu*. Peu de temps après il ressent des maux d'estomac; ses digestions deviennent lentes et pénibles, et bientôt

l'hypocondrie se caractérise de plus en plus.

Le mercure, surtout à l'intérieur, cause ainsi, chez beaucoup d'individus, des irritations lentes, ou un état notable de faiblesse : or, ce sont là deux circonstances favorables à la formation de cette vésanie. A ces premiers effets il faut ajouter son action sur les glandes salivaires, et son influence sur l'esprit des malades, qui tantôt s'imaginent n'être pas guéris, ou qui attribuent à cet agent les dérangemens consécutifs de leur santé.

L'habitude des remèdes pris sans motif plausible, ou la manie des médicamens, précède et détermine parfois l'hypocondrie, dont elle constitue, plus souvent encore, un symptôme.

L'usage du sucre a été regardé par *Fracassini*, comme capable de la produire ; mais pourquoi rechercher des causes incertaines, quand il en existe de si parfaitement reconnues ?

Non-seulement les substances qui agissent sur notre organisation concourent au développement de cette névrose, mais nous allons voir, en outre, différens états de notre économie y contribuer également.

Nous avons déjà mentionné le rapport qui existait entre tous nos organes ; mais on sait qu'il règne une connexion encore plus intime entre les systèmes cutané, muqueux et digestif; qu'un refroidissement éprouvé aux pieds détermine des catarrhes pulmonaires, des diarrhées ; que

certains alimens produisent des éruptions à la peau; que les affections cutanées, comme variole, érysipèle, rougeole, scarlatine, s'accompagnent presque toujours de coryza, de larmoiement, d'angine, de vomissemens, d'embarras gastrique, etc. On connaît en outre l'action générale du système sanguin, qui se distribue dans toutes les parties du corps humain; de ce *consensus*, de ces rapports sympathiques; il résulte une foule d'effets qui peuvent entraîner à leur suite ces affections nerveuses.

Les causes propres à donner naissance à l'hypocondrie, suivant nos tissus organiques, sont :

1°. *Pour le système cutané :* les dérangemens de la transpiration, la cessation spontanée de certaines sueurs habituelles, générales ou partielles; aux pieds, sous les aisselles, aux mains, derrière les oreilles, etc.; le transport, à l'intérieur, d'une affection de la peau plus ou moins ancienne et intense; la dessiccation ou l'extinction prématurée d'une éruption quelconque, d'une ulcération, d'un vésicatoire, d'un séton, d'un cautère.

2°. *Pour le système muqueux :* des évacuations immodérées, la guérison inconsidérée d'une diarrhée critique ou habituelle; la cessation trop brusque d'une excrétion pulmonaire ou nasale très-abondante, d'une expuition considérable de mucosités, d'une gonorrhée ou d'un écoulement vésical, uréthral, vaginal; d'une leucorrhée, et

surtout des lochies ; enfin la négligence d'une purgation dont on a contracté l'habitude.

3°. *Pour le système glanduleux :* la prédominance des organes biliaires, la suppression d'une évacuation bilieuse, et autres dispositions de cet appareil dont nous avons déjà parlé, et sur lesquelles nous aurons bientôt occasion de revenir. Les salivations excessives, ou l'interruption précoce de cet écoulement critique ou favorable ; les déperditions spermatiques involontaires, ou suite de l'abus des plaisirs vénériens et de la masturbation, à laquelle se joignent la honte et les regrets ; quelquefois aussi la continence trop prolongée ; peut-être enfin la suppression ou la diminution d'un cours d'urine critique.

4°. Nous citerons en outre, comme causes relatives *au système sanguin :* le retard, la rétention ou la déviation d'un flux de sang périodique, l'omission d'une évacuation sanguine habituelle, la suppression d'une hémorrhagie salutaire, celle des menstrues, et plus souvent la suppression d'un écoulement hémorrhoïdal, d'un épistaxis ; quelquefois même la guérison d'une hémoptysie, d'un hématémèse, ou d'une autre hémorrhagie qu'on n'aura point combattue ou remplacée par la saignée ou l'application des sangsues ; des saignées indiscrètes ou trop copieuses. D'autres fois enfin, c'est un état de pléthore sanguine générale ou locale.

Le docteur *Broussais*, dans sa *Dissertation sur la fièvre hectique*, a noté au nombre des causes de cette affection l'allaitement trop prolongé; et, en effet, cette circonstance, qui porte souvent un préjudice notable aux fonctions digestives de la femme, doit être également rangée parmi les sources des névroses propres aux organes de la digestion.

L'affaiblissement des forces vitales ou cet état de faiblesse, qui succède à presque toutes les maladies, et qui est, en général, proportionné à la durée qu'elles ont parcourue, et à la diète qu'elles ont nécessitée, constitue une très-grande propension aux névroses des organes digestifs. Il peut en être ainsi de la douleur physique qui résulte d'une maladie quelconque, et qui peut sympathiquement troubler leurs fonctions ou exalter leur sensibilité (1).

Des digestions lentes et pénibles, peut-être l'absence d'une quantité suffisante de suc gastrique ou son altération (2), une atonie très-

---

(1) Plus loin nous examinerons la part que peut avoir au développement de l'hypocondrie le chagrin occasionné par une maladie chronique.

(2) J'indique cette cause avec réserve, puisqu'on ignore alors si l'altération des humeurs est primitive; ces altérations, on le sait, sont presque toujours, ou même toujours consécutives.

grande dans l'estomac, le foie, etc., des obstacles à la sécrétion ou circulation de la bile ; exemple : des concrétions biliaires, une sécrétion contre nature des sucs intestinaux, une constipation opiniâtre et habituelle, toujours symptomatique, quelquefois une simple indigestion, produite par une cause très-légère, peuvent amener les mêmes résultats.

Mais si de simples indispositions peuvent amener de pareils résultats, on conçoit qu'un trouble plus prononcé, ou plus durable dans l'organisation pourra souvent exercer une influence encore plus considérable. Aussi l'expérience nous démontre-t-elle que l'hypocondrie est un résultat assez ordinaire des diverses maladies qui affligent l'espèce humaine. Pour mieux apprécier la valeur de ces causes diverses, nous examinerons particulièrement les maladies qui ont pour siége le système abdominal, et ensuite celles qui résident dans des organes plus ou moins éloignés. C'est ainsi que nous avons vu l'hypocondrie se déclarer chez plusieurs individus, dans la convalescence d'une maladie aiguë, dont l'abdomen était le siége. Nous en avons rapporté des exemples p. 245 et 253, art. *Abus des délayans, Hypoc. chez les cultivateurs.*

Les vers existent chez un si grand nombre d'individus, leurs effets sont si variés, qu'ils peuvent devenir causes de maladie, et déter-

miner l'hypocondrie. Ceci est surtout applicable au ténia ou vers solitaire; c'est la seule affection vermineuse que nous ayons vu produire bien réellement cette névrose. L'état de faiblesse générale qu'on observe fréquemment chez les jeunes personnes, et qu'on a désigné sous le nom de *chlorose*, n'est-il pas une disposition à cette névrose, une hypocondrie imminente, ou même quelquefois une variété d'hypocondrie caractérisée par une très-grande atonie. Si nous parcourons la classe des inflammations ou phlegmasies, nous verrons celles de l'abdomen exercer sur le développement de l'hypocondrie une influence beaucoup plus considérable; de même, cette vésanie favorise plus l'invasion des phlegmasies abdominales que l'inflammation des organes pulmonaires, etc. Toutefois ce sont moins les phlegmasies aiguës violentes qui ont une grande part à la production de ces maladies nerveuses que les irritations légères, sourdes, habituelles ou continues, et plus encore les suites d'une inflammation vive, mais dont la résolution n'a pas été accompagnée de phénomènes critiques bien prononcés. Dans ce cas, l'inflammation aiguë agit à l'instar des phlegmasies chroniques. Aussi voyons-nous les personnes à tempérament bilieux, dont l'estomac est habituellement irritable, celles surtout qui éprouvent de la sensibilité au foie ou à la rate, qui sont su-

jettes aux évacuations bilieuses, aux concrétions biliaires, aux flux hémorrhoïdaux, très-souvent tourmentées par les affections hypocondriaques. Toutes les maladies auxquelles l'homme est exposé peuvent engendrer cette névrose pendant leur marche, ou plutôt lors de leurs terminaisons, et surtout quand leurs crises n'auront pas été complètes; mais on conçoit que les affections qui consistent dans l'exaltation ou la lésion des propriétés vitales du système nerveux abdominal jouent, à cet égard, un rôle beaucoup plus important. Ainsi, dans la classe des fièvres, il n'est pas douteux que les fièvres bilieuses ou gastriques, dont l'essence est l'irritation du système nerveux abdominal, ne favorisent singulièrement la naissance des névroses digestives; par la même raison, les fièvres muqueuses ou adéno-méningées jouent le second rôle, tandis que les pyrexies inflammatoires, qui offrent pour attribut spécial l'exaltation des propriétés du système circulatoire ou sanguin, les adynamiques, qui sont caractérisées par une atonie générale, et les ataxiques, dont le type primordial est une lésion ou les anomalies du système nerveux général, n'ont pas, sous ce rapport, une égale importance.

Les maladies très-mobiles, ou sujettes aux déplacemens, et qui, dans leurs vacillations, semblent affectionner les organes de l'abdomen,

méritent encore une mention particulière : telles sont les affections rhumatismales goutteuses, cutanées, etc. Le rhumatisme ordinaire, le rhumatisme, dit goutteux ou articulaire, et la goutte varient, en général, quant à leur siège et à leurs phénomènes ; ainsi l'expérience démontre que le premier réside le plus souvent dans les muscles et sur les aponévroses, ainsi aux lombes, au col, etc. Que le rhumatisme dit goutteux affecte les grandes articulations, tandis que la goutte a ordinairement son siége dans les petites articulations des doigts et des orteils. Ces maladies sont très-mobiles et sujettes aux déplacemens. Leur transport sur les organes abdominaux peut être spontané : on les voit même assiéger, dès le principe, les parties intérieures. Dans ce dernier cas, le rhumatisme, et surtout la goutte, peuvent simuler l'hypocondrie, ou même y donner naissance. Un médecin, doué d'un très-grand mérite, est depuis long-temps sujet à un rhumatisme vague, qui l'a souvent tourmenté. Les accidens qu'il produit varient suivant l'organe qu'il affecte ; à l'œil, il détermine une ophthalmie ; quand il se fixe vers le testicule, il en occasionne l'engorgement ; attaque-t-il les organes de l'abdomen, le malade est en proie à une hypocondrie véritable.

Il est une variété de la goutte que *Barthez* appelle *goutte vague imparfaite ;* c'est celle dont

le siége n'existe point aux extrémités, et qui est fixée sur les organes intérieurs ou vers les grandes cavités. Je crois qu'elle serait désignée plus exactement par la dénomination de *goutte vague primitive* ou *consécutive*, suivant qu'elle n'aura été précédée d'aucun accès, ou qu'elle aura succédé à plusieurs attaques de goutte régulière.

La constitution du sujet, une vie molle et voluptueuse, l'abus des liqueurs, joint à des habitudes sédentaires, une disposition goutteuse héréditaire, et l'absence de toute autre cause plus présumable, feront soupçonner une goutte vague primitive. Une longue rémission, après plusieurs attaques régulières et l'invasion correspondante de l'hypocondrie, ou l'apparition alternative de la goutte et de cette névrose, feront penser que celle-ci est le résultat d'une goutte vague consécutive. Je suis même très-porté à croire qu'un grand nombre de ces névroses est suscité, puis entretenu par le transport de diverses maladies, qui, des organes extérieurs ou de la surface cutanée, se fixent sur les viscères abdominaux. Nous rapporterons ici l'exemple d'un homme sujet à une affection dartreuse, qui alterne avec l'hypocondrie. Ses mains sont-elles couvertes d'une éruption farineuse très-visible, il jouit d'une parfaite santé; mais celle-ci s'altère aussitôt que la maladie de la peau a disparu; il ressent alors de la cardialgie, des tensions dans les hypocon-

dres, de la difficulté pour digérer, des borborygmes, de l'oppression, etc. Ses idées prennent malgré lui une teinte rembrunie, et bientôt tout l'inquiète; le calme se rétablit, aussitôt que la dartre reparaît. Il est maintenant soumis à un traitement approprié, dont nous espérons un heureux et double résultat. Nous avons vu une disposition rhumatismale jouer le même rôle. Aussi pensons-nous, soit dit par anticipation, qu'on a trop limité dans le traitement de ces maladies l'emploi des exutoires.

Mais de plus, l'hypocondrie peut être le résultat d'une irritation, ou d'une humeur fixée sur les organes, qui forment le centre épigastrique, et qui sera d'autant plus difficile à reconnaître, qu'aucun signe extérieur n'en aura dénoté l'existence. Dans d'autres cas, une dartre, après s'être manifestée à la surface cutanée, disparaît au bout de quelque temps, sans qu'il en résulte d'abord aucun trouble notable dans la santé; mais bientôt les digestions deviennent difficiles, une cardialgie plus ou moins continue se manifeste, l'hypocondrie est imminente; et l'on peut croire alors que l'affection dartreuse s'est établie sur les organes qui forment le centre épigastrique. Sans doute, on n'a point vu de dartres véritables sur les viscères, puisque la peau en est le siége le plus ordinaire, et en a même été censée le siége unique; cependant on en voit assez fré-

quemment à l'intérieur du nez, des lèvres, des joues, au voile du palais, à la partie interne des parties génitales; il est même probable qu'outre les membranes muqueuses, il est encore des organes intérieurs où elles peuvent prendre domicile; on doit seulement admettre qu'alors la maladie revêt une autre forme.

Les affections siphilitiques ont également des siéges variés, des caractères bien tranchés, et qui leur sont propres; toutefois, lorsqu'elles sont dégénérées ou très-anciennes, elles perdent leur type primitif, et deviennent chez quelques individus tout-à-fait méconnaissables; elles peuvent alors donner lieu à une foule d'autres désordres et de névroses, au nombre desquels on doit ranger l'hypocondrie.

Bornons ici l'examen des causes physiques, et disons que, si, dans ce tableau, nous en avons omis quelques-unes, nous croyons du moins avoir énuméré toutes celles qui, à cet égard, jouent un rôle important.

DEUXIÈME SECTION.

Causes morales.

Abordons maintenant un autre ordre de causes; entrons dans le domaine des agens moraux. Les sens, qui font partie de ces derniers, sont sur les confins de la vie organique ou nutritive, et de la vie relative; ils sont les sentinelles avan-

cées de cette dernière. Nous commencerons l'examen des causes morales par celui des antipathies, considérées suivant nos différens sens.

L'antipathie est un sentiment intérieur, presque toujours indépendant de notre volonté, qui nous éloigne des objets animés ou privés de vie, que nous avons pris en une aversion portée quelquefois jusqu'à l'horreur. Les antipathies sont, en général, beaucoup plus fréquentes chez les personnes nerveuses que parmi les sujets doués d'un autre tempérament; et c'est pour cette raison que nous avons cru devoir les mentionner en examinant les sources d'où peut dériver l'hypocondrie.

La vue est peut-être de tous les sens le plus fécond en antipathies; citerons-nous Germanicus, qui ne pouvait souffrir ni la vue ni le chant d'un coq (*Montaigne*, livre I); et Jacques Ier, roi d'Angleterre, qui se trouvait mal à l'aspect d'une épée? Le même accident se manifestait chez une jeune personne lorsqu'elle voyait une tête de veau sur une table. On connaît l'aventure de ce lord qui avait en horreur les araignées, et qui, surpris par la vue d'un de ces insectes, mit la main sur la garde de son épée, comme pour se préparer au combat. Un fait plus authentique est celui transmis par *Jos. Lanzonius*, qui mentionne l'exemple d'une femme âgée de trente-trois ans, dont la gros-

sesse s'annonçait d'une manière infaillible par une antipathie violente contre les anguilles. Dès qu'on lui en servait, elle était prise de vomissemens. Cette antipathie se dissipait aussitôt après l'accouchement.

Examinons avec la même rapidité l'impression variée que produisent les odeurs, les parfums, chez plusieurs personnes très-nerveuses. Le même auteur (obs. VIII) parle d'un jeune militaire âgé de vingt-six ans, qui ne pouvait souffrir ni l'odeur ni la vue de la pivoine, *qui pæoniæ odorem aspectumque nullo pacto ferre potest*, et qui était pris de syncope et de sueurs froides, s'il ne s'éloignait. C'est ainsi qu'un homme fort nerveux, et disposé à l'asthme, éprouve une très-grande gêne dans la respiration aussitôt qu'il est près d'une certaine quantité de laine : la dyspnée est d'autant plus forte, que la laine est en plus grande abondance, et plus, dans le voisinage immédiat de cet individu; aussi a-t-il pris l'habitude de se coucher sur un matelas fait avec du crin.

Les antipathies du goût ne sont pas les moins nombreuses; et sont susceptibles de produire plus directement les névroses digestives. Ces aversions sont presque toujours relatives aux substances alimentaires. Rapportons-en quelques exemples.

Un jeune homme âgé de vingt-huit ans, doué d'une bonne constitution, est parvenu jusqu'à

cet âge sans avoir jamais mangé de *viande :* l'odeur de celles qu'on sert ordinairement sur nos tables ne lui est point désagréable ; il mange avec plaisir de la soupe faite avec leur jus ; mais il lui est impossible de faire pénétrer dans son estomac aucune substance animale solide. Lorsqu'il en a introduit dans sa bouche, de suite il a éprouvé un malaise général, un resserrement à la gorge très-intense, douloureux, et tel, que le passage est en quelque sorte obstrué : il se manifeste en même temps un trismus incomplet des mâchoires, et des bourdonnemens très-incommodes. Cet ensemble d'accidens l'a convaincu de l'inutilité et même du danger des tentatives qu'il avait faites, et de celles qu'il voudrait recommencer. Aussi se contente-t-il de son régime végétal, dont au reste il se trouve fort bien. Dans le cas suivant, nous verrons une idiosyncrasie opposée. Un particulier avait une antipathie très-prononcée pour le poisson : quelques personnes, voulant s'assurer si cette aversion n'était pas simulée, masquèrent cet aliment de plusieurs manières. Celui que l'on éprouvait ainsi ne s'en aperçut pas; mais il en fut très-incommodé. Il est également connu que l'on conserve ordinairement, et long-temps, une sorte d'antipathie pour tous les alimens qui ont occasionné un trouble sensible dans nos fonctions digestives.

Les antipathies du *toucher*, quoique moins fréquentes que celles des autres sens, n'en sont pas moins réelles. C'est ainsi qu'une dame éprouve une forte envie de vomir toutes les fois qu'elle touche une étoffe de soie; nous pourrions même citer l'exemple d'un homme pour qui le contact de l'argent est une cause d'irritation : il n'en porte jamais, et à ses repas il se sert constamment d'une cuillère et d'une fourchette de bois ou de fer.

Terminons cette revue par l'influence que peut exercer le sens de l'ouïe.

Le choc de plusieurs verres, ou le son qu'ils produisent, quand on les frappe en mesure, provoque parfois une sensation tellement insupportable, qu'il serait possible que son effet, long-temps continué, troublât l'exercice régulier des organes digestifs; il en exalterait pour le moins la sensibilité. On connaît également l'impression désagréable que font éprouver certains bruits, tels que ceux qui résultent du déchirement du papier, du froissement d'un corps métallique sur du marbre, de la fente des pierres au moyen de la scie, etc. Mais l'on ignore quel accident pourrait occasionner la continuité de cette irritation chez des personnes fort susceptibles. Sans doute toute impression antipathique ne dérange pas l'harmonie de notre organisation, ou de notre système digestif; mais nos ressorts,

nos organes sont doués d'une texture si délicate, que le désordre le plus faible, la cause, en apparence la moins active, suffit quelquefois pour intervertir l'ordre naturel de nos fonctions. De même une antipathie peut accidentellement, soit par son propre fait, soit par une disposition particulière de l'individu, devenir l'occasion d'un trouble dans le système nerveux de l'abdomen, et par suite d'une névrose bien prononcée. Avouons cependant que nous ne connaissons pas d'exemple d'hypocondrie déterminée par suite des antipathies ; ce qui tient sans doute à ce qu'on n'a pas soupçonné leur influence à cet égard, dont au reste la possibilité nous paraît démontrée.

L'empire de l'exemple a des résultats plus certains : on sait en effet que les névroses des organes digestifs peuvent se communiquer par suite du penchant qui nous porte à imiter ce que nous voyons ou entendons. Ainsi le spectacle de ces malades, et surtout leur conversation habituelle, est quelquefois pour les gens du monde une véritable source de contagion, pour peu que ces derniers soient disposés à cette maladie par une vive sensibilité nerveuse, une grande susceptibilité morale, ou par un caractère méticuleux, spécialement pour ce qui concerne leur santé. Souvent la seule fréquentation des hypocondriaques détermine cette affection chez des

individus qui, sans cette circonstance, y auraient peut-être échappé.

L'habitude d'entendre ces malades se plaindre de leur santé, ou décrire avec autant de détails que de persévérance les maux ou les tourmens qu'ils endurent, portent ceux qui vivent habituellement dans leur société, à faire de fréquens examens d'eux-mêmes, à interroger leurs organes, et à être dans une defiance presque continuelle de leur santé; celle-ci est-elle bonne, ils craignent qu'elle ne soit incessamment compromise; vient-elle à essuyer un léger dérangement, aussitôt la crainte les poursuit, et la crainte du mal amène bientôt un mal trop réel.

Les médecins eux-mêmes ne sont pas toujours à l'abri du danger de l'exemple; le grand nombre de maladies dont ils étudient la description, ou dont ils observent la marche dans la pratique, les expose à des craintes, à des retours sur eux-mêmes, qui coopèrent à troubler leurs fonctions digestives, et à en produire les névroses. Ainsi se trouve en partie exaucé le vœu de *Montaigne*, qui désirait que les médecins éprouvassent ou eussent éprouvé toutes les maladies. Il est cependant probable que la multiplicité des affections nerveuses que l'on observe chez eux ne dépend pas exclusivement de cette cause. Témoins du développement et des terminaisons variées des maladies, ils sont en outre plus dis-

posés que les autres hommes à porter de faux jugemens sur celles dont ils sont atteints. Entre mille exemples, je choisis le suivant. M. G**, médecin très-distingué à T**, perdit un de ses amis qui succomba à une lésion organique du cœur. Aussitôt il fait un retour sur lui-même, et se persuade bientôt qu'il est menacé du même danger; sa santé s'altère, l'hypocondrie se déclare. Il vient à Paris pour consulter, et réclame mes conseils. Je combats ses craintes, et à force de réflexions rassurantes, je parviens à calmer son esprit. Au bout de quelques jours, il retourne en province, non parfaitement guéri, mais en convalescence ou au moins en voie de guérison, et assez bien rassuré sur celle de ses craintes qui le tourmentait davantage. Non-seulement l'habitude journalière de voir un grand nombre de malades offre cet inconvénient, mais la lecture des livres de médecine, et l'étude clinique de cette science sont aussi, pour les jeunes gens qui se destinent à la carrière médicale, l'origine de beaucoup de névroses, d'hypocondries, et surtout de mélancolies.

L'avidité avec laquelle les gens du monde parcourent ces sortes d'ouvrages leur est bien autrement fatale; et ce n'est pas impunément qu'ils se familiarisent avec ces livres qu'ils croient comprendre, parce qu'ils les interprètent en aveugles, et toujours à leurs dépens. Ce penchant

irrésistible, qui séduit les personnes étrangères à l'art de guérir, passe toute croyance, et ne peut être comparé qu'aux mauvais résultats qu'il produit : en effet cette lecture, qui est presque toujours la preuve d'un esprit inquiet, ajoute aux craintes chimériques de ces personnes, qui ne tardent pas à se croire atteintes successivement de toutes ou presque toutes les maladies dont elles ont lu la description. Elles ne voient pas ce qui devrait les rassurer; elles sont beaucoup plus frappées des pronostics les plus fâcheux, et s'y attachent de préférence.

Quand ces individus parcourent l'histoire d'une maladie qui offre plusieurs degrés et des terminaisons variées, ils se persuadent que chez eux le mal ira en croissant, et qu'il parviendra toujours à la dernière période. Est-il annoncé dans cet ouvrage qu'une affection se termine le plus souvent par résolution, ce mot ne les rassurera pas; pour un grand nombre il serait inintelligible. Si l'on ajoute que rarement sa terminaison est mortelle, ils concluront, de la possibilité d'une terminaison funeste à la certitude de leur fin prochaine. Mais s'il est écrit que la mort est souvent le terme d'une maladie, alors leur effroi est au comble, leur imagination est bouleversée; ils se persuaderont que leur dernière heure est déjà sonnée. Cette frayeur panique n'est pas le seul mal; le chagrin qui résulte d'une crainte aussi

déplacée peut produire un trouble d'autant plus grave qu'il est chaque jour renouvelé. Après avoir ainsi entrevu la marche de la maladie et ses terminaisons, ils s'occupent du traitement, et ce nouveau travail leur offre de nouveaux inconvéniens, puisqu'il entraîne le plus souvent la fausse application des remèdes; car tantôt ils se méprennent sur la maladie, qui n'est point celle qu'ils pensent reconnaître; dans d'autres cas, ils se trompent sur les circonstances, les époques et les degrés de l'affection : comment d'ailleurs reconnaîtront-ils la nature de la cause, la valeur des différens symptômes? N'attacheront-ils pas toujours la plus grande importance au phénomène le plus apparent, et qui ne sera cependant, dans bien des cas, qu'un symptôme accessoire ou peu remarquable?

Par suite de ces lectures indiscrètes, de ces demi-connaissances, les gens du monde sont exposés à adopter des systèmes entièrement faux; ils se préviennent contre tel ou tel moyen curatif; et lorsque leur état exige un traitement, souvent ils ne l'emploient qu'avec une prévention qui peut en détruire l'effet salutaire. Que ces individus se persuadent surtout que des notions acquises sans les études préliminaires, seules bases de la science médicale, sont trop superficielles pour être véritablement utiles, et qu'elles conduisent le plus souvent à des juge-

mens faux et à des conséquences encore plus dangereuses.

Nous avons connu plusieurs malades qui convenaient des tourmens que ces lectures leur occasionnaient, et pour qui cette occupation pernicieuse était un besoin plus irrésistible que le soin même de leur santé ou de leur nourriture : tous leurs efforts pour éviter cet écueil étaient inutiles : *Trahunt fata nolentem.* Par suite de ces habitudes favorites, il suffit quelquefois à ces personnes d'apprendre qu'un de leurs amis est malade pour qu'elles se persuadent aussitôt être menacées ou atteintes de la même maladie. Cette erreur première prendra bientôt un nouvel accroissement, si cet individu vient à succomber. L'hypocondrie est alors imminente, et souvent ces personnes se laissent entraîner, par suite de cette coutume ou par leur disposition naturelle, vers une hypocondrie plus ou moins rebelle.

L'influence du caractère offre des résultats non moins intéressans à observer. Le caractère d'un individu est à son organisation morale ce que le tempérament est à sa constitution physique : ils sont l'un et l'autre presque toujours en rapport, et se modifient réciproquement. Le caractère ou tempérament moral varie suivant l'âge, le sexe, l'éducation, le climat, les professions, etc.; mais quelle que soit la modification, conséquence de ces diverses circonstances, le caractère influe

plus ou moins sur la production des maladies; il constitue en quelque sorte une disposition prochaine ou éloignée à recevoir leur impression.

On a remarqué qu'en général les personnes gaies, vives, actives, courageuses, étaient peu accessibles aux maladies contagieuses, épidémiques, endémiques, aux névroses, et surtout aux vésanies, etc.; tandis que les individus moroses, tristes, paresseux, indolens, craintifs, méticuleux, y étaient singulièrement disposés.

On sait également que les jeunes gens qui se livrent avec ardeur et sans crainte aux études anatomiques sont bien plus exempts des affections qui peuvent en dépendre que ceux qui s'y adonnent avec insouciance, dégoût et pressentiment. On peut croire en outre, avec *Baglivi*, que les individus pusillanimes sont plus exposés aux maladies résultant des peines de l'âme, et par conséquent à l'hypocondrie, que les hommes véritablement courageux : *Vir constans et immotus animo, quique mediis tranquillus in undis sublimè illuc et heroïcum..... Nec spe, nec metu perpetuò repetit, rarò incidit in morbis ex animi pathemate.*

De même qu'on reconnaît dans un individu une disposition morale que l'on nomme *caractère*, de même l'on retrouve dans les habitudes et les mœurs d'un peuple une disposition plus ou moins générale, que l'on désigne sous la dé-

nomination de *génie* ou *caractère national*, et qui résulte de l'influence de la civilisation, de la forme du gouvernement, et de l'impulsion communiquée aux habitans. Ce que nous venons de dire du caractère individuel est également applicable au caractère national.

Les peuples guerriers seront moins exposés, en général, à l'hypocondrie. Ceux dont le caractère est franc, vif, gai, en seront moins souvent atteints; l'Anglais, naturellement sombre, penseur; l'Espagnol et l'Italien, qui sont plus enclins à la jalousie, à la paresse, offriront la disposition à cette maladie, ou cette affection elle-même, plus fréquemment que les habitans de la Suisse, de la France, de l'Allemagne ou des Etats-Unis d'Amérique.

Mais si le caractère propre aux habitans d'un pays peut les disposer à cette névrose, d'autres circonstances, relatives à l'état social, peuvent revendiquer une participation encore plus directe. Un des avantages de la civilisation, c'est de donner aux facultés intellectuelles un plus grand développement et une plus grande vivacité aux affections de l'âme. Les peuples policés ne respirent que pour l'honneur et l'amour de la liberté; ils supportent avec une sorte d'impatience le joug politique et les contraintes sociales : leurs sensations sont plus vives, leurs passions plus mobiles et plus impérieuses, leurs besoins plus

multipliés. Cette activité morale les expose à des contrariétés sans nombre, à de violens chagrins, dont les résultats sont d'amener des digestions difficiles, des désordres, d'où peut provenir l'hypocondrie.

Si nous comparons les pays dont la civilisation est peu avancée, nous y verrons une apathie générale ; les passions s'y bornent presque exclusivement à veiller à la conservation, et à se procurer la nourriture. Telles sont les sources les plus ordinaires des animosités et des dissensions qu'on remarque chez leurs habitans. Les névroses doivent donc se rencontrer moins souvent parmi les peuples non civilisés. Chez les nations qui vivent sous le despotisme d'un chef, comme en Turquie, etc., l'homme, né dans la contrainte et l'ignorance, imbu des principes du fatalisme, contracte nécessairement l'habitude de réprimer ses désirs ; l'impossibilité de les satisfaire l'empêche de les concevoir : son indolence le met à l'abri des violentes secousses morales qui décident si souvent les névroses ; mais il n'en est pourtant pas entièrement exempt ; d'autres causes peuvent l'y exposer, comme nous l'avons indiqué plus haut. Tantôt c'est le régime, l'abus des alimens excitans, des substances opiacées ; d'autres fois c'est le genre de vie, des habitudes trop sédentaires, la nature des professions, des métiers, etc.

Nous avons examiné déjà par quel mécanisme, sur l'organisation physique, les professions diverses étaient susceptibles de donner naissance aux affections hypocondriaques; leur influence sur les facultés mentales peut amener les mêmes conséquences. D'après cette opinion, on pourrait considérer successivement l'action spéciale des différens états de la société, et l'impression reçue par le système nerveux des organes de la digestion; mais cette étude anticiperait sur le chapitre de ces facultés, considérées comme causes des maladies nerveuses.

Les hommes, qui par état mènent une vie sédentaire, et qui exercent leurs mains à des travaux mécaniques, acquièrent parfois une industrie étonnante; mais si ces occupations matérielles n'exigent aucun usage de leurs facultés morales, leurs idées restent toujours très-bornées et peu multipliées. Si celles-ci se concentrent sur un seul objet, et sur ce qui s'y rattache, elles peuvent conduire ces individus à la mélancolie. Dans d'autres cas, l'homme, privé en quelque sorte de rapports sociaux, s'occupe exclusivement de lui-même, et surtout de ce qui concerne sa santé. Il est par conséquent disposé à prendre pour des symptômes d'une maladie grave les accidens les plus légers: si son imagination est constamment inquiète, il reste ainsi dans une disposition prochaine à l'hypocondrie.

Aussi voyons-nous que les artisans qui travaillent dans l'isolement, et que rien ne distrait dans leur constante solitude, y sont très-exposés; mais les ouvriers entourés de leur famille, de parens ou d'amis, ceux qui sont réunis dans des ateliers avec de nombreux compagnons, dont ils partagent la conversation ou les chants pendant le travail, les récréations ou les jeux dans les momens de repos, auront peu à redouter de leur profession, et jouiront presque toujours d'un bon système digestif.

Les personnes qui, au contraire, exercent beaucoup et habituellement leur entendement, et surtout quand elles se livrent à leurs méditations, à l'issue des repas, ont ordinairement les organes abdominaux faibles et très-sensibles. Il semble que l'activité mentale ait lieu au préjudice des fonctions digestives. Un mauvais estomac, a dit *Amatus Lusitanus*, suit les gens de lettres comme l'ombre suit le corps; en effet, par cette application constante à l'étude, ils troublent leurs digestions, ils affaiblissent les viscères de l'abdomen, ou en exaltent la sensibilité. C'est sans doute cette singulière influence des contentions d'esprit habituelles sur les fonctions de l'estomac et des intestins qui a fait dire que l'homme qui pensait le plus était celui qui digérait le plus mal.

Mais outre l'habitude des contentions d'esprit,

il faut distinguer la nature des idées que chaque profession fait naître. Dans l'une, on trouve une application trop uniforme, monotone, qui a fait dire à Lamotte :

L'ennui naquit un jour de l'uniformité,

ou un cercle d'idées fastidieuses dont l'homme ne peut sortir, et qui quelquefois amène le dégoût de la vie, le *tædium vitæ*, tantôt cause, tantôt symptôme de l'hypocondrie.

Dans une autre, telle que l'exercice de la médecine, les idées sont graves, sévères, souvent tristes; toutefois le bonheur d'être utile, et la satisfaction des familles, tempèrent dans bien des cas ce qu'a d'austère et d'affligeant cet art, quand il ne peut guérir. La sensibilité des médecins est peu expansive, parce qu'elle est maîtrisée par la raison et le spectacle habituel de l'humanité aux prises avec la douleur; mais elle n'est pas moindre que dans les autres professions. N'est-ce pas une sensibilité réfléchie, plus encore qu'un sentiment d'honneur ou l'amour du devoir, qui précipitait les *Percy*, les *Larrey*, les *Galée* au milieu d'un champ de carnage, qu'il faut pourtant appeler un champ d'honneur, et les portait à braver la mort pour secourir de malheureux blessés gisans sur l'arène, exposés de nouveau au feu de l'ennemi, ou à être foulés sous une charge de cavalerie? Combien de fois

n'a-t-on pas vu, animés par les mêmes sentimens, les *Desgenette*, les *Gilbert*, les *Duméril*, les *Bally*, affronter des dangers non moins certains, pour arrêter les ravages d'une épidémie meurtrière? En citerai-je des victimes (1)? leurs noms seraient honorés de se trouver auprès de celui d'un *Desgenette*, qui dans cette Egypte, témoin de tant de valeur inutile, osa braver le plus terrible des fléaux. Ajoutons à ce lugubre tableau l'horreur qu'inspire alors la vue d'un hôpital, et l'on sentira combien les médecins sont encore, sous ce point de vue, exposés aux maladies nerveuses et à tous les effets de la douleur morale (2).

---

(1) Je n'en rapporterai que peu d'exemples. M. *Rochette*, médecin distingué, père de M. *Raoul-Rochette*, membre de l'Institut, était venu à Paris visiter ses amis. Il y apprend que le typhus s'est déclaré dans son hôpital à Moulins; il voit le danger : l'amitié trop prévoyante veut en vain le retenir; il part, et trouve bientôt la mort dans les soins qu'il prodigue à ceux dont il s'efforce de conserver la vie. Les médecins de Paris ont aussi bravé ces périls. En 1814 la contagion fut terrible; on apporte un soir, à l'hôpital de la Pitié, neuf malades atteints du typhus : le lendemain aucun n'existait. Les docteurs *Defranne* et *Payen* y avaient déjà succombé, et MM. *Husson* et *Lerminier* n'en continuèrent pas moins leurs visites avec la même exactitude.

(2) Le médecin *Lanjuinais*, parent de M. *Lanjuinais*, membre de l'Institut et pair de France, commandait une compagnie de la garde nationale de Rennes. Étant à Fougères, lors de la guerre de la Vendée, il ne put, avec sa petite troupe, empêcher une de ces atrocités si fréquentes dans les guerres

Parmi les professions qui condamnent l'homme à l'habitude des méditations, on doit encore distinguer celle d'avocat : sans doute elle n'offre que trop souvent la discussion d'intérêts vulgaires ou de points de droit aussi peu importans ; mais combien elle s'élève et s'honore ! Combien elle agrandit l'âme, quand elle se propose de défendre un innocent contre d'injustes préventions ou de noires calomnies, de protéger le vainqueur de *Hohenlinden* contre les traits de l'envie ou du despotisme ; quand elle s'efforce d'arracher une auguste victime à la hache des bourreaux, ou des milliers de citoyens à la rage des partis, à la fureur des réactions ! Dans ce cas, la nature des idées n'est pas toujours la même ; elles sont ordinairement élevées, libérales ; quelquefois aussi elles participent de la joie, quand un heureux succès a couronné de nobles efforts ; dans d'autres cas, les idées sont tristes, soit par le dénoûment fatal d'une cause que l'avocat avait embrassée avec chaleur, soit par d'autres chagrins ou une application non interrompue qui favorisent le développement des vésanies.

La faculté de soutenir de longues méditations est le résultat de l'étude des sciences abstraites et de l'exercice habituel du jugement. Ces médi-

civiles. Des forcenés jetèrent, par les fenêtres d'un hôpital, les blessés vendéens qu'on y avait abandonnés : telle fut l'horreur qu'inspira ce meurtre à notre honorable confrère, que, peu de jours après, il en mourut de chagrin.

tations sont familières aux physiciens, aux mathématiciens, aux moralistes, aux philosophes, aux littérateurs, aux médecins. Si l'homme s'y livre avec trop d'ardeur ou d'une manière continue, aux dépens de tout mouvement nécessaire à son organisation physique, et s'il y joint une nourriture insuffisante ou le trouble des fonctions digestives par un travail trop rapproché des repas, il donne ainsi naissance aux névroses hypocondriaques; dans d'autres cas, il fatigue les ressorts de son entendement, il épuise en quelque sorte la somme de ses pensées; et son jugement peut, par diverses circonstances ou le fait seul de cette fatigue, s'altérer ou s'éteindre. Telle est l'origine de beaucoup de vésanies mentales, de la manie, de la démence ou de l'idiotisme, et quelquefois aussi des affections hypocondriaques.

Cependant l'étude des sciences exactes favorise bien moins l'invasion de ces névroses que la culture des beaux-arts et des travaux qui exigent une exaltation plus ou moins continue de l'imagination.

Dans d'autres professions, les idées sont moins variées, mais plus exaltées, l'esprit est dans un travail continuel, qui ne donne pas moins d'inquiétude. C'est ainsi que les professions qui exigent une activité permanente de l'imagination peuvent avoir et ont réellement une grande part au développement des affections hypocondria-

ques; ce sont surtout les artistes qui exercent spécialement cette faculté, et parfois aux dépens du jugement, qu'on voit fréquemment atteints des maladies nerveuses les plus compliquées et les plus graves. Leurs meilleures productions sont souvent le résultat d'une imagination exaltée, d'une véritable effervescence, d'un mouvement fébrile extraordinaire (1).

L'artiste, doué d'un véritable mérite, exempt de tout amour-propre ridicule, juge ses propres ouvrages avec une extrême sévérité, et craint toujours que les suffrages du public éclairé ne lui soient défavorables. Lorsqu'il ébauche un travail, la crainte de ne pas réussir le poursuit continuellement; quand l'œuvre est finie, sa frayeur ne fait que changer d'objet; c'est l'opinion publique dont il redoute les préventions, les caprices ou l'injustice. Une éclatante réussite le satisfait, un demi-succès le désole, un revers le décourage, l'anéantit. Souvent l'homme qui a le plus de génie, non-seulement compte très-peu de jours sereins, et en passe un bien plus grand nombre dans des perplexités sans cesse

(1) Il connaissait bien la puissance de cette fièvre mentale, l'auteur qui disait à une actrice célèbre que, pour bien jouer un rôle qu'il lui donnait, il fallait avoir le diable au corps. C'est ainsi que *Colin d'Harleville* nous apprend qu'il composa son meilleur ouvrage dans l'agitation d'un mouvement de fièvre, dans une sorte de transport.

renaissantes ; mais lors même que son étoile est la plus heureuse, de combien de peines sont environnées les palmes de la gloire ! à combien de tourmens est exposé le véritable amant de cette déesse souvent inaccessible ! Les succès passés le rendent plus difficile et plus craintif sur ses productions récentes ; il se persuade à tout moment qu'une seule faute, que la moindre erreur peut compromettre une réputation acquise par vingt ans de travaux, de veilles ou de fatigues, et cimentée par des chefs-d'œuvre.

Ceux qui joignent à un talent ordinaire une susceptibilité aussi exquise sont encore plus à plaindre, quand surtout ils sont en proie à ces peines qui affligent les autres classes de la société, aux tourmens de l'envie, de l'ambition, aux revers de fortune, aux malheurs domestiques ou aux affections de l'âme les plus déchirantes, et qui ont en général, sur des êtres aussi sensibles, plus de prise que sur le commun des hommes.

On connaît la prédilection excessive des poètes, des peintres, etc., pour leurs ouvrages ; mais rarement les autres artistes portent-ils la bizarrerie, les prétentions et cet enthousiasme exclusif pour leur art, et surtout pour leurs productions, au même point que les musiciens ; ces derniers aussi occupent le premier rang pour le grand nombre d'hypocondriaques, de mélancoli-

ques et de maniaques qu'ils fournissent. Non-seulement la musique, comme tous les arts, concourt au développement des maladies nerveuses par l'exaltation de l'imagination, les contentions d'esprit et la vie sédentaire, qui en sont souvent les compagnes; mais elle a en outre une action particulière; c'est l'influence physique du son et de ses modifications les plus délicates et les plus recherchées sur notre organisation, et spécialement sur notre sensibilité et sur notre entendement. Le célèbre *Grétry* a également observé qu'il y avait plus de vaporeux parmi les musiciens que dans les autres classes d'artistes (1). Un amour-propre excessif, une susceptibilité très-vive qui semble justifier le mot *genus irritabile vatum*, se remarquent trop souvent chez les compositeurs et chez les musiciens, et constituent une source féconde de maladies nerveuses.

L'effet de la musique, devenue passion ou travail exclusif, sera d'autant plus préjudiciable que le sujet sera plus nerveux, qu'il s'y adonnera de bonne heure et au préjudice des exercices du corps. Si nous examinons la passion des peuples du midi, des peuples policés pour cet art, nous la verrons en proportion des mœurs et de l'influence des sociétés. On peut remarquer un effet contraire chez les peuples du nord, où la

(1) Essais sur la Musique, t. I, p. 208.

civilisation est peu avancée. Les Allemands la cultivent cependant avec distinction, mais depuis peu de temps. Sévérité, science, harmonie, sont les caractères de la musique allemande, bien moins énervante que la mélodie, le raffinement, l'art et le goût délicat de la musique italienne. *J. J. Rousseau* énonce la même opinion : « La » musique naturelle ou harmonique n'agit que » sur les sens, et non sur l'âme; c'est la plus agréa- » ble; c'est celle de tous les chants qui ne sont » que des combinaisons de sons mélodieux; la » musique imitative, par des inflexions vives, » accentuées, et pour ainsi dire parlantes, ex- » prime toutes les passions, peint tous les ta- » bleaux, rend tous les objets, soumet la nature » entière à ses savantes imitations, et porte ainsi » jusqu'au cœur de l'homme des sentimens pro- » pres à l'émouvoir ». C'est dans celle-ci que l'on doit chercher la raison des effets prodigieux qu'elle a excités autrefois; c'est à cette musique que la France dut en partie les nombreuses victoires de ses armées. Nous avons tous été témoins des effets étonnans qu'ont produits pendant long-temps sur nos soldats des airs pleins de force et d'expression.

L'harmonica provoque par un mode analogue, chez quelques individus, des convulsions, des syncopes, et divers symptômes nerveux; le son de cet instrument a donné lieu à la mélancolie;

il me paraît également susceptible d'amener l'hypocondrie.

On se rappelle l'impulsion que communiquait aux soldats suisses *le ranz des vaches*. Cet air chéri inspirait le désir le plus vif de revoir la patrie, déterminait souvent la nostalgie ou l'hypocondrie, et leur faisait abandonner leurs drapeaux. « Ces effets ne dépendaient que de l'ha-
» bitude, des souvenirs, de mille circonstances
» qui, tracées par cet air à ceux qui l'entendaient,
» et leur rappelant leur pays, leur jeunesse, et
» toutes leurs façons de vivre, excitaient en eux
» une douleur vive et des regrets amers. Cet air,
» toujours le même, ne produit plus sur les
» Suisses les mêmes effets, parce qu'ils ont perdu
» le goût de leur première simplicité : tant il est
» vrai que ce n'est pas dans leur action physique
» qu'il faut chercher les plus grands effets des
» sons sur le cœur humain ». (Rousseau, *Dict. de Musique.*)

On remarque également les affections nerveuses chez les femmes, l'hystérie plus souvent que l'hypocondrie, quand elles sont grandes musiciennes, avant d'avoir atteint la perfection et la consistance de l'âge.

Une application trop constante, trop suivie à l'étude de la musique, est donc une circonstance favorable au développement de l'hypocondrie. L'antiquité nous offre plusieurs exemples d'af-

fection hypocondriaque ou mélancolique chez les plus célèbres musiciens de la Grèce. (Voyez l'*Odyssée d'Homère*, *Festins des Prétendans.*) Le caractère du fameux *Tigellinus*, décrit par *Horace*, (sat. 3, liv. 1er); et parmi les modernes, *Viotti* (*Décade philosoph.*, *fruct. an VI*); l'esquisse historique du célèbre *Mozart* (*Journal du Publiciste*, *brum. an X*); *Sacchini*, *Grétry* (*Essais sur la Musique*). L'on peut également compter au nombre des individus d'une sensibilité excessive et voisine de l'hypocondrie plusieurs de nos plus savans compositeurs modernes.

Après l'examen du rôle que jouent à cet égard les facultés intellectuelles, voyons jusqu'à quel point y participent nos impressions morales.

Il est assez difficile de bien définir les passions : suivant les uns, tous les mouvemens de l'âme déréglés ou contraires à l'ordre, constituent les passions; suivant d'autres, les passions sont toutes les affections fortes pendant la durée desquelles l'âme éprouve une sorte de violence.

La plupart des philosophes et des moralistes ont attaché au mot *passion* un sens plus général; ils l'ont appliqué à tout sentiment de l'âme, soit naturel et modéré, soit surnaturel et immodéré. Pour ceux-ci l'amour, l'amitié, le plaisir, l'espérance, l'émulation, le chagrin, constituent des passions, comme la haine, la jalousie, la colère, la vanité, l'ambition, le désespoir, etc.

Sans nous établir juges dans une question aussi délicate, nous adopterons le sentiment de ceux qui distinguent les impressions, les émotions de l'âme en modérées ou naturelles, et en violentes ou déréglées.

Aux unes nous donnerons le nom d'affections de l'âme, aux autres celui de passions.

Dans la première série on comprendra le plaisir, la peine, et toutes leurs modifications modérées, comme la joie, la gaîté, l'espérance, le désir, le chagrin, la tristesse, la crainte, etc.; la deuxième sera destinée à l'histoire des impressions gaies ou tristes, mais excessives; l'amour, l'amitié, la noble émulation, lorsqu'elles sont portées à un très-haut degré; un goût prédominant pour une étude quelconque, soit celle de la musique, soit celle des sciences abstraites; la crainte ou la douleur morale produisant la terreur ou le désespoir, la jalousie, l'envie, la colère violente ou l'habitude des emportemens, l'avarice, l'ambition, l'amour démesuré de la gloire, de la célébrité, de la fortune ou des honneurs, l'aveugle préjugé nommé point d'honneur, la passion du jeu, etc.

D'après la distinction que nous avons adoptée, on ne doit donc appeler affections de l'âme que les impressions modérées ou naturelles, reçues par notre intelligence. Les affections de l'âme sont, jusqu'à un certain point, pour les organes abdo-

minaux ou le centre épigastrique, ce que sont les sensations pour les organes des sens. Il est avéré, en effet, que la sensation produite dans nos sens par les rayons lumineux et sonores, par les corps odorans et gustatifs, est transmise au cerveau, où elle produit le sentiment; de même l'émotion reçue se fait d'abord sentir à la région épigastrique, et est reportée consécutivement à l'organe cérébral : c'est cette impression transmise à l'encéphalon qui constitue l'affection de l'âme; et suivant la nature de cette impression, on divise les affections morales en gaies et agréables, et en tristes ou pénibles : les premières sont en général excitantes; les secondes au contraire sont débilitantes, et presque toujours nuisibles. A la première section se rattachent la joie modérée, le plaisir, l'espérance, le désir et la gaîté. Dans la seconde, nous placerons le chagrin et toutes ses nuances, la tristesse, la crainte, l'ennui, la honte, le dégoût, la satiété des jouissances physiques et morales.

De toutes les affections morales, celle qui semble la moins capable d'altérer notre santé, et qui tend au contraire à la rétablir dans bien des cas, c'est la joie. Cependant quand elle est inattendue, brusque, elle peut affecter à ce point nos organes, que la santé en soit dérangée; si surtout son action trouble une fonction ou une sécrétion importante, telle que la digestion, le flux

menstruel ou hémorrhoïdal, son effet consécutif peut amener différens désordres, et même l'hypocondrie.

Le plaisir est un sentiment salutaire dont la joie forme en quelque sorte le plus haut degré. L'espérance est une affection douce, modérée, dont le résultat est toujours favorable, quand elle est indépendante de la crainte ou d'une impression pénible. Toutes ces modifications d'un même sentiment ne peuvent, en général, porter qu'un préjudice peu notable à l'économie; mais au premier rang des causes de l'hypocondrie il faut placer les affections de l'âme tristes et pénibles, le chagrin, la peine, la crainte, la honte, l'ennui, le dégoût, la satiété des jouissances physiques et morales (1).

Le regret d'avoir quitté un pays où on a laissé l'objet de ses plus douces affections est quelquefois aussi vif que le sentiment qui nous attache au sol qui nous a vus naître : tant il est vrai que souvent *ubi benè, ibi patria.* Transportés dans un séjour peu agréable, l'ennui d'abord s'empare de nous, et bientôt le chagrin nous assiége; et comme, dans tous les cas de peines profondes, nos fonctions languissent, le système digestif souffre

(1) Nous ne faisons point mention de la compassion, ce sentiment n'a point d'effet nuisible tant qu'il est modéré : s'il est excessif, c'est alors la tristesse.

spécialement, et déjà les symptômes précurseurs de l'hypocondrie se manifestent : un voyage ou le déplacement pour un autre séjour suffit souvent pour prévenir ou dissiper cette névrose. Mais si le chagrin persiste, si c'est le retour vers le pays natal qui est exclusivement l'objet des vœux du malade, la passion dominante, ce n'est plus l'hypocondrie simple, c'est la *nostalgie*, *la mélancolie morale*, qui peut être compliquée avec une affection hypocondriaque.

L'impression exercée sur notre moral par une maladie chronique et douloureuse produit une tristesse réelle, dont le résultat peut être celui des affections morales les plus pénibles; mais cette disposition de notre âme, cet effet de la douleur physique, que des médecins peu méthodiques ont parfois confondus avec l'hypocondrie et la mélancolie, diffèrent essentiellement de ces deux névroses, bien qu'ils puissent les déterminer. Nous placerons donc au rang des affections les plus fâcheuses de l'âme le chagrin que fait toujours naître une maladie longue et douloureuse, qui non-seulement empoisonne l'existence, mais de plus tarit quelquefois les sources de la prospérité d'une famille, et qui est fréquemment l'origine de cette névrose (1); d'autres fois une

(1) Quoiqu'il soit rigoureusement possible que le chagrin occasionné par une affection aiguë amène le même résultat,

simple infirmité nous force à une sorte d'exil, à une retraite absolue du monde, et même de la société : combien cette situation est encore pénible! et combien elle favorise les vésanies hypocondriaques par le sentiment de la douleur, par le chagrin d'un mal dont on ne connaît pas le terme, par le détriment qu'en éprouvent nos intérêts; enfin par la privation des plaisirs les plus doux de la vie, tels que la société de nos amis, l'étude, le spectacle de la campagne. Ces raisons sont sans doute suffisantes pour faire apprécier la part que peuvent avoir, dans bien des cas, au développement de l'hypocondrie, la plupart des maladies chroniques, quand surtout elles se déclareront chez des individus plus ou moins disposés aux vésanies par leur constitution, leur caractère ou leurs professions, etc.

Hypocondrie, suite de chagrins occasionnés par une maladie.

Un professeur ès-lettres, âgé de cinquante-huit ans, et fort instruit, consacrait à l'étude une grande partie de son temps; des revers de fortune viennent alors le frapper; sa santé résiste d'abord, et ne s'altère aucunement; mais huit mois après il éprouve des envies fréquentes

---

cependant on ne le voit guère que dans les maladies chroniques.

d'uriner, et de la difficulté, ou même des douleurs quand il veut rendre son urine. Le rétrécissement fait des progrès, l'usage des bougies et des sondes devient nécessaire; on lui prescrit un régime sévère, enfin on le consigne dans sa chambre.

Bientôt il est en butte à tous les inconvéniens d'une maladie longue et pénible; l'ennui, le chagrin le gagnent; ses digestions deviennent difficiles, il est tourmenté par des vents, des borborysmes et une constipation des plus opiniâtres; il s'y joint des étourdissemens, des palpitations, etc. : il fait de ses maux un tableau désespérant et plein d'exagération; il se figure qu'il ne peut plus marcher, ni même rester assis; bientôt il s'établit dans son lit, et n'en veut plus sortir. Sur ces entrefaites on lui annonce un médecin qui a fait, dit-on, des cures *miraculeuses;* aussitôt l'espérance semble renaître chez le malade dont le courage est ranimé par les belles promesses du docteur, qui exige qu'on seconde par l'exercice les moyens qu'il va prescrire; il ordonne en même temps quelques médicamens toniques, et un régime plus convenable; mais il veut, en outre, que M. le professeur donne à son tour l'exemple de la docilité, et qu'il profite du beau temps pour faire chaque jour une promenade un peu plus longue. Bientôt la santé s'améliore, l'imagination se

calme, les forces se relèvent, le trajet des urines est même un peu moins difficile, et tout porte à croire que sous peu M. D** sera un nouveau témoin des miracles bien innocens opérés par ce médecin, qui a su parler à l'imagination.

Non-seulement le chagrin, mais la crainte seule d'une maladie, et surtout de l'affection vénérienne, l'appréhension d'un événement fâcheux, d'une fin prochaine, peuvent concourir au développement de l'hypocondrie; de même qu'ils en sont souvent aussi un des symptômes concomitans. Ces terreurs paniques sont presque toujours suscitées par la vue, le souvenir ou le récit d'événemens analogues arrivés à d'autres personnes, ou, comme nous l'avons vu, par la lecture imprudente des livres de médecine. Un esprit inquiet tient toujours l'homme éveillé sur son état, sur ce qui le concerne et le prépare à ces maladies; de là vient sans doute la propension qu'éprouvent plusieurs personnes à se croire toujours affectées de maladies vénériennes, surtout quand elles en ont été atteintes à une époque quelconque de leur vie, et rien ne renforcera cette disposition morale comme de fréquentes conversations avec des personnes sujettes à l'hypocondrie. On s'associe d'abord à leurs inquiétudes particulières, on éprouve ensuite des craintes personnelles, et bientôt l'on ressent divers accidens nerveux qui sont le résultat de

cette espèce de contagion morale que nous avons déjà signalée.

La crainte qui naît de l'idée d'un péril ou d'un malheur plus ou moins prochain, sera d'autant plus susceptible des mêmes effets, que son action sera plus brusque, plus intense et plus prolongée : c'est surtout en suspendant, en ralentissant l'action vitale, que cette passion devient quelquefois si préjudiciable. Nous avons noté déjà la crainte particulière relative à certaines maladies, et spécialement aux affections les plus fréquentes, qui est tantôt cause, tantôt symptôme de l'hypocondrie. Aussi combien voit-on de personnes qui ont dû leur affection hypocondriaque à la peur seule d'une maladie dont elles avaient entendu faire des récits alarmans ; combien de femmes surtout, vivement effrayées du tableau habituel d'une phthisie ou d'un squirrhe de l'utérus, ont trouvé dans ce triste spectacle l'origine de leur névrose.

Examinons maintenant l'influence des passions, que nous distinguerons en naturelles et en factices ; les premières sont celles qui résultent des besoins relatifs à notre organisation, et se rattachent à la conservation et à la reproduction de notre individu, comme l'amour, la haine, la jalousie, l'avarice, la frayeur, etc. ; les passions factices sont la conséquence de nos rapports sociaux, et dépendent des besoins que nous nous sommes

créés; telles sont : l'ambition, l'amour de la gloire, le point d'honneur, etc. Cette division est cependant inexacte, car la disposition première, l'origine de nos idées, existe en nous, et ne provient pas de nos sensations ; à la rigueur, nous n'imaginons rien, nous ne créons rien. D'ailleurs l'avarice est le plus souvent une passion factice, puisque toutes les relations ont appris que les sauvages ne connaissaient pas l'idée du lendemain, ni par conséquent l'avarice naturelle ; mais l'instinct de la fourmi semblerait infirmer cette assertion, et porterait à considérer l'avarice comme une passion naturelle. Une division, plus exacte peut-être, distinguerait les passions en mouvemens de l'âme, dont l'invasion est brusque et l'impression subite, et en affections lentes dans leur développement et dans leur action. Quoi qu'il en soit, si nous considérons l'effet des passions d'une manière générale, nous verrons que l'affaiblissement des forces vitales résulte ordinairement de la crainte, de la douleur profonde, de la jalousie, des tourmens de l'envie ou d'une ambition inquiète ; tandis que très-souvent l'amour, l'émulation, la joie, le désir de la célébrité, le point d'honneur, la colère même, exal tent nos facultés physiques et morales.

Quelle que soit la passion qui agisse sur notre économie, qu'elle augmente ou diminue nos forces vitales, elle exerce toujours sur nos or-

ganes abdominaux une influence irrécusable : on doit pressentir dès-lors quel rôle les passions ouent sur le développement des affections hypocondriaques, puisque celles-ci résident dans la sensibilité exaltée des viscères que contient la cavité épigastrique. Nous allons examiner plus en particulier leur action spéciale sur les phénomènes de notre organisation.

L'amour violent est une passion qui diffère d'elle-même, suivant que l'objet qui l'inspire répond ou se refuse à nos désirs. Quand nos vœux sont satisfaits, ou lorsque nous conservons l'espoir du succès, ce sentiment décide une excitation favorable à notre organisation ; dans le cas contraire, si des obstacles s'opposent à notre bonheur, l'économie en est troublée, et cette affection rentre dans la classe des passions tristes et pénibles. Ainsi donc un attachement démesuré, heureux ou malheureux, peut devenir une passion dominante, une véritable mélancolie : dans le premier cas, il conduit au délire de l'imagination ; il produit, dans l'autre circonstance, la douleur la plus vive, et conduit parfois au suicide ; mais ne devant considérer ici cette passion que dans ses rapports avec l'hypocondrie, nous reconnaîtrons que, comme toutes les modifications de la douleur morale, le chagrin que nous fait éprouver un amour contrarié, en exposant au trouble des organes digestifs, occasionne par-

fois aussi cette névrose. C'est par un procédé différent, mais analogue, que le sentiment d'une joie très-grande, quand surtout elle est brusque et inattendue, opère sur notre organisation physique et morale des effets rapides; il peut troubler ou arrêter une hémorrhagie salutaire, l'écoulement des règles, un flux hémorrhoïdal, ou déranger une sécrétion importante, la transpiration, l'écoulement des lochies, et de ces différens désordres arrivera peut-être le trouble nerveux de l'appareil digestif. Ne sait-on pas qu'une joie extrême a produit des résultats encore plus fâcheux; l'histoire en offre beaucoup d'exemples, parmi lesquels nous ne citerons que la mort de Sophocle et celle de Diagore. Un événement heureux peut donc, quand surtout il est annoncé brusquement, devenir cause directe ou indirecte d'hypocondrie.

Tels, et plus pernicieux encore, sont les effets d'un violent chagrin sur nos divers organes; le plus souvent la respiration devient difficile, des palpitations se manifestent, la digestion languit, l'estomac se gonfle, et des tensions spasmodiques se font sentir vers les différens points de l'abdomen, et surtout aux hypocondres. Le système nerveux est-il seul affecté, l'hypocondrie en émane le plus souvent; mais quand son action se porte spécialement sur le tissu même des organes abdominaux, elle en favorise fréquemment

la désorganisation; si elle affecte les organes de la poitrine, ce qui arrive plus rarement, elle entraîne les catarrhes chroniques, les phlegmasies lentes, enfin la phthisie pulmonaire. Si l'on réfléchit au grand nombre de circonstances qui peuvent porter la désolation dans une âme sensible, on concevra aisément avec quelle fréquence et quelle intensité cette cause doit agir; cette influence de la douleur morale sur les organes abdominaux doit donc être regardée comme une des circonstances les plus favorables au développement des maladies nerveuses. *Cura,* dit Hippocrate, *in visceribus veluti spina est et illa pungit.* Plaçons en première ligne la douleur qui résulte de la perte de nos parens, d'un enfant chéri, d'un ami, d'un bienfaiteur, les revers de fortune, des dénonciations odieuses, une injuste destitution, un amour-propre humilié, blessé, offensé, etc.

Les peines de l'âme, qui sont la conséquence des bouleversemens politiques, des dissentions intestines ou des guerres étrangères, jouent un rôle bien important dans le développement des affections hypocondriaques, comme nous l'avons fait entrevoir dès les premières pages où nous avons exposé l'histoire de ces maladies. Leur fréquence était remarquable à la fin du dix-septième siècle, à l'époque où écrivait *Zacchias;* alors aussi la France était occupée par une guerre dont les

brillans résultats excitèrent contre elle une coalition qui lui devint fatale. A l'intérieur elle présentait en outre une assez grande agitation ; mais les événemens dont nous avons été témoins ont eu une influence bien plus prononcée, les années épouvantables de la terreur, les conscriptions sans fin, les malheurs de la guerre, la désolation des familles, la division des esprits, l'acharnement des partis, ont bien autrement multiplié les névroses.

C'est ainsi que nos différentes invasions en Hollande, en Italie, en Allemagne, en Espagne, y ont porté le germe d'un grand nombre de maladies mentales et d'hypocondries. Le docteur *Nacquart*, qui se recommande autant par l'élévation de ses pensées que par son talent comme praticien, a observé plusieurs fois, pendant son séjour en Allemagne, des vésanies qui provenaient du chagrin que causait aux habitans la présence des armées françaises sur le sol de leur patrie; et je tiens également du docteur *Piron*, qui a visité l'Espagne en observateur éclairé, que les désastres dont ce malheureux pays fut le théâtre, à partir de 1808, y avaient singulièrement multiplié les affections nerveuses.

Quel contraste nous offrent, suivant les circonstances, les effets du chagrin, ou plutôt quelle situation pénible, quelle désolante perspective présentent ces individus qui, par des jouissances

immodérées ou trop précoces, sont las et ennuyés de tout : ils ressemblent à ces fruits élevés à grands frais dans une saison impropre, ou recueillis avant leur maturité, et qui sont toujours flétris. Les uns se plaignent de leur célibat; s'ils l'échangent contre une union mal assortie, leur sort devient encore plus affreux; ont-ils, au contraire, rencontré une femme aimable qui s'empresse de les entourer des soins les plus affectueux, ils n'oseront peut-être s'en plaindre, mais ils n'en sentiront certainement pas le prix. Les autres ont un talent particulier pour se créer des chagrins, des tourmens au milieu d'un intérieur paisible, où ils pourraient trouver une source de plaisirs doux ou de distractions agréables; souvent même les meilleurs procédés, les prévenances les plus délicates, ne servent qu'à les aigrir. Cette fâcheuse disposition, quoique plus ordinaire aux personnes élevées ou riches, se voit cependant encore dans des rangs inférieurs; mais elle est fort rare dans les classes les moins aisées de la société. Sans doute cette propension singulière à s'ennuyer, cet ennui universel, suite assez ordinaire de la satiété, conduit plus souvent à la mélancolie; mais elle n'est point non plus étrangère au développement des affections hypocondriaques.

Il en est ainsi du point d'honneur, sorte de convention tacitement tolérée par les lois, mais

contre laquelle s'élèvent également la raison et l'humanité. S'il offre dans les états policés quelques avantages, s'il excite le courage et familiarise avec l'habitude du péril, il présente aussi des inconvéniens majeurs, des excès bien condamnables; en effet, quel mépris ne doivent pas inspirer ces hommes qui se font un jeu, une gloire de leur adresse à tuer leur semblable, ou plutôt de leur infamie, et souvent de leur lâcheté; mais bornant notre examen aux rapports que cette passion factice peut avoir avec notre sujet, nous dirons qu'en exaltant l'imagination, en provoquant des emportemens et des scènes orageuses, elle favorise les vices, elle prépare des regrets, des humiliations, des peines, d'où peut dériver le dérangement des viscères de la digestion, et parfois leurs névroses.

Une des passions qui pervertit encore profondément le jeu de nos fonctions organiques, c'est la jalousie; cette passion terrible fait le tourment de notre vie : dès l'enfance elle trouble les fonctions digestives, amène l'atonie du système intestinal, la diarrhée, le carreau, le marasme et la fièvre lente; dans un âge plus avancé, quelle que soit la cause de la jalousie, amour aveugle, vanité, ambition, elle porte spécialement son impression sur les organes abdominaux, dont elle affecte souvent le système nerveux, et dont elle altère fréquemment aussi l'organisation.

L'envie dérive, en quelque sorte, des mêmes mobiles que la jalousie ; aussi les phénomènes en sont-ils peu différens.

Qui ne connaît les fâcheux résultats d'un violent accès de colère, ou plutôt de l'habitude des emportemens qui exposent au désordre des sécrétions, au dérangement des évacuations, à la disparition des maladies cutanées : de ce trouble dans l'organisation il peut encore résulter des névroses plus ou moins graves.

La frayeur et la terreur sont deux degrés de la même passion ; mais la terreur est en général plus intense et plus continue. Nous confondrons néanmoins ici leurs effets : elles occasionnent ordinairement un spasme général, souvent le frissonnement de tout le corps, le reflux du sang de la circonférence au centre, le resserrement de l'épigastre, l'atonie de tous les muscles, et le relâchement des sphincters. Si le désordre est violent, continu ou réitéré, l'économie peut en recevoir un ébranlement sensible, et dont la génération des névroses digestives sera la conséquence ; mais le plus souvent l'effet de la frayeur (1), quand elle est excessive, est le trou-

(1) La crainte agit toujours comme débilitant, mais la frayeur et la terreur ont quelquefois un mode d'action différent, et souvent elles exaltent les forces d'une manière très-prononcée. Deux personnes voient un enfant s'approcher

ble des fonctions de l'entendement, et surtout l'idiotisme.

De même l'ambition peut concourir à la production de l'hypocondrie, en exaltant outre mesure les facultés intellectuelles, et surtout l'imagination, en leur donnant une grande activité au préjudice des fonctions nutritives : aussi a-t-on observé beaucoup de vaporeux, d'hypocondriaques, et surtout de mélancoliques, parmi les hommes à grands projets, à grandes spéculations, parmi ceux qui se sont enthousiasmé aveuglément pour les découvertes ou les innovations les plus hasardées. Elle peut encore la déterminer par le chagrin, suite ordinaire des espérances déchues, des illusions trompeuses et de toutes les chimères que cette passion enfante trop souvent : c'est donc avec raison que l'on a parfois appelé ces maladies *une ambition rentrée*. Les cours cependant offrent un petit nombre d'hypocondriaques, parce qu'aussi long-temps qu'un courtisan est dominé par un mobile puissant, il est rare qu'il s'occupe de sa santé ; il songe à toute autre chose : son désir, son ambition l'absor-

---

d'un précipice ; l'une vole à son secours, l'autre est tellement effrayée qu'elle se sent comme anéantie, et ne peut faire un pas. Celle-ci, poursuivie un jour par des assassins, s'enfuit avec une rapidité étonnante, et franchit un fossé très-large, ce que de sang-froid elle n'eût jamais pu faire. La même cause peut donc avoir des résultats opposés.

bent ; mais ses vœux à peine exaucés, à l'exaltation succèdent le calme moral et l'affaissement physique. Cette première nuance d'une débilité générale établit une disposition à l'hypocondrie, que déterminent parfois les dégoûts, l'ennui, les regrets, les privations ou la satiété.

Il est encore plus rare de rencontrer des hypocondriaques parmi les hommes qui suivent la carrière des armes, tant qu'ils passent leurs jours dans une sorte d'activité mentale continuelle ; comment ces individus s'inquiéteraient-ils de leur santé, puisqu'ils songent à peine aux dangers bien plus imminens qui dépendent de leur profession : pendant la paix, et en temps de guerre spécialement, le service militaire, l'émulation, le désir ou l'espoir de l'avancement, l'amour de la gloire et la soif des honneurs suffisent pour les mettre à l'abri des affections nerveuses; mais quand ils rentrent dans la société, ils sont obligés de contracter de nouvelles habitudes. Souvent leur inaptitude aux travaux du cabinet les éloigne de toute occupation mentale ; alors ils s'abandonnent au désœuvrement, qui, de concert avec la vie sédentaire, entraîne si fréquemment l'hypocondrie.

De même encore le négociant, livré au tourbillon d'un commerce étendu, ou jeté dans un dédale de spéculations incertaines, nombreuses et compliquées, ne peut songer à lui, et conserve, grâce

à cette activité d'esprit, à ce conflit d'affaires, une bonne santé; mais vient-il à échanger une vie aussi occupée contre le repos moral auquel il aspirait depuis long-temps, bientôt l'orage le menace, et loin de toucher au port, ou de recevoir le prix des peines qu'il s'est données, des sacrifices qu'il s'est imposés, il court risque de se placer au milieu des tempêtes, et de voir les craintes et la souffrance remplacer des inquiétudes journalières, et qui cependant lui étaient plus nécessaires que la fortune qu'il a si péniblement acquise.

Ainsi donc l'ambition et ses diverses nuances ont une très-grande part au développement des affections hypocondriaques; mais d'autres passions peuvent encore y participer : telles sont la haine, l'avarice, qui cependant influent davantage sur l'invasion de la mélancolie. Joignons encore ici la passion du jeu, cette source de désordres, et souvent de l'immoralité la plus dégoûtante; elle offre au nombre de ses résultats les plus fâcheux une perplexité morale effrayante, un balottement continuel entre l'espoir et la crainte, entre le plaisir et la peine, et en dernier lieu la douleur et le trouble nerveux, ou cette maladie de l'homme moral qui le porte au suicide, et l'entraîne, mais plus rarement, vers les névroses des organes digestifs.

On a considéré l'amour de l'étude comme une

passion ; mais il faut distinguer le goût, l'ardeur pour le travail, et la contention d'esprit qui en résulte : en effet, un homme peut avoir une grande vocation pour l'étude, et être forcé par les circonstances à ne point travailler. Ainsi nous avons connu un médecin passionné pour la méditation, et qu'une santé débile éloignait forcément de son cabinet ; tel autre au contraire s'occupe nuit et jour, sans jamais avoir éprouvé aucune passion pour l'étude. Toutefois nous dirons que les travaux du cabinet, c'est-à-dire, une contention d'esprit soutenue et journalière forme à elle seule une des sources les plus fécondes de l'hypocondrie. Les considérations que nous avons présentées, en traitant de l'influence morale des professions, nous dispense d'entrer ici dans de nouveaux développemens.

Enfin doit-on admettre une disposition physique ou morale, transmise aux enfans par leurs parens, et propre à développer cette maladie vers une certaine période de l'existence? *Hoffmann* penche vers cette opinion, que beaucoup d'autres médecins, *Willis*, *Raulin*, *Laurent*, etc., ont partagée avant et depuis l'époque où vivait cet observateur. Si nous considérons que dans certaines contrées la presque universalité des habitans reçoit en partage une constitution analogue, et que les mêmes nuances physiques ou morales sont en quelques occasions

beaucoup plus prononcées dans une même famille, nous serons très-portés à reconnaître l'influence de cette cause. Dans la Suède et la Russie, nous trouvons pour apanage des habitans la force et la vigueur; en Italie, et surtout chez les Napolitains, le système musculaire est d'autant moins développé que la sensibilité nerveuse est plus exaltée. Dans plusieurs pays, bas, froids, humides, marécageux, le système sanguin est sans vigueur, les vaisseaux lymphatiques sont au contraire nombreux, ou plutôt prédominans : la France et l'Allemagne, et en général les peuples, qui habitent les régions moyennes, présentent des conformations moins prononcées, des types moins saillans, et par suite des tempéramens mixtes : chez eux, tous les tissus, tous les systèmes se balancent réciproquement; de telle sorte qu'il en résulte un équilibre plus parfait que partout ailleurs, mais peut-être moins favorable à la santé et à la longévité que la prédominance du tempérament musculaire. Chez les habitans de ces contrées la sensibilité physique et morale est plus développée, l'éducation plus étendue et plus soignée, les sens plus excités, les passions moins circonscrites et moins modérées, l'imagination est plus active et plus ardente, les facultés intellectuelles, en outre, reçoivent en général un plus grand développement. Toutes ces considérations nous font pen-

ser que l'homme peut apporter une propension morale et *innée* vers les affections nerveuses : elle sera surtout remarquable dans les pays civilisés, chez les peuples dont la sensibilité est prédominante, ou parmi les classes les plus élevées ou les plus riches de la société. De plus, cette disposition peut être singulièrement favorisée par les circonstances locales, par les habitudes de la vie, non moins par les causes les plus puissantes, et spécialement par les affections de l'âme les plus pénibles. Mais si cette propension physique et morale s'observe chez un peuple entier, combien n'est-elle pas plus prononcée dans une même famille ! Quel observateur n'a pas été frappé de cette conformité d'idées, de cette habitude des mêmes sentimens dans quelques branches, et pendant des générations entières. Quel médecin surtout n'a pas vu des affections hypocondriaques être en quelque sorte le partage de certaines familles ? Je pourrais, pour ce qui m'est personnel, en citer plusieurs exemples; mais l'hérédité des maladies nerveuses est si généralement reconnue aujourd'hui, que l'opinion contraire ne compte plus pour partisans que *Brown* et le nombre très-petit et toujours décroissant de ses sectateurs.

Variétés des causes.

Les causes varient suivant l'âge, le sexe, la

profession, et suivant les circonstances physiques ou morales dans lesquelles sont placés les individus, etc. Dans la jeunesse, les causes de l'hypocondrie sont le plus souvent relatives aux affections du cœur, aux tourmens d'un amour contrarié, à la lecture des livres de médecine, à l'étude de cette science, à l'onanisme, et à l'abus des plaisirs vénériens. Chez l'homme adulte, cette maladie provient fréquemment de la vie sédentaire, des chagrins qu'entraînent les revers de fortune, d'une ambition trompée dans ses calculs, des peines domestiques et des contentions d'esprit trop prolongées, de la trop grande quantité ou variété d'alimens, et surtout de mets excitans. Chez les femmes, les causes de l'hypocondrie les plus ordinaires, outre celles qui leur sont communes avec l'homme, sont, au physique, les dérangemens de la menstruation et des écoulemens, ou fonctions propres au sexe pendant lesquelles leur susceptibilité est si prononcée; au moral, tout ce qui contrarie leurs penchans, tout ce qui excite leur jalousie, les atteintes qui blessent leur pudeur, leur timidité, leur honnêteté, etc. Dans les villes, et surtout parmi les individus qui composent la classe aisée, les circonstances qui concourent le plus puissamment à l'invasion des affections hypocondriaques, sont le défaut d'exercice, de mouvement, l'excès d'étude, les contentions d'esprit trop pro-

longées; les espérances, les ambitions déçues, les renversemens de fortune, et autres affections pénibles de l'âme, l'abus de la bonne chère, des liqueurs alcooliques, et des plaisirs de l'amour : l'air peu salubre des villes n'y contribue-t-il pas aussi pour quelque chose? Opposons maintenant aux causes énervantes auxquelles le citadin est en proie, les causes non moins débilitantes qui, dans les classes peu aisées de la société et dans les campagnes, provoquent le développement de l'hypocondrie; ici c'est l'excès de fatigue, l'intempérie de l'air, les dérangemens de la transpiration, une chaleur excessive ou un froid violent contre lequel on ne se garantit pas assez; là, une nourriture grossière, insuffisante, le défaut d'alimens excitans et de boissons toniques, telles que le vin, etc.; si l'artisan et l'habitant des campagnes en usent quelquefois, c'est alors avec profusion, et l'abus est souvent relatif à la mauvaise qualité de cette liqueur, ou à la longue privation qu'ils en ont éprouvée; circonstance qui en accroît le danger : l'excitation trop vive ou trop prolongée devient également une irritation, et par suite une atonie. Enfin l'abus des purgatifs et des sudorifiques est encore une source de ces névroses, bien plus fréquentes dans les campagnes que dans les villes.

D'après cet exposé, il est évident que toutes les causes ou circonstances, soit physiques, soit

morales, qui affaiblissent les organes de la digestion et qui exaltent leur sensibilité, sont propres à favoriser ou à déterminer tôt ou tard l'hypocondrie. Tantôt une cause est isolée, tantôt plusieurs sont réunies; celles-ci jouissent seulement d'un certain degré d'énergie ou agissent avec une très-grande intensité; leur action est instantanée, réitérée; d'autres fois elle est continue, ou persévère plus ou moins long-temps. Mais parmi les circonstances qui provoquent le plus constamment l'invasion de cette névrose, nous remarquerons les suivantes : 1°. *Causes physiques;* vie sédentaire; dérangement des hémorrhagies, soit menstrues, soit hémorrhoïdes, abus de soi-même. 2°. *Causes morales;* affections de l'âme tristes et pénibles, craintes relatives à la santé, lecture des ouvrages de médecine, travaux du cabinet, études des sciences abstraites, méditations profondes, longues et continues.

Si chacune de ces circonstances peut amener une vésanie très-prononcée, leur réunion plus ou moins considérable produira presque toujours un désordre encore plus intense, surtout quand leur influence sera très-prolongée. Dans un petit nombre de cas, la cause ne paraît exercer, sur les organes de la digestion, aucune action; celle-ci semble concentrée toute entière en une exaltation de tout le système nerveux, à laquelle, en apparence, les organes digestifs sont

étrangers, parce que les signes qui dépendent de leur affection, affaiblis ou étouffés par d'autres phénomènes, ne sont pas les plus saillans : *Duobus doloribus simul obortis, vehementior obscurat alterum.* Hipp. *Aphor.* Mais il n'en est pas moins probable que la cause interne ou immédiate de cette vésanie réside dans l'affection du système nerveux, qui vivifie les différens viscères de la digestion : c'est à éclaircir ce point important de controverse que nous tendrons dans les considérations suivantes.

CHAPITRE III.

Siége et principe de l'Hypocondrie.

Rien de plus problématique que la nature intime, que l'essence ou la cause immédiate de cette maladie, qui de tout temps a occupé les praticiens. *Hippocrate*, *Galien*, *Arétée*, l'attribuaient à l'atrabile ou à la mélancolie. *Dioclès*, qui vivait avant *Galien*, en accusait l'estomac; d'autres, l'intempérie sèche et chaude des vaisseaux du mésentère, du foie, et surtout de la rate. Suivant *Hygmore*, cette cause réside dans la faiblesse de l'estomac; *Willis* la place dans l'affection du cerveau ou du système nerveux, et *Sydenham* dans l'ataxie, l'irrégularité des esprits animaux. Si *Zacutus Lusitanus* regarde la froideur de l'estomac et la chaleur du foie comme la source de cette affection, *Boërhaave* admet

une matière tenace engorgée dans les vaisseaux des hypocondres (1). *Lienem, ventriculum, pancreas, omentum, mesenterium obsidens.* Tandis que la nature apparaît partout à *Stahl* et à ses disciples, faisant effort afin d'établir une hémorrhagie critique, *Lower* reconnaît pour principe la mauvaise disposition de la masse du sang, et *Hoffmann*, la trop grande tension du système nerveux, et quelquefois l'inflammation de la membrane muqueuse intestinale. Citerai-je comme autorité le docteur *Pomme*, qui voyait toujours le spasme, l'éréthisme et le raccornissement des nerfs, ou *Réveillon*, pour qui les variations du fluide électrique de l'atmosphère, et les anomalies de la transpiration, étaient le fil d'Ariane, qui avait échappé à tous les observateurs, et à l'aide duquel il pénétrait tout le labyrinthe de notre organisation, ou sondait l'abîme des maladies nerveuses? D'autres enfin ont accusé un état de phlogose chronique de la membrane muqueuse, gastrique ou intestinale; mais l'observation n'est point positive à cet égard; et quand l'anatomie pathologique nous offrirait cette lésion, qu'est-ce qui nous prouverait que, dans ce cas-ci, elle n'est pas consécutive?

(1) Cette opinion, qui portait à regarder l'état de ces malades comme tenant presque toujours à des obstructions, ajoutait souvent à leur découragement, et aggravait leur état physique et moral.

Malgré l'étonnante opposition de ces divers systèmes, il faut convenir que c'est moins l'observation que le raisonnement, qui, dans ce cas, est en défaut. Tous les auteurs ont argumenté d'après ce qu'ils observaient; mais plusieurs d'entre eux ont pris les effets pour la cause. De là les opinions erronées sur cette question; toutefois il est vrai de dire que leurs travaux nous ont été d'un grand secours, qu'ils ont, par leur controverse, éclairé notre jugement, et que *Dioclès*, *Hygmore* et *Willis*, etc., nous paraissent avoir entrevu le chemin de la vérité.

Ce n'est pas dans l'altération du tissu nerveux lui-même que réside la cause immédiate des névroses ou maladies nerveuses : il en est de la disposition des nerfs ganglionnaires, dans ce cas, comme de l'état que les nerfs présentent dans les membres paralysés; le tissu du nerf est intact, il n'est ni relâché, ni raccorni; ou s'il existe dans son organisation quelques changemens, ils sont inaccessibles à nos sens et consécutifs. C'est l'altération des propriétés vitales, des nerfs de la vie de nutrition, et surtout l'exaltation de la sensibilité organique, dont les nerfs sont les conducteurs spéciaux et les dépositaires, qui nous semblent constituer la maladie. Si on lie un nerf, toute la partie qu'il alimente devient paralysée, et cependant son tissu n'est point sensiblement altéré, il continue même à vivre organiquement;

mais il devient inhabile à remplir les fonctions qui lui étaient confiées. La ligature enlevée à temps, les propriétés vitales reparaissent, et avec elles les fonctions nerveuses. Il en est ainsi des nerfs qui se distribuent aux organes de la digestion; quand ils sont affectés, leur tissu n'éprouve aucune altération ; mais leur sensibilité exaltée provoque un désordre plus ou moins sensible, et entraîne, en raison de ses nombreuses sympathies, tous les organes voisins : de là cette multiplicité de symptômes que l'on observe dans les affections hypocondriaques.

Dans l'hystérie simple l'affection est locale, et ne devient presque jamais générale, ou ce n'est que momentanément, sans doute parce que les nerfs de l'utérus ont beaucoup moins de communications que ceux qui se distribuent aux organes de la digestion.

Disons donc, en nous résumant, avec les physiologistes modernes, que d'après l'observation journalière et l'examen attentif des phénomènes de la maladie, nous reconnaissons pour siége primitif de l'hypocondrie, les viscères abdominaux, et surtout l'estomac, affectés dans leur système nerveux ou leurs propriétés vitales, et surtout dans leur sensibilité organique. Telle est du moins dans le silence des preuves physiques la probabilité la mieux appuyée, celle qui résulte de l'observation des faits, de l'expérience

et du raisonnement physiologique : nous verrons en effet dans la série des symptômes qui seront énoncés, l'affection simultanée et primordiale des organes, tant essentiels qu'accessoires, qui composent l'appareil digestif; à ce trouble se joint par sympathie le désordre consécutif de presque tous les organes de notre économie, et par suite l'exaltation de la sensibilité générale; enfin l'affection sympathique de nos facultés morales et intellectuelles.

De la connaissance des causes, nous passerons à l'examen de leurs effets, à l'histoire des phénomènes de la maladie.

CHAPITRE IV.

Considérations préliminaires.

En proclamant ce que les auteurs, qui ont traité de l'hypocondrie avant nous, ont fait faire de pas à la science, en profitant surtout de leurs travaux, nous avons cru devoir, dans le tableau général que nous voulions tracer de cette affection, abandonner la route qu'ils ont suivie. Ce qui semble justifier la marche différente que nous avons adoptée, c'est cette uniformité, cet accord presque général, qui leur a fait souvent présenter dans un cadre unique et sans distinction précise, toutes les névroses et tous leurs différens phénomènes. Nous avons préféré rap-

procher, confronter les traits épars de l'hypocondrie, tels qu'ils nous étaient offerts par un grand nombre de malades, et les disposer ensuite en autant de groupes, suivant qu'ils paraissaient tenir essentiellement à l'affection primitive et locale, ou dépendre d'une irradiation sympathique, et suivant qu'ils se manifestaient dès le principe du trouble nerveux, ou que leur apparition n'avait lieu qu'après un certain laps de temps ; enfin nous les avons le plus souvent rangés suivant les organes auxquels ils appartiennent.

Quoiqu'il soit impossible d'observer d'une manière invariable ou constante les divers phénomènes de l'affection hypocondriaque, nous leur assignerons néanmoins un ordre fixe et fondé sur l'observation la plus générale. On ne retrouvera pas sans doute chez tous les malades, ni la totalité ou l'ensemble des faits, ou des accidens relatés dans la description générale, ni leur succession progressive ; mais les nombreuses observations qui nous ont servi de guide, et qui sont rapportées dans ce travail à l'appui d'un fait ou d'une opinion, justifieront la méthode que nous avons adoptée, en même temps qu'elles attesteront l'exactitude que nous avons mise dans l'exposé des phénomènes généraux de cette névrose. Nous diviserons tous les phénomènes de la maladie en trois époques. Dans la première,

le désordre est presque entièrement local, et se borne aux viscères abdominaux, qui ont des rapports très-intimes, soit par l'identité de leur organisation, comme les différens intestins, soit par leurs connexions nerveuses et vasculaires, comme le foie et la rate, soit enfin par l'analogie de leurs fonctions, comme l'estomac et le canal intestinal; la seconde époque nous offre les organes voisins participant sympathiquement à l'affection primitive; à la troisième série, nous rattacherons les nombreux résultats de la sympathie, qui unit l'appareil digestif aux organes qui nous mettent en relation avec les objets extérieurs. C'est en effet la succession progressive des symptômes, plutôt que l'intensité relative des accidens, qui, dans ce cas-ci, doit servir de base à la division des différentes périodes.

Premier degré.

L'invasion de la maladie ne s'opère, en général, que d'une manière fort lente. Toutefois, dans un très-petit nombre de cas, cette invasion est brusque, et dès le principe, l'affection nerveuse présente une grande intensité, ou parcourt rapidement ses différentes périodes. Le trouble des fonctions digestives, dont la lésion est d'abord lente, en général, et avec un sentiment de malaise, dessine la première nuance de l'hypocondrie; sur un nombre considérable de personnes

atteintes de cette névrose que nous avons observées depuis vingt ans, à peine avons-nous rencontré trois ou quatre individus qui n'aient offert ce désordre primitif de l'estomac et des intestins ou des autres organes, qui coopèrent à la digestion. Après le repas, les malades se plaignent d'un sentiment de gêne et de plénitude vers l'estomac; quelquefois même ils accusent une douleur gravative; leur digestion troublée se fait lentement; ils éprouvent des tensions plus ou moins incommodes aux hypocondres, et un gonflement considérable à l'épigastre et sur ses parties latérales; des borborygmes, des flatuosités se manifestent dans l'abdomen; des bâillemens ont lieu; des vents, des rapports acides se dégagent, quand la digestion est plus avancée; la langue est souvent villeuse, l'intervalle seul des papilles est couvert d'enduit muqueux; le matin à jeun les malades sont fatigués par l'état pâteux de la bouche, quelquefois par son amertume, par une sorte de salivation ou des mucosités variées plus ou moins tenaces, et d'une acidité parfois insupportable; enfin par des vomissemens muqueux, rarement alimentaires, et qui sont peu douloureux. Tantôt l'appétit est affaibli, nul ou très-irrégulier, et c'est ce qui arrive le plus ordinairement; tantôt il y a alternative de voracité et d'inappétence. Dans un certain nombre de cas, l'appétit est fort bon; mais ce que le ma-

lade a mangé avec plaisir, il ne le digère qu'avec peine. D'autres fois on observe le contraire, la digestion s'opère sans douleur, et même sans trouble apparent; mais le dégoût pour les alimens est extrême. On remarque chez certains malades une sorte de *pica* ou désir des substances non-alimentaires, tantôt une sorte de *malacia* ou d'appétence pour les alimens de mauvaise qualité; ce qui existe surtout chez les femmes hypocondriaques, pendant leur grossesse; d'autres fois c'est une véritable *boulimie*. Quelques-uns de ces malades ressentent une soif assez intense; mais le plus grand nombre n'offre pas ce phénomène; la soif même, en général, n'existe pas chez eux, sinon accidentellement.

Bientôt les vents, les borborygmes, les gargouillemens deviennent de plus en plus incommodes; ces derniers symptômes sont autant d'indices de la faiblesse intestinale. Ils fatiguent beaucoup ces malades, qui, non contens d'y attacher une trop grande importance, les accusent encore d'être la cause unique de leurs maux, quoiqu'ils ne soient qu'un résultat de la maladie. Lorsque le volume d'air contenu dans l'estomac et les intestins est trop considérable, il devient une cause de douleur; aussi son expulsion par la bouche, et surtout par la voie inférieure, est-elle ordinairement suivie d'un léger soulagement, que les malades exagèrent

souvent. Ce qui les confirme dans leur erreur, et les conduit à une seconde, puisqu'ils se persuadent que s'il n'existait pas de gaz ou d'air ainsi raréfié et altéré dans le canal intestinal, leur santé serait parfaite; ou qu'ils seraient bientôt guéris, s'ils pouvaient en expulser une grande quantité. Dans leur prévention, ils vont encore plus loin, et supposent des vents dans nos tissus solides, comme s'il pouvait en exister chez nous, sous cette forme, hors des voies aériennes et digestives.

L'haleine des malades est variable; chez les uns, elle est pure, non altérée, ou le matin seulement; chez d'autres, elle est aigre, et quand les alimens éprouvent dans l'estomac une sorte de putréfaction, il en résulte une fétidité insupportable; mais cette circonstance est rare.

Le plus souvent on remarque une constipation habituelle, et parfois très-opiniâtre, tantôt effet de la maladie, tantôt résultat de la vie sédentaire; chez quelques malades, elle alterne avec des coliques vagues et une diarrhée qui diminue l'intensité des accidens, quand elle est modérée; qui les augmente, lorsqu'elle se prolonge, et qui le plus souvent n'exerce aucune influence sur la marche de l'hypocondrie; mais l'état ordinaire est la constipation, parce que déjà l'altération qu'ont ressentie les organes digestifs est telle que la bile et les sucs gastriques ou intestinaux, sécrétés en

petite quantité, ne stimulent plus les intestins qui retiennent pendant très-long-temps le résidu des alimens. Quand le séjour des *fecès* est trop prolongé, et surtout si le foie est affecté sympathiquement, la bile coule moins abondamment; alors les matières sont grises ou comme de la boue; lorsque l'affection de ce viscère augmente, la bile est altérée, les excrémens sont noirâtres et très-fétides. Mais ces derniers phénomènes appartiennent rarement à l'hypocondrie simple; aussi ne les observe-t-on, dans ce cas, presque jamais. Parmi les exemples de constipation extraordinaire, nous citerons celui rapporté par *Forestus* d'un vieillard mélancolique (ou plutôt hypocondriaque), qui fut constipé pendant trois mois (lib. I, obs. 35). Je connais le fait d'un semblable accident qui s'est prolongé pendant soixante jours.

Le plus souvent l'urine est sécrétée comme à l'ordinaire; néanmoins elle offre chez quelques individus une abondance et une limpidité insolites. *Sydenham*, *Hoffmann* et *Cheyne* admettent au nombre des signes pathognomoniques de l'affection hypocondriaque, le flux subit et abondant d'une urine pâle et limpide. Nous pensons que ce symptôme appartient à beaucoup d'autres névroses, et qu'on l'observe surtout à la suite des accès hystériques. On voit encore, mais rarement, un diabétès qu'on peut regarder comme

une aberration de la sensibilité organique, et des suppressions d'urine, qui, ainsi que dans l'hystérie, sont plutôt des accidens que des symptômes de la maladie.

Ces malades sont en outre tourmentés par des tensions ou des contractions, et même par des douleurs obtuses ou lancinantes vers la région de l'estomac, du foie ou de la rate. Souvent l'épigastre et les hypocondres, le gauche principalement, sont le siége de gonflemens ou d'engorgemens, dont il est parfois assez difficile de préciser la nature. Tantôt ce sont les portions d'intestins correspondantes, qui, dilatées par l'air, présentent l'aspect d'une lésion de ces organes; tantôt le tissu cellulaire qui les environne est engorgé, et c'est probablement ce qu'on nomme un empâtement; d'autres fois ces viscères sont gonflés par le sang, etc., sans qu'il y ait encore altération de leur tissu.

Souvent des palpitations se font en même temps sentir à la région épigastrique, ou à l'hypocondre gauche, plus rarement au droit, et simulent les anévrismes du tronc cœliaque, etc. Mais comme ceux-ci sont extrêmement rares, les battemens artériels de l'abdomen ne doivent pas ordinairement inspirer autant de craintes que ceux qu'on observe du côté de la poitrine.

Relatons encore, pour terminer le tableau du premier degré, ces douleurs plus ou moins mo-

biles, nerveuses ou rhumatismales, et ces anomalies de la chaleur, qui se manifestent sur les divers points de la capacité abdominale.

Mais non-seulement les accidens de ce premier stade varient, quant à leur intensité, et suivant les individus; mais ils diffèrent en outre suivant l'époque de la maladie, celle de l'année, et même selon les diverses parties du jour.

En général, le matin est l'époque de la journée où le malaise est moindre; souvent le désordre ne s'annonce que vers le milieu du jour, et après les repas; d'autres fois il est continu, et ne présente que des diminutions peu sensibles ou très-variables, quant à leur durée et aux époques de leur retour. Certains malades sont assez calmes quelques heures après leur repas; d'autres au contraire sont plus affectés le soir, et principalement la nuit.

Deuxième degré.

A ces phénomènes, qui appartiennent exclusivement aux viscères de l'abdomen, et qui marquent les premiers pas de la maladie, on doit ajouter les symptômes non moins multipliés, qui surviennent lorsque l'affection s'est communiquée aux organes voisins. On observe des resserremens spasmodiques de la poitrine, plutôt que des contractions, plus rarement des quintes de toux. Suivant le médecin *Landré-Beau-*

vais (1), la toux, dans l'hypocondrie, est petite, sèche ou férine : caractères qui confirment la disposition nerveuse, si ordinaire à ces malades. Chez plusieurs il existe de l'oppression, ou plutôt un état de gêne dans la respiration (2), et des douleurs dans le dos ou sur les côtes du thorax. La matière de l'expectoration, sa couleur et sa consistance variables, n'offrent ordinairement aucun indice propre à éclairer le médecin. L'éternuement est quelquefois utile, surtout quand il coïncide avec le retour de la sécrétion nasale, dont la suppression est, suivant les circonstances, un effet ou un accident de la maladie.

Bientôt les organes de la circulation, et le cœur spécialement, ne sont plus étrangers au désordre. Les palpitations sont ordinairement très-fréquentes, et souvent fort étendues : non-seulement elles empêchent ces malades de se coucher librement du côté gauche; mais de plus elles gênent ou interrompent le sommeil. Tel était le malaise qu'en ressentait une personne qui rece-

---

(1) Traité de Séméïotique. *Paris*, 1810.

(2) Un de mes malades, même en marchant d'un pas ordinaire, était obligé de s'arrêter assez souvent, sans quoi il ne pouvait opérer d'inspirations complètes; et certes il n'y avait point chez lui d'affection de poitrine, car depuis quinze ans il se porte fort bien.

vait mes soins, qu'elle ne pouvait, dans les chaleurs de l'été, supporter pendant la nuit, sur sa poitrine, le poids de sa couverture, ni même celui de son drap. Ces palpitations, qui dépendent de l'exaltation de la sensibilité organique, sont souvent sujettes à des intermissions qui en déterminent la nature, et sont diminuées par un exercice journalier ou des mouvemens modérés; du moins, dans ce cas, ne sont-elles pas sensiblement augmentées; tandis que chez les individus atteints d'anévrisme au cœur, la locomotion ou les promenades redoublent les battemens de cet organe; ceux-ci alors sont presque toujours continus, accompagnés d'oppression, et occasionnent fréquemment des syncopes plus ou moins considérables.

Mais quoique ces palpitations tiennent à un simple désordre nerveux, on ne peut cependant se dissimuler que leur violence ou leur continuité n'offrent des dangers, parce que rien ne favorise les lésions organiques comme la persévérance, la fréquence ou la multiplicité des irritations, même légères (1).

D'autres fois on ne remarque aucune palpi-

---

(1) Les professeurs *Corvisart* et *Leroux* ont fixé l'attention des praticiens sur les maladies organiques du cœur, et ont appris à distinguer ces dernières des palpitations qui tiennent à l'exaltation seule des propriétés vitales.

tation très-sensible ou tumultueuse; ce sont plutôt des irrégularités ou des intermittences, qui amènent également des syncopes plus ou moins rapprochées et prolongées, suivant l'état de la sensibilité ou des forces vitales. Chez un petit nombre de malades, il existe des suspensions dans les battemens de l'artère radiale, tantôt d'un seul côté, tantôt des deux. J'ai vu, entre autres exemples, une dame hypocondriaque, dont l'artère radiale ne présentait quelquefois aucune pulsation pendant trois ou quatre heures; au bout de ce laps de temps le pouls redevenait sensible; mais il était habituellement très-faible.

Le pouls, qui constitue un des moyens explorateurs les plus utiles au médecin, ne lui est pas, dans ce cas, d'une grande utilité. Cependant nous noterons que le pouls des hypocondriaques est, suivant les individus, et chez la même personne, fort variable, qu'il diffère, selon les dispositions physiques ou morales, avant et après le repas; qu'en général il est plus anomal dans cette classe de malades que dans beaucoup d'autres, et qu'habituellement enfin il est plutôt irrégulier que fréquent.

On voit dans l'hypocondrie, mais très-rarement, un sentiment de constriction vers la gorge, de strangulation, qui est incommode, quoique beaucoup moins intense que l'étranglement dont

se plaignent les femmes hystériques. Au reste, ce symptôme, qui n'est point inquiétant, porte chez l'homme un caractère distinctif. Il est le plus souvent local, ou bien il se dirige de l'estomac au larynx; tandis que chez la femme, il semble presque toujours s'élever de l'hypogastre ou de la région de la matrice, et suivre une sorte de mouvement oscillatoire.

La figure de ces malades offre quelquefois un air inquiet; chez d'autres, et cette circonstance est assez ordinaire, le teint est jaune; état que l'observation apprend être lié à l'affection sympathique du foie, et en général du système digestif. Mais fréquemment aussi la physionomie n'est point en rapport avec le trouble réel de l'économie, et annonce la santé la plus florissante au milieu des inquiétudes, et quelquefois des souffrances les plus vives. Telle est la source de l'erreur de certaines personnes, qui ne veulent point croire à l'existence, ou plutôt à la réalité d'un état morbifique, parce que la figure de ces individus reste étrangère à son influence.

On rencontre un assez grand nombre de ces malades qui sont tourmentés par des maux de tête, des pesanteurs ou des embarras; d'autres accusent des étourdissemens et des bourdonnemens d'oreilles, qui sont parfois très-fréquens ou continuels, et on ne peut plus incommodes. Chez quelques-uns on remarque une sensibilité

étonnante dans les cheveux, ou plutôt dans le tissu sur lequel ils sont implantés, et qu'ils comparent à une chair meurtrie.

Plusieurs se plaignent d'éprouver tantôt des douleurs vagues mobiles, bien différentes du clou hystérique, qui est fixe et circonscrit, tantôt des chaleurs ou un refroidissement très-prononcé, ou des alternatives de froid et de chaud. Ces douleurs sont locales ou générales, occupent successivement différens points, sont placées extérieurement, ou profondément enracinées, et simulent les douleurs rhumatismales, scorbutiques ou syphilitiques. Chez l'un, des chaleurs vagues et même très-intenses parcourent fréquemment le tronc ou les membres, soit intérieurement, soit à l'extérieur; chez l'autre, ce sont des frissonnemens, des feux, des espèces de fusée, des sensations irrégulières, comme le jet, le cours, les sinuosités ou les ondulations d'un liquide, des sueurs erratives et des alternatives fréquentes de ces anomalies. Dans d'autres cas, ce sont des fourmillemens, des horripilations, des engourdissemens allant même jusqu'au tremblement, ou des faiblesses qui simulent les paralysies; des crampes, des saccades, des contractions musculaires dans les bras, les jambes et les cuisses, ou des palpitations artérielles, qui sont isochrones aux battemens du pouls. Certains malades sont en proie aux sen-

sations les plus variées; il en est qui éprouvent un sentiment extraordinaire, mais bien distinct du délire mélancolique, et qui ressemble au mouvement que produirait un reptile, une couleuvre, un poisson; leur imagination ne les trompe pas, puisqu'ils savent très-bien qu'il n'existe aucun animal dans leur économie. Une femme nous disait souvent, qu'il s'opérait dans son dos un mouvement, tel que celui d'une carpe qui ferait des sauts; mais sa raison ne la trompait pas sur la valeur véritable de ce phénomène. Nous avons soigné un homme atteint d'hypocondrie, qui ressentait une faiblesse très-grande avec une sorte d'engourdissement dans tout le côté droit. Lorsqu'il transportait sur le bras et la jambe gauches le poids de son corps, en s'inclinant beaucoup de ce côté, la maladie, ou plutôt la sensation de son engourdissement, se déplaçait, le bras droit et la jambe devenaient libres, et le côté opposé était dans un état avoisinant l'hémiplégie; replaçait-il l'axe de son corps dans la situation perpendiculaire au sol, l'engourdissement regagnait son siége primitif. Ce malade comparaît ce phénomène à l'action de verser un liquide d'un vase dans un autre, et il lui semblait qu'en effet un liquide passait de droite à gauche, *et vice versâ*. La plupart accusent une débilité très-grande, des lassitudes dans les membres thoraciques et surtout abdo-

minaux, une instabilité très-grande dans la progression.

C'est encore un caractère spécial de l'hypocondrie que cette disposition propre à la plupart de ces malades, qui leur fait éprouver des résultats ou des symptômes graves et alarmans, déterminés par les causes les plus légères. Ainsi un léger froid, ou une chaleur même modérée, leur occasionne des impressions très-fortes; une dose proportionnée ou usuelle d'un médicament quelconque produira chez eux des effets extraordinaires. Rien de plus commun que d'entendre ces individus accuser des accidens, des anomalies, des douleurs, ou même des maladies dans tous les points de leur organisation, surtout quand on dirige leur attention vers ces différentes parties. D'après leurs récits, ils sont malades, ou plutôt ils souffrent depuis la plante des pieds jusqu'au bout des ongles, jusqu'à l'extrémité des cheveux. La plupart conviennent de cette susceptibilité extrême que le médecin n'est pas fâché de rencontrer, parce qu'elle caractérise cette névrose, et que les malades eux-mêmes sont bien aises qu'on leur fasse remarquer si, en même temps, on veut, et surtout si on peut les convaincre qu'une lésion grave et profonde est incompatible avec une pareille exaltation de la sensibilité générale. Cette multiplicité de symptômes a été remarquée il y a déjà long-temps. *Signorum*

maximus, dit Manget, *est numerus, vix enim ulla pars corporis est quæ vim hujus morbi effugit, præcipuè si morbus radices altè egerit.* Dans d'autres cas, la sensibilité est émoussée, ou plutôt l'exaltation d'un organe voisin diminue d'autant celle des autres parties; et quand on agit sur ces dernières, on est tout étonné qu'elles ne répondent pas proportionnellement aux excitations qui leur ont été communiquées.

Les hypocondriaques sont en général très-accessibles à l'influence des variations atmosphériques. Souvent ils en sont avertis par un malaise général ou local; d'autres fois par l'exaltation de leur sensibilité. Le plus grand nombre est irrité par les temps froids et humides, ou quand le vent est sud-ouest. Quelques-uns, au contraire, sont spécialement agacés par le plus beau temps du monde, et lorsque le vent souffle nord ou nord-est.

Le sommeil est ordinairement peu altéré dans les deux premières périodes de cette névrose; bien plus, quelques malades soupirent ardemment après l'heure du sommeil, et ne trouvent de tranquillité que dans leur lit; d'autres redoutent ce moment comme l'époque d'une exaltation orageuse. Le plus souvent des rêves tristes et pénibles, résultat d'une imagination inquiète, troublent le repos, et produisent une agitation ou une insomnie cruelles. Quelques-uns s'en-

dorment tranquillement, mais sont bientôt réveillés par des phénomènes nerveux, tels que des sifflemens, des bourdonnemens très-incommodes, le bruit d'une forte détonation électrique, la décharge d'une arme à feu, le son d'une cloche ou un grand fracas; d'autres fois ils éprouvent, au milieu même d'un sommeil parfait, des attaques de cauchemar (1), ou font des songes si effrayans, qu'il s'ensuit des traits de somnambulisme, ou un réveil terrible et en sursaut.

Le grand nombre de symptômes qui appartiennent aux deux derniers degrés de cette névrose, nous démontre la grande influence qu'exerce l'estomac sur toute l'économie, influence reconnue par *Vanhelmont* et par *Wepfer*, qui appelait cet organe le *præses systematis nervosi*, le chef du système nerveux. Ces phénomènes sympathiques sont d'autant plus multipliés et plus constans, que l'organe affecté jouit d'une vie plus énergique et remplit des fonctions plus importantes : cette vérité a été surtout

---

(1) On sait que cette sensation, très-variable dans son intensité, peut néanmoins être comparée à un poids énorme qui pèserait sur la poitrine : cette oppression se dissipe par le réveil qu'elle excite; mais il reste ordinairement des palpitations et une gêne de la respiration, qui parfois dépendent de l'impression morale, et subsistent pendant un laps de temps plus ou moins long.

développée d'une manière lumineuse dans un très-beau Mémoire du docteur *Roux*, sur *les Sympathies* (1). Plus les phénomènes du deuxième degré acquièrent d'intensité, moins les symptômes du premier sont en général prédominans; ceux-ci s'affaiblissent, en apparence, bien davantage quand les accidens, résultat du trouble sympathique de nos facultés mentales, sont très-prononcés.

Troisième degré.

Bientôt les organes de nos relations extérieures, ou qui nous mettent en rapport avec tout ce qui nous environne, participent au trouble de la vie nutritive ou intérieure, et c'est alors que commence une nouvelle série d'accidens nerveux vagues et irréguliers. En général, le désordre moral se prononce plus tôt, et est plus caractérisé lorsque l'hypocondrie est produite par les affections pénibles de l'âme ou par des médita-

---

(1) Il paraît étonnant, au premier coup-d'œil, que les altérations organiques de l'estomac ne produisent pas des phénomènes sympathiques aussi nombreux : cette différence des résultats tient à la nature différente des deux maladies; dans le premier cas, ce sont les propriétés vitales de l'estomac qui sont affectées, et surtout la sensibilité organique; dans le deuxième, c'est le tissu même de l'organe qui est compromis, et la sensibilité animale qui est particulièrement mise en jeu.

tions trop prolongées. Au contraire, quand elle est le résultat d'une cause physique, le trouble de nos fonctions organiques prédomine sur celui de l'entendement ; dans ce cas, la maladie est quelquefois toute physique; dans l'autre circonstance elle est toute morale, c'est-à-dire, que l'altération des facultés mentales est plus évidente et prédominante : on remarque communément des vertiges, des éblouissemens, des illusions d'optique, des sifflemens, des tintemens d'oreille, une sensibilité exquise de l'ouïe (1), de l'odorat, du goût, de la vue, et même du toucher. Un médecin rapportait qu'il lui semblait, pendant son hypocondrie, entendre par tout le corps. Tel était sans doute l'état de cette femme de Lyon, qui prétendait voir par l'épigastre. N'est-ce pas à une exaltation semblable de sensibilité qu'il faudrait rapporter ce qui a lieu chez les somnambules et les magnétisés? Enfin ne peut-on pas également rapporter à une exaltation aberrative de la sensibilité, l'observation de cette dame (*Nosograph. phil.*, t. 3) qui décrivait ainsi ses anomalies nerveuses : « Le ma» tin à mon réveil, et le soir avant de m'endor-

---

(1) Le son le plus léger le fait transir d'horreur;
Et de son cerveau creux la membrane affligée,
Du moindre ébranlement se trouve dérangée.

L'Hypocondre, de J. B. Rousseau.

» mir, les artères de ma tête étant plus vivement
» agitées, j'entends très-distinctement, vers le
» derrière ou au sommet de ma tête, une voix
» (je manque d'autre expression, ou plutôt je
» sens que celle-là seule est exacte); cette voix
» donc rend des sons franchement articulés,
» construit des phrases qui présentent toujours
» un sens, rarement obscur; suis-je levée ou sur
» mon séant, cette voix cesse de se faire enten-
» dre. Quoi qu'il en soit de cette singularité, je
» proteste que mes idées ni aucune de mes fa-
» cultés pensantes n'y ont sciemment part.... Le
» principe de tous mes maux est dans mon ven-
» tre; il est tellement sensible que, peine, dou-
» leur, plaisir, en un mot, toute espèce d'affec-
» tions morales ont là leur principe. Un simple
» regard désobligeant me blesse cette partie si
» sensiblement, que toute la machine en est
» ébranlée.... Je pense par le ventre, si je puis
» m'exprimer ainsi ».

Ces malades sont tourmentés par des terreurs paniques pour les causes les plus légères, ou même sans causes; quelques-uns sont effrayés de la moindre descente, qui leur paraît un précipice : la vue d'une rivière, d'un puits, redouble leurs craintes; la rencontre inopinée d'une autre personne, d'un animal domestique, l'approche d'une voiture les épouvantent également; ils recherchent la solitude, et manifestent une aversion

extrême pour la société, l'exercice et le mouvement. Les uns se prétendent dans l'impossibilité de marcher, vu les étourdissemens qui les poursuivent partout; les autres allèguent une très-grande faiblesse dans les jambes ou leur instabilité; beaucoup enfin mettent en avant l'une et l'autre objection, ou d'autres raisons également spécieuses, mais qu'ils croient fermement valides. Cette répugnance pour toute espèce de mouvement, pour l'exercice, pour la promenade, est une circonstance très-ordinaire chez ces malades, et une disposition fâcheuse.

Souvent ils s'abandonnent à une tristesse profonde, à une défiance ombrageuse, à des impatiences multipliées, ou à une irascibilité très-grande et presque involontaire. Toutefois on rencontre un très-grand nombre de ces malades à qui la nature semble avoir imprimé l'habitude des sentimens doux et affectueux; d'autres offriront dans le même jour une disposition morale opposée, et recevront tour à tour leurs parens ou leurs amis avec l'accueil le plus gracieux ou le plus maussade; et celui qui sera enchanté un jour de la réception qu'un hypocondriaque lui aura faite, sera quelquefois tout désappointé le lendemain de l'accueil qu'il en recevra.

Gémissant sur leur situation qu'ils ne sauraient comprendre, quelque effort qu'ils fassent pour s'en rendre raison, ils ne peuvent en entre-

voir le terme, et dès-lors leur pressentiment est sinistre, l'avenir n'est plus pour eux qu'une perspective effrayante; ils redoutent beaucoup plus la continuité de leur état ou une longue suite de souffrances, qu'ils ne sont réellement effrayés de l'idée chimérique d'une mort prochaine : de là vient un ennui général et même le découragement ou ces velléités de mort volontaire, auxquelles heureusement un petit nombre s'abandonne. Le désespoir que l'on remarque souvent dans cette maladie diffère de celui des mélancoliques, et qui les conduit fréquemment au suicide. Dans l'hypocondrie le malade éprouve bien quelquefois le dégoût de la vie; il parle de mourir parce qu'il souffre; mais s'il appelle la mort à son secours, c'est comme le bûcheron de la fable.

Leur confiance est, comme leur esprit, incertaine et versatile; on les voit consulter avec la même foi l'homme de génie et les commères, le médecin instruit et l'apothicaire, ou les savans de société, qui ont en poche un remède assuré contre toutes les maladies. Aussi remarque-t-on chez presque toutes les personnes nerveuses, une propension étonnante à entretenir de leurs accidens ou de leur situation tous ceux qu'elles rencontrent, et qui sont disposés à les entendre. Toutefois cette complaisance qui, en général, les flatte infiniment, ne leur procure trop sou-

vent que des idées inexactes ou contradictoires sur leur état, et contribue à les replonger de plus en plus dans la souffrance, et à perpétuer leurs craintes. Le désir de la conservation est inné chez l'homme, et c'est en partie ce sentiment très-naturel qui, outré chez ces malades, les porte à désirer et à solliciter quelquefois, avec une instance imperturbable, des médicamens, ou à s'en administrer de leur chef, et à leur attribuer des effets contraires ou avantageux, suivant qu'ils étaient prévenus en leur faveur ou contre leur usage. Souvent, quand ils ont adopté une idée, ils se soumettront aux remèdes les plus désagréables, aux plus irritans, si leur action paraît se concilier avec le succès qu'ils en attendent, ou avec l'opinion qu'ils se sont créée.

Chez les hypocondriaques l'altération des fonctions de l'entendement n'est jamais essentiel; c'est un symptôme de la maladie qui n'existe même pas toujours, et manque souvent quand celle-ci n'est pas déjà ancienne ou très-prononcée.

En général un trouble fugace et varié dans les idées leur rend toute contention d'esprit plus ou moins pénible, et même impossible; d'autres, en assez grand nombre, accusent un vague dans la tête, une sorte de vide qu'on pourrait appeler *ivresse hypocondriaque*. Cependant il est quel-

ques-uns de ces malades à qui l'habitude du travail, une tournure d'esprit particulière ou un beau développement des facultés intellectuelles, rendent une application modérée, non-seulement nécessaire, mais encore favorable.

La mémoire est quelquefois incertaine ou affaiblie; rarement offre-t-elle un trouble un peu grave. Cependant *Manget* a consigné dans ses œuvres deux exemples d'hypocondrie avec *amnésie* (1) ou perte de mémoire; mais comme cette lésion intellectuelle nous semble former plutôt une complication qu'un symptôme de cette névrose, nous ne les rapporterons qu'au chapitre où sera exposée l'histoire des maladies qui compliquent l'hypocondrie.

La conception ou le jugement présente aussi des altérations qui sont rarement très-prononcées; les hypocondriaques sont, pour la plupart, peu susceptibles d'attention, très-sujets aux distractions, et versatiles dans leur volonté.

De toutes les facultés intellectuelles l'imagination est constamment la plus compromise, et toujours sympathiquement. Mais il ne faut pas croire, bien que l'imagination de ces malades soit affectée, que la maladie ou que les souffrances qu'ils accusent soient imaginaires; leurs maux sont réels, mais ils en exagèrent les effets,

(1) D'α, privatif grec, sans, μνεμον, mémoire.

les dangers, et ajoutent souvent à un symptôme morbifique véritable une crainte exagérée ou chimérique. *Alberti* rejette l'opinion des médecins qui croient qu'il y a quelque chose d'imaginaire dans cette maladie, et nous nous rangeons de son avis, tout en convenant que les craintes auxquelles les vaporeux s'abandonnent ajoutent au mal réel le mal de la peur, ce qui, dans une névrose où les affections morales jouent un si grand rôle, n'est pas sans des conséquences très-graves.

L'imagination de ces malades est tellement inquiète et mobile, qu'elle embrasse une foule d'idées, et les quitte successivement avec une égale facilité : tourmentés par les phénomènes de la maladie et par des terreurs paniques, ils se croient souvent menacés à la fois de plusieurs maladies mortelles. Si un de leurs amis vient à périr, l'affection qui l'a enlevé est celle qu'ils redoutent davantage; mais qu'on les entretienne d'une autre maladie, le plus souvent leur crainte change aussitôt d'objet.

Un de ces malades en convalescence avait plusieurs fois été frappé de diverses idées de cette nature. Néanmoins, depuis long-temps, son imagination était tranquille. Il se rencontre trois jours de suite avec un homme qui passait dans la société pour être menacé d'une hydropisie de poitrine; ils causent long-temps ensemble de leur santé, et peu de jours après, notre hypo-

condriaque, persuadé d'avoir un hydro-thorax, nous communique ses inquiétudes; nous apprîmes en même temps la rencontre qu'il avait faite, et reconnûmes bientôt d'où lui venait cette nouvelle crainte. Nous lui en fîmes l'observation, et après lui avoir rappelé mille autres terreurs paniques, qui l'avaient également tourmenté, nous lui annonçâmes que s'il s'occupait encore de cette idée, nous lui ferions le tableau si détaillé d'une autre maladie plus terrible encore, que, tremblant à tout instant d'en être atteint, il perdrait ainsi de vue sa prétendue hydropisie de poitrine. Cette leçon un peu forte lui fut profitable, et au bout de peu de jours, il n'y pensait plus. Nous avons souvent rencontré de ces malades, chez qui on aurait pu produire à volonté la crainte de telle ou telle maladie, et dont nous avons singulièrement calmé l'imagination, en les assurant qu'on leur ferait oublier, quand on voudrait, l'effroi qui les tourmentait, en leur imprimant une nouvelle frayeur.

Une particularité aussi notable que fréquente chez les hypocondriaques, c'est cette exaltation, cet enthousiasme, et surtout l'exagération, quelquefois aussi l'épouvante, qui percent dans la peinture qu'ils font de leurs maux ou de leurs pressentimens (1). Ils impriment leur cachet

(1) Je transcris ici la lettre que m'écrivait, durant son pa-

dans tous leurs récits; ils ont, en un mot, une manière de s'exprimer toute particulière, un *modus dicendi* qui leur est propre, et qui les caractérise. L'exaltation des idées est quelquefois si prononcée, qu'elle fait craindre le développement de la manie délirante, et qu'elle l'avoisine en quelque sorte; cependant nous avons vu plusieurs fois cette effervescence mentale sans le résultat dont nous indiquons la possibilité, ce qui nous porte à croire qu'il est assez rare.

Leur persévérance à parler de leur situation, à revenir sur cet objet, et à commenter avec les plus grands détails les moindres accidens, constituent encore aux yeux du médecin observateur un autre signe pathognomique de cette affection. À ce fait, remarquable chez le plus grand nombre, il faut en ajouter un second, également important, et que nous avons déjà noté; c'est la multiplicité extraordinaire des symptômes que présente l'hypocondrie. Mais si les phénomènes de la maladie sont nombreux, les développemens que l'imagination de ces malades y ajoute, les

---

roxysme, un de mes malades : « Mon corps est un foyer » ardent; mes nerfs, des charbons embrasés; mon sang, de » l'huile bouillante : tout sommeil est anéanti. Venez m'ap- » porter quelque secours, s'il est possible; je souffre le mar- » tyre ». Quel est le praticien qui, sur un pareil style, ne reconnaîtra pas un hypocondriaque! Mais il faut en outre s'assurer de l'état simple ou compliqué de la maladie.

différens points de vue sous lesquels ils les considèrent, sont encore bien plus multipliés. *Tot capita, tot sensus.*

D'autres s'occupent sérieusement des choses les plus futiles, mettent une grande importance aux moindres détails; l'un épie tout ce qu'il expectore, examine avec une attention scrupuleuse ses crachats, dans l'espoir d'y trouver le motif de ses craintes ou quelques renseignemens précieux sur son état; l'autre voit dans ses urines un nuage, un sédiment, une couleur, d'où il tire des conséquences à perte de vue. Un particulier, atteint d'hypocondrie, avait consacré un appartement tout entier à recevoir les vases où il déposait son urine; il en avait une collection très-nombreuse, un pour chaque jour de la semaine, et les passait très-souvent tous en revue dans ce muséum d'un nouveau genre.

Plusieurs d'entre eux offrent un caractère minutieux des plus remarquables : ils ne font rien qu'avec poids et mesure ; et c'est une vérité frappante, autant qu'un trait comique, que l'inquiète incertitude de M. *Argan* sur sa promenade en long ou en large, et sur le nombre de grains de sel qu'il doit mettre dans son œuf. Souvent ils se font expliquer vingt fois, et jusqu'aux moindres détails, la composition de leurs médicamens ; ils craindront quelquefois qu'on ait dérogé d'une minute aux ordres du médecin, qu'on ait ajouté

ou omis une feuille ou une fleur dans la plus simple infusion ; d'autres fois ils appréhenderont l'effet de la substance la plus bénigne ou la plus inerte, et ils ne se risqueront qu'en tremblant à en prendre une faible partie. Le degré de la température, l'époque où le médicament doit être pris est également pour eux un sujet d'inquiétudes très-graves. Les mêmes alarmes se représentent pour mille autres circonstances, et surtout pour leur régime. On sait qu'en général les gens du monde attachent aux alimens les moins actifs des propriétés, ou gratuites, ou bien supérieures à leurs propriétés véritables; parfois ils leur supposent une action dangereuse et malfaisante, ou une vertu toute puissante, sans plus de motifs. Rarement une réunion est-elle exempte de ces savans commentaires; les hypocondriaques sont très-coutumiers du fait, et renchérissent ordinairement sur cette disposition, répandue presque généralement. Leur éducation médicale n'est pas toujours parfaite; aussi les substances alimentaires qu'ils redoutent davantage, sont parfois celles qui leur conviennent le plus, aussi leur régime est-il plutôt minutieux, qu'exact et régulier. Les vêtemens, l'exercice, leurs promenades, toute espèce de mouvement, l'état atmosphérique, la direction des vents, la chaleur, le froid, l'humidité ou la pluie, souvent les circonstances les plus opposées leur causent

les mêmes incertitudes. Nouveaux *Sanctorius*, ils se soumettraient, pour connaître à fond les faits les moins importans, à une foule d'épreuves et d'expériences, pourvu qu'elles n'exigeassent ni une grande force de caractère, ni une grande constance. Ils sont, en général, très-curieux de s'instruire de tout ce qui concerne l'organisation humaine, de ses fonctions, de leur dérangement, et de tout ce qui réagit sur notre économie; souvent leur curiosité n'est pas ainsi limitée; elle est générale, universelle : un hypocondriaque présentait, entre autres symptômes, un désir extrême de connaître toutes les causes finales.

Le caractère des hypocondriaques reçoit différentes modifications; tantôt il est renforcé, tantôt il est affaibli. Un jeune dame d'un caractère très-vif avait perdu, pendant la durée de son hypocondrie, une grande partie de sa vivacité; une autre était devenue turbulente.

L'attention extrême avec laquelle ces malades observent tout ce qui les concerne, et spécialement les phénomènes relatifs à leur santé, les porte à rechercher la cause des divers accidens nerveux qu'ils éprouvent; et suivant celui qui prédomine par son intensité, ou vers lequel leur imagination a été particulièrement dirigée, ils se persuadent être atteints de telle ou telle affection, qui peut offrir quelque analogie avec le symptôme prédominant.

Un médecin qui, pendant ses études, fut un hypocondriaque prononcé, comptait jusqu'à sept maladies mortelles dont il se croyait affecté, ou au moins menacé. Un second s'imaginait avoir tantôt une phthisie laryngée ou une phthisie pulmonaire; dans d'autres instans, un squirrhe au pilore, ou un anévrisme du cœur; à une autre époque, c'était un commencement de maladie coxofémorale ou de l'articulation de la cuisse : cette dernière frayeur lui était suggérée par un sentiment de faiblesse dans la hanche et une assez forte douleur au genou. La crainte de tomber en démence tourmentait souvent une jeune dame qui échangeait cette aliénation, tantôt contre un hydrothorax, d'autres fois contre une lésion organique du cœur ou de la rate, et successivement contre toutes les affections dont elle entendait parler.

Mais nous devons noter parmi les maladies dont la peur tourmente spécialement les hypocondriaques, les aliénations mentales, les syncopes, et surtout l'affection vénérienne; les femmes redoutent en outre les maladies qui leur sont particulières.

Madame D** éprouve de violens chagrins, et contracte insensiblement une hypocondrie très-grave : témoin d'une conversation sur les maladies siphilitiques, elle se rappelle que son mari a été atteint, en Amérique, d'un simple écoule-

ment, et bientôt elle craint que sa santé ne soit compromise. S'abandonnant à l'exaltation de son imagination, et prenant pour un symptôme de siphilis les débris de la membrane vaginale, les caroncules myrthiformes, elle se rend de suite à Paris pour solliciter leur extirpation et un traitement approprié.

Le même fait que nous avions recueilli et consigné dans des notes dont nous lui donnâmes connaissance, et surtout les réflexions rassurantes d'un de nos plus célèbres chirurgiens, le professeur *Boyer*, rendirent le calme à son esprit.

Je vais rapporter un deuxième exemple, qui tend également à démontrer combien la crainte des maladies vénériennes trouble l'imagination des personnes fort susceptibles.

Une femme très-nerveuse et douée d'une imagination ardente, était, depuis long-temps, tourmentée par une hypocondrie d'autant plus grave, qu'elle était entretenue par plusieurs causes dont l'influence subsistait toujours.

Sur ces entrefaites elle contracte une liaison intime avec un jeune homme qui s'en sépare au bout de quelques mois. Vingt jours après cette rupture, il revient chez cette dame qu'il accuse, sans raison, d'un procédé indigne. Toutefois ces reproches, quoique dénués de fondement, suffisent pour lui faire naître des craintes (1); bien-

(1) Ces frayeurs sont un symptôme de l'hypocondrie, et

tôt elle se persuade qu'elle a pu recevoir elle-même l'infection et me témoigne ses inquiétudes. Rien ne les motivant, je m'efforçai de les dissiper; mais son imagination était frappée, et cette dame va consulter un autre médecin, qui, jugeant son état d'après le récit qu'elle lui faisait et quelques apparences d'affection vénérienne, la confirme dans l'idée de cette maladie. Toutefois il n'existait aucun signe positif de siphilis ni vers les parties génitales, ni ailleurs; cette dame, à la vérité, se plaignait de maux de tête, mais ils étaient habituels, et n'offraient point les caractères propres aux douleurs ostéocopes. Enfin, l'arrière-bouche ne présentait aucune ulcération; et si les bords de la langue étaient excoriés, c'était le résultat d'une opération récente, pratiquée sur les dents. Ce ne fut pas sans peine que je parvins à rassurer l'esprit de cette malade; plus tard, le succès des émolliens et de quelques autres moyens mis en usage, acheva cependant de dissiper toutes ses terreurs paniques.

Cette habitude de faire des retours sur soi-même, de s'occuper de sa santé, d'interroger en quelque sorte ses différens organes, entre-

---

ne sauraient constituer la mélancolie ou délire partiel, parce qu'elles varient, se succèdent les unes aux autres, et sont accompagnées des autres symptômes ordinaires à la névrose des organes digestifs.

tient une disposition continuelle à la crainte, ou plutôt des craintes permanentes, et agit de plusieurs manières défavorables. Son impression sur l'état général de l'âme est déja très-fâcheuse ; qui ne connaît les mauvais effets de la frayeur et surtout d'une frayeur continue? Mais en outre, elle trouble de plus en plus les différentes fonctions, celles surtout qui sont le siége du désordre; de sorte qu'après avoir été produite par celui-ci, la crainte devient ensuite cause aggravante. Ces individus accusant si fréquemment des maladies très-graves dont on ne trouve aucune trace dans l'organisation, puisqu'il n'existe jamais de lésion organique tant que l'hypocondrie est simple, rappellent alors le berger de la fable qui criait au loup quand le danger n'existait pas; ils fatiguent par leurs plaintes qui ne sont pas fondées. Quelquefois on se familiarise enfin avec leurs récits, avec leur exagération habituelle; et l'attention, la patience du médecin s'affaiblissent ou s'éteignent de *guerre lasse*. D'un autre côté, s'il arrive qu'à la longue la maladie fasse des progrès, si une complication s'établit sourdement, ses premiers pas sont lents, obscurs; ils peuvent échapper même à l'observateur attentif, *à fortiori*, à celui qui n'est pas sur ses gardes. Le malade réclame toujours des soins, des médicamens, une guérison qu'on se désespère de ne pouvoir lui procurer. Cette impuissance amène le découra-

gement; et parce qu'on ne peut dissiper l'affection nerveuse, on négligera peut-être, dans quelques cas, de prévenir une lésion organique imminente ou d'en arrêter les progrès; quelquefois aussi le malade ne songera pas à appeler de nouveau l'attention du médecin. C'est alors qu'on voit se former des désordres d'un nouveau genre qui compliquent, aggravent ou terminent quelquefois d'une manière fâcheuse les affections hypocondriaques.

A mesure que le désordre moral fait des progrès, les digestions continuent ordinairement à s'exécuter avec une lenteur ou une difficulté croissantes. Une irritation voisine peut cependant débarrasser, en quelque sorte, le foyer principal des fonctions digestives : c'est ainsi qu'une femme très-nerveuse digère fort bien, quand un vésicatoire qu'elle porte au bras lui occasionne quelque douleur, et lorsqu'il suppure abondamment. D'autres fois, comme nous l'avons dit, les phénomènes dépendant de la sensibilité générale et des facultés mentales prédomine à ce point que le trouble de la digestion est masqué, suspendu, ou même n'existe pas. Il est en outre possible, quoique nous ne l'ayons peut-être jamais observé, que cette névrose débute par les symptômes qui signalent le trouble mental et l'aberration de la sensibilité : cette particularité se remarquera de préférence dans l'hypocondrie, suite des peines

morales, chez les individus à imagination active, ou pourvus d'une extrême susceptibilité; mais, nous le répétons, c'est plutôt une exception qu'une variété, et nous concévons difficilement l'existence de cette maladie sans l'affection primordiale du système nerveux propre aux organes de la digestion, affection qui peut exister, non-seulement avec un bon appétit, mais même avec un appétit démesuré.

Si la nutrition a lieu très-imparfaitement, le malade maigrit en peu de temps d'une manière sensible; le teint devient pâle, les chairs molles. Chez la femme il se déclare souvent un état leucorrhoïque, les règles se dérangent ou diminuent, et parfois se suppriment entièrement avant l'époque assignée par la nature. C'est alors surtout que l'engorgement et la tuméfaction des hypocondres se manifestent ou se renforcent; tantôt le droit est particulièrement affecté; et si déjà le foie participe à la maladie, bientôt la peau, celle surtout de la figure, se colore en jaune. Le gonflement et la sensibilité exaltée de cette région font pressentir une disposition plus ou moins imminente aux hépatites chroniques, et plus tard aux dégénérescences organiques du foie.

Les mêmes phénomènes vers l'hypocondre gauche attestent l'affection sympathique de la rate : le teint du malade devient livide et terne,

quelquefois noirâtre. Souvent alors l'hypocondrie n'est plus simple, il existe déjà une complication grave qui se dénotera tôt ou tard.

Les engorgemens avec douleur et dureté de l'épigastre ou des hypocondres, lors même qu'il n'existe point de lésion profonde dans les organes subjacens, exigent toute l'attention du médecin, car cette permanence seule d'une irritation nerveuse ou spasmodique sur un viscère important, est de toutes les causes des affections organiques, nous l'avons déjà dit, la plus constante et la plus puissante. Le siége de l'engorgement et de la douleur, joint à la série particulière d'accidens qui se développent, fait présager tout naturellement et avec une espèce de certitude l'organe affecté; de même l'invasion récente des symptômes, leur degré modéré, le bon aspect de la physionomie, et l'absence de la soif et de tout mouvement fébrile, éloignent la crainte d'un désordre très-grave ou irrémédiable. On doit parfois aussi augurer favorablement de l'ancienneté de la maladie, quand le trouble qu'elle a opéré offre peu d'intensité.

Les phénomènes sympathiques des autres parties de l'économie suivent une marche analogue; le plus souvent ils augmentent, quelquefois se succèdent mutuellement ou s'affaiblissent suivant le résultat des moyens administrés, etc.

Nous avons jusqu'ici décrit les symptômes les

plus constans de l'hypocondrie observée sur un très-grand nombre d'individus; nous avons, en exposant cette histoire générale, offert le tableau des différentes périodes que parcourt la maladie lorsqu'elle est abandonnée à elle-même, ou quand ceux qui en sont atteints restent longtemps sous l'empire des causes les plus défavorables; mais s'ils échappent de bonne heure à leur influence, ou s'ils reçoivent des soins bien entendus, l'affection, loin de se prononcer de plus en plus, s'affaiblit souvent d'une manière plus ou moins prompte.

Ainsi l'on se tromperait beaucoup, si l'on croyait que toujours l'hypocondrie parcourt tous ses différens stades : souvent même elle n'offre qu'une très-petite partie des phénomènes qui constituent le premier; d'autres fois elle ne parvient qu'au second, et bien plus rarement atteint-elle le troisième degré. Jamais d'ailleurs un seul malade ne présente l'ensemble des symptômes que nous avons exposés, et qui sont déduits d'un très-grand nombre d'observations.

Cependant plusieurs auteurs paraissent, dans l'exposition qu'ils nous ont transmise des phénomènes propres à l'hypocondrie, en avoir oublié les nuances, les nombreuses anomalies et les degrés, pour offrir de cette maladie un tableau toujours très-effrayant. Beaucoup de malades, qui ont eu le malheur de lire ces ouvrages sur

les affections nerveuses, en ont reçu une impression très-défavorable; ils en ont parcouru la description dans ces auteurs, et se sont persuadés qu'une fois atteints de cette maladie, ils en éprouveraient successivement tous les différens degrés, jusqu'à la terminaison la plus funeste. Cette opinion erronée est souvent très-difficile à détruire.

Mais de plus, nous l'avons fait pressentir, la marche de la maladie varie singulièrement : elle diffère en effet suivant chaque individu, et chez la même personne, aux différentes époques de l'année, suivant la période de la vésanie, son état de modération habituelle ou d'exacerbation; souvent elle est différente d'un mois, d'un jour, d'un instant à l'autre; fréquemment elle s'exaspère chez les femmes, à chaque retour des règles, et surtout vers l'époque critique, ou même après cette révolution. Le genre de vie, le régime, les habitudes, les dispositions morales surtout, le traitement enfin, la modifient singulièrement. Tantôt sa durée n'est qu'éphémère ou peu prolongée; tantôt elle se soutient pendant très-longtemps au même degré, ou présente une grande inégalité; dans d'autres cas, il existe des redoublemens qu'on nomme *paroxysmes*, et dont les retours, la durée et l'intensité sont toujours très-variables. Chez un malade, ce sont les accidens physiques qui prédominent; chez un autre, c'est

le trouble mental, c'est l'exaltation morale ou les craintes continuelles qui, préoccupant l'attention, font taire et oublier les symptômes maladifs, propres aux différens viscères; enfin quelques hypocondriaques perdent de vue les phénomènes les plus importans, pour s'occuper exclusivement des plus futiles, qu'ils recommandent d'une manière spéciale à la sagacité de leur médecin. Quelquefois cette névrose s'affaiblit insensiblement, ou d'une manière assez prompte, ce qui est moins ordinaire; et à l'instant où le désordre est prêt à s'éteindre, de nouveaux chagrins, des méditations trop soutenues, ou une infraction aux lois de l'hygiène, rappellent les accidens; tel cet oiseau fabuleux, l'hypocondrie semble alors renaître de ses cendres.

Mais outre ces variétés, compagnes ordinaires de la maladie, il en existe quelquefois de plus tranchées, et qui font admettre des espèces ou des variétés particulières : celles-ci doivent être reconnues toutes les fois que les symptômes d'une affection s'éloigneront de la marche qui lui est ordinaire, ou qu'à une cause particulière on pourra rattacher constamment des phénomènes analogues, mais différens de ceux que produisent les autres causes. Cette circonstance n'existant pas dans l'hypocondrie, nous n'admettrons qu'une seule espèce, et point de genres;

nous signalerons seulement quelques variétés, sans apporter aucune importance à ces distinctions qu'on pourrait, à la rigueur, considérer comme des nuances de la même névrose. Il n'en est pas ainsi, suivant nous, des deux variétés que nous avons admises, en traitant de l'hystérie : celles-ci offrent constamment des symptômes différens de ceux propres à l'affection hystérique la plus ordinaire. Le professeur *Pinel*, dans la seconde édition de sa Nosographie, admet deux espèces d'hypocondrie : l'hypocondrie simple, et celle avec lésion organique; mais cette dernière nous paraît constituer une complication, et non une espèce particulière : passons maintenant à l'examen de ces diverses variétés d'hypocondrie.

CHAPITRE V.

Variétés de l'Hypocondrie.

Les variétés sont assez nombreuses, mais en général peu caractérisées; ce sont en quelque sorte des nuances, que nous allons parcourir successivement.

Il est une variété d'hypocondrie assez fréquente, et qui offre pour symptômes prédominans un appétit presque insatiable, ou plutôt un besoin presque continuel de prendre des alimens, et un état de malaise ou d'anxiété qui survient

chaque fois que le malade diffère à satisfaire un désir aussi impérieux. La digestion s'opère dans ce cas avec une rapidité étonnante, et d'autant plus remarquable, que cette *boulimie*, qui n'est qu'un symptôme, est presque toujours l'indice d'une très-grande débilité dans les organes digestifs.

Ces malades sont obligés de porter constamment avec eux des alimens, et d'en avoir pendant la nuit à leur disposition, parce qu'ils sont souvent réveillés par la faim, même au milieu d'un sommeil paisible. On retrouve quelquefois des indices du même trouble dans le canal intestinal; les substances alimentaires y sont incomplètement digérées; il y a tantôt de la constipation, tantôt de la diarrhée; d'autres fois les selles sont jaunes, citrines ou blanchâtres. L'usage des toniques ou stomachiques leur est en général avantageux; mais ces médicamens n'agissent pas d'une manière constante ou uniforme; les uns échouent chez certains individus, à qui d'autres réussissent, *et vice versâ*.

Quelques médecins ont considéré comme une maladie particulière cette variété de l'hypocondrie, dans laquelle le trouble des organes digestifs est peu prononcé, ou en quelque sorte masqué. « On a confondu, dit M. *Pougens*, les va-
» peurs, en général, ou maux de nerfs, avec
» l'hystérie et l'hypocondrie; cependant ces af-

» fections, quoique toutes nerveuses, diffèrent
» entre elles d'après les considérations suivantes :
» 1°. la névropathie (ou vapeurs) consiste dans
» une altération générale du système nerveux,
» sans lésion permanente d'un organe particu-
» lier; 2°. l'hystérie, dans une lésion du même
» système, avec excès de mobilité dans les or-
» ganes de la génération chez la femme; 3°. l'hy-
» pocondrie, dans une mobilité morbifique des
» organes digestifs, jointe à l'altération ner-
» veuse ».

Nous répondrons, 1°. que la névropathie (ou vapeurs) ne nous paraît pas différer essentiellement de l'hypocondrie; car les mêmes symptômes appartiennent à l'une et à l'autre variété, et nous étayerons cette opinion sur des faits, et particulièrement sur deux observations, qui nous démontreront que la névropathie est une variété, et non une espèce particulière d'hypocondrie, et encore moins une maladie *sui generis*, distincte de l'hypocondrie, comme l'est par exemple l'hystérie. 2°. Nous ajouterons que l'hystérie est, à la vérité, très-distincte de l'hypocondrie; mais qu'elle consiste bien moins dans une lésion du système nerveux, avec excès de mobilité dans les organes génitaux de la femme, que dans une affection primitive du *système nerveux utérin*, avec excès de mobilité du système nerveux général, qui est entraîné sympathique-

ment. Si l'hystérie consistait principalement et primitivement dans une lésion du système nerveux général, comme le dit M. *Pougens*, l'homme, ainsi que la femme, serait passible des affections hystériques; mais il en est exempt, parce que cette maladie réside essentiellement dans l'affection des organes générateurs, qui, dans chaque sexe, ont une organisation différente, et c'est cette différence qui amène des résultats si différens. (*Voyez* au reste la première partie de ce travail.) 3°. L'hypocondrie réside bien, comme l'annonce M. *Pougens*, dans une mobilité morbifique des organes digestifs, jointe à l'altération nerveuse; mais cette définition appartient également à cette variété d'hypocondrie, qu'il désigne sous le nom spécifique de névropathie, et qui ne diffère qu'en raison du trouble des organes de la digestion, qui quelquefois est affaibli ou masqué par l'intensité ou la prédominance de quelques autres phénomènes, ainsi que nous l'avons déjà indiqué. De plus, dans l'un et l'autre cas, on retrouve les mêmes causes, les mêmes terminaisons, complications, etc., l'indication des mêmes moyens curatifs, sauf les différences qu'exigent le tempérament, l'âge, le sexe, etc., enfin les mêmes résultats.

L'observation suivante nous offre l'exemple d'une hypocondrie, ou névropathie, suivant M. *Pougens*.

M. D**, âgé de trente-deux ans, naquit de parens sains, et n'éprouva aucune maladie nerveuse jusqu'à l'âge de trente ans; il jouissait habituellement d'une bonne santé, et se livrait avec zèle aux soins qu'exigeait un commerce assez étendu. Libre d'inquiétudes et de chagrins, il s'estimait heureux, et trouvait de nouveaux motifs de contentement dans un mariage qu'il contracta vers cette époque.

Peu de temps après la mort de son frère aîné, dont il fut vivement affecté, son jeune frère vint le voir, et lui témoigna le pressentiment de sa fin prochaine, prétendant être atteint de la même maladie. Cette confidence frappa fortement l'esprit de M. D**; il en ressentit vivement l'impression vers l'estomac, son appétit se dérangea de suite, la bouche devint pâteuse et un peu amère, la langue était enduite d'un limon blanchâtre, et la tête embarrassée. Ces accidens, qui constituaient en quelque sorte un embarras gastrique, furent très-affaiblis par l'usage des délayans et de deux potions purgatives. Mais M. D** resta en outre tourmenté par les idées les plus noires, les plus sinistres; s'il regardait sa femme, il se persuadait qu'elle serait veuve avant peu; s'il sortait de chez lui, il se figurait que bientôt la porte-cochère serait tendue en noir, et lui-même exposé sur une bierre; s'il assistait au spectacle, il n'y prêtait aucune attention, et

s'abandonnait tout entier aux rêveries les plus sombres. Il désirait beaucoup ma présence, parce que je le rassurais; mais aussitôt qu'il entendait prononcer mon nom, qu'il reconnaissait ma voix ou qu'il m'apercevait, un trouble involontaire le saisissait. Il me demandait souvent s'il ne périrait pas bientôt, s'il n'était pas malade de la poitrine ou du foie, si j'étais bien persuadé que son affection était nerveuse, et qu'il n'en mourrait pas.

Tantôt il se plaignait de la tête, de la poitrine ou de l'estomac, etc.; tantôt des bras, des mains et des jambes, où il ressentait du malaise, des inquiétudes ou des chaleurs erratives (1); mais la physionomie restait bonne, et les forces générales n'étaient pas sensiblement diminuées. Depuis, l'appétit s'est rétabli, et les fonctions digestives se font maintenant fort bien; mais il éprouve encore de temps à autre des inquiétudes et des chaleurs dans les membres; il est en outre poursuivi par les mêmes idées sinistres; cependant celles-ci sont moins fréquentes et moins prononcées. Ces accidens lui donnent du relâche; souvent même il en est, pendant plusieurs jours, entièrement exempt. Une disposition hémorrhoï-

(1) Ces derniers symptômes surtout dépendent bien d'une lésion, ou plutôt d'une affection du système nerveux général.

daire, qui survint à diverses époques, me fit lui conseiller deux fois l'application des sangsues au siége. Je lui recommandai en outre de rechercher les sociétés qui lui étaient agréables, de fuir la solitude et l'oisiveté, de faire de fréquentes promenades, de s'inquiéter le moins possible, et d'user avec sobriété des médicamens, de continuer l'usage du vin de Malaga et de quinquina, parce que l'estomac et tout le système digestif restaient un peu faibles; du reste, de n'abuser de rien, mais de se bien vêtir, de se bien nourrir, et de s'amuser aussi souvent que l'occasion s'en présenterait.

M. D** n'est pas guéri, mais son état s'est beaucoup amélioré. Ainsi voilà une hypocondrie qui serait sur la fin une névropathie : pour nous, c'est la même maladie dont les phénomènes ont varié.

Dans l'observation qui suit, le désordre du système digestif est moins apparent que la lésion de la sensibilité générale et les aberrations mentales; mais le diagnostic ne doit pas pour cela varier.

Hypocondrie avec prédominance du désordre, et sans lésion permanente d'un organe particulier.

M. D**, âgé de vingt-huit ans, fut doué dès son enfance d'une forte constitution et d'un tempérament lymphatico-sanguin, avec légère pré-

dominance du tissu cellulaire et graisseux sur le système musculaire. Il unit à une sensibilité réfléchie un caractère fort doux, mais concentré, et à une grande timidité des connaissances très-étendues.

A l'âge de vingt-quatre ans, il éprouva des symptômes cérébraux graves, qui furent dissipés par de promptes saignées et des applications de sangsues réitérées, etc.

Une vie trop sédentaire, des contentions d'esprit excessives et la lecture des livres de théologie contribuèrent beaucoup au développement d'une affection hypocondriaque dont nous allons tracer les premiers phénomènes. D'abord lenteur des digestions, diminution de l'appétit, borborygmes, tensions spasmodiques vers les hypocondres, constipation presque habituelle; plus tard, palpitations nerveuses vers la région du cœur, gêne de la respiration, fourmillemens et par fois engourdissemens dans les membres thoraciques, étourdissemens, bourdonnemens d'oreilles, propension continuelle à s'entretenir de sa santé, craintes non motivées de maladies diverses, sommeil en général assez bon, mais souvent interrompu par des rêves. Il fuyait non-seulement les réunions ordinaires, mais même la société de ses amis et de ses parens qu'il aimait autant qu'il en était aimé : ses jours entiers se passaient dans une inaction, dans un désœuvrement des plus

absolus. En vain on lui conseillait de fréquenter les spectacles, et de rechercher toute espèce de distractions. Il convenait lui-même des avantages qu'il pouvait s'en promettre; mais la force morale, la faculté d'agir, même selon ses désirs, lui manquait, et il se replongeait de nouveau dans l'apathie la plus décidée.

Le médecin, désespéré de ne pouvoir rien obtenir sur l'esprit du malade par la raison et de sages conseils, engagea ses parens à le faire partir pour Paris.

Ce fut alors que le jeune homme reçut mes soins. Lors de ma première visite, il était taciturne, avait l'air étonné, comme stupéfait. Afin de gagner sa confiance, je feignis d'abonder dans plusieurs de ses idées : je lui dis qu'il était bien malade, bien souffrant, que le traitement de sa maladie serait long, mais que je pouvais lui assurer, d'après plusieurs exemples analogues, que son rétablissement était presque certain. Bientôt il voulut me dépeindre son état : *Je suis*, me dit-il, *privé d'intelligence, de sensibilité, je ne sens rien, je ne vois ni n'entends, je n'ai aucune idée, je n'éprouve ni peine ni plaisir; toute action, toute sensation m'est indifférente, je suis une machine, un automate incapable de conception, de sentimens, de souvenirs, de volontés, de mouvemens; ce qu'on me dit, ce qu'on me fait, mes alimens, tout m'est indifférent.* Tel était à peu près son lan-

gage : à la vérité il y avait dans toutes ses facultés mentales, une lenteur d'action étonnante, mais en même temps une grande rectitude ; son jugement était sain, son imagination, sa mémoire l'étaient également, toutes ses actions et tous ses mouvemens étaient raisonnés et raisonnables. Du reste, à cette époque, les digestions s'exécutaient assez bien, et le malade s'en plaignait à peine ; mais la constipation, qui était presque habituelle, n'avait pas cédé. Un examen superficiel aurait pu faire croire qu'il était fou ; je ne vis cependant dans cet exposé que les idées vagues, les rêveries d'un hypocondriaque portées au plus haut degré.

La réaction du moral sur le physique était également sensible : la détermination était tardive, et le résultat s'opérait lentement. Il apportait cette même paresse dans toutes ses actions, pour se lever, s'habiller, marcher, manger, promener, et pour se coucher ; encore fallait-il presque toujours qu'il fût aidé ou suivi par un domestique.

J'étais bien convenu avec lui que sa maladie était réelle ; mais je l'assurai que les conséquences qu'il en tirait étaient erronées, qu'il prenait pour abolition de ses facultés physiques et mentales une certaine lenteur dans leurs phénomènes. Ainsi, lui dis-je, si vous regardez devant vous, vous ne voyez rien, ou vous voyez si confusément,

qu'il vous semble ne rien voir ; mais regardez plus long-temps et plus attentivement, et vous reconnaîtrez successivement les différens objets. En les lui nommant dans un certain ordre et doucement, il convenait qu'il les voyait : donc vous voyez. Vous savez bien, ajoutai-je, à quoi sert telle chose? Après un moment de réticence, il m'avouait en connaître l'usage ; donc, vous concevez, vous raisonnez. En le reportant sur une époque mémorable et récente, je lui prouvais également que la mémoire existait chez lui, mais seulement qu'elle était lente.

Tout le traitement moral fut dirigé d'après ces premiers essais. Quand je ne pouvais le faire convenir d'une vérité sensible, relative à son état, je l'attaquais avec ses propres armes. Vous n'avez, dites-vous, point d'idées, ou que des idées inexactes, erronées? Je jouis, je pense, d'un jugement sain; il est par conséquent très-probable que c'est vous qui vous trompez, et j'ai, de plus que vous, l'expérience de ma profession. Quant à l'exercice, à la promenade qu'il prétendait lui être impossibles, il me fut assez difficile de l'y déterminer; cependant un jour, en occupant son esprit par une conversation variée, je parvins à le faire promener, et même assez long-temps; depuis lors il devint plus aisé de le faire sortir.

J'engageai ses parens et ses amis à ne pas lui parler de sa maladie et à l'entretenir de toute

autre chose, et lorsque je estimais que son imagination était tranquille, je lui défendais de me parler de son état, afin de ne pas changer sa disposition mentale. Quand, au contraire, il était inquiet, tourmenté, morose, je restais avec lui et ne cessais la conversation que lorsqu'il me semblait disposé favorablement.

Ce traitement moral fut secondé par toutes les ressources de l'hygiène et par une application bien motivée de quelques moyens pharmaceutiques, tels que les sangsues lorsqu'il y avait apparence de congestion sanguine vers le cerveau; ou quand il survint quelques tumeurs hémorrhoïdales, *quò vergit natura eò ducendum.* Des boissons laxatives furent administrées dans la même indication. Comme il existait chez lui une légère disposition dartreuse, on donna les pastilles soufrées, on mit un vésicatoire dont l'application fut suivie d'une éruption considérable et de plusieurs furoncles. Dans le principe, on remédia au mauvais état du système digestif par l'ipécacuanha, les purgatifs, puis les calmans et les toniques.

Son état s'améliora sensiblement chaque mois, et après un an il fut en pleine convalescence. Pour la confirmer et maintenir sa guérison, il fut convenu que M. D** alternerait pendant plusieurs années entre une vie très-active dans son pays, et des voyages dans les états étrangers.

L'écart de toutes les causes, qui avaient contribué au développement de cette maladie, lui fut également recommandé. Depuis huit ans qu'il est rétabli, sa santé s'est parfaitement maintenue.

En nous résumant sur ce point, nous pensons que la névropathie est une variété d'hypocondrie avec prédominance des symptômes dépendant d'une affection de la sensibilité générale, et non une espèce particulière de cette névrose, encore moins une maladie spécifique.

Les observations d'hypocondrie sont aussi variées que les individus qui en sont atteints. Toutes, à la vérité, ont des caractères communs qui permettent au médecin observateur d'en reconnaître les symptômes pathognomoniques au milieu des nuances infinies et des anomalies sans nombre qu'elles présentent; mais aucune observation ne ressemble entièrement à une autre; loin d'être identiques, toutes offrent des différences plus ou moins prononcées, qui induisent en erreur les gens du monde, et jettent dans un embarras inextricable les hommes superficiels qui ne s'attachent pas aux signes primordiaux, et s'occupent quelquefois beaucoup plus de quelques accessoires. Disons encore que tous les symptômes ne se reproduisent pas dans tous les cas, et que la marche et la gradation que nous leur avons assignées n'ont pas lieu constamment.

Les premiers accidens, nous le répétons, qui annoncent cette affection nerveuse, dépendent presque toujours du trouble du système digestif, et surtout de l'estomac, dont les fonctions s'exécutent difficilement. Mais par la suite la scène change; on voit le plus grand désordre, tantôt vers la poitrine ou dans le système respiratoire, tantôt dans le système circulatoire ou nerveux; d'autres fois les organes de la locomotion sont les plus fortement entrepris, etc.; souvent enfin nos facultés morales ou nos fonctions intellectuelles sont plus spécialement compromises. Alors les phénomènes résultant du trouble des nerfs qui se distribuent aux organes abdominaux sont moins sensibles, et comme masqués par l'exaltation mentale ou par le désordre des autres parties, en raison de ce grand principe, qu'une irritation plus vive fait presque toujours cesser une irritation moins forte. Ces malades recouvrent quelquefois l'appétit; mais en examinant attentivement leur état, on reconnaîtra, nous l'avons déjà dit, presque toujours l'altération des fonctions digestives comme principe de la maladie.

Voyons maintenant les phénomènes accidentels qui surviennent dans la marche de cette vésanie, et qui forment en quelque sorte autant de nuances. Outre les symptômes primordiaux et les plus ordinaires que nous avons notés jus-

qu'ici, d'autres symptômes se rencontrent encore accidentellement dans l'hypocondrie, sans constituer aucun de ses caractères principaux; ainsi nous ferons remarquer le vomissement nerveux, indépendant d'une affection organique, et qui peut même exister isolément de toute autre maladie; ce vomissement est précédé d'un malaise, et se déclare plus ou moins long-temps après le repas; il est ordinairement muqueux, et peut devenir par la suite alimentaire. On a rencontré quelquefois dans l'hypocondrie, mais rarement, l'horreur des liquides; je l'ai vue dernièrement, dit un médecin aussi modeste que savant, chez un homme qui parvint à la vaincre (1). Cette hydrophobie symptomatique était survenue à la suite d'excès vénériens et de chagrins.

Quelques-uns de ces malades éprouvent des quintes de toux très-vives, surtout après avoir pris leurs alimens, ce qui tient à l'affection sympathique du poumon, produite par l'irritation des nerfs de l'estomac. Ce phénomène mérite d'être pris en considération, dans la crainte qu'il ne soit l'avant-coureur d'une maladie de poitrine imminente.

Le hoquet qui se manifeste quelquefois dans cette névrose, n'est pas aussi dangereux que

---

(1) Traité de Séméïotique, par M. *Landré Beauvais.*

celui qui survient vers le déclin d'une fièvre maligne, ou de toute autre maladie également grave; c'est un accident spasmodique, et qui cède ordinairement aux moyens que nous indiquerons.

Il existe assez fréquemment, dans l'hypocondrie, une débilité générale dans les organes de la digestion, dont il résulte parfois une surcharge de sucs variés ou de mucosités intestinales. L'action de l'estomac et des intestins est si faible alors, que leurs contractions sont probablement insuffisantes pour les débarrasser de ces matières qui deviennent stagnantes dans le tube intestinal, surtout chez les malades qui ne font aucun exercice. On distinguera cet engouement d'une altération organique, à l'absence des symptômes graves de cette dernière; tels que douleurs lancinantes, trouble de la plupart des fonctions, quelquefois fièvre symptomatique, urines rares et blanches, à l'ancienneté du désordre; rien n'est plus ordinaire qu'une hypocondrie plus ou moins invétérée, tandis qu'on voit rarement une altération organique dont l'existence ne soit pas attestée, après un certain laps de temps, par des signes palpables. Enfin le diagnostic sera encore éclairé, dans ce cas, par la présence des symptômes caractéristiques de cette névrose.

D'autres fois il se développe dans l'hypocondrie un dégagement de gaz si considérable, que le ventre est comme ballonné et distendu : ce

symptôme, qui dénote une extrême débilité ou un mode particulier du canal intestinal, et que les Anciens considéraient comme une maladie essentielle, a été regardé, par *Fracassini*, comme une espèce particulière de cette névrose, qu'il désignait sous le nom d'*hypocondrie tympanite;* mais ce symptôme ne pourrait tout au plus constituer qu'une variété ou une complication.

Outre ces variétés, dont on pourrait peut-être augmenter le nombre, mais sans aucun avantage pour la science, il est encore quelques particularités accidentelles ou circonstances de la maladie auxquelles il convient d'accorder un examen particulier.

L'apparition de tumeurs hémorrhoïdales et celle d'un écoulement sanguin qui en résulte, sont deux accidens très-ordinaires dans l'hypocondrie, et auxquels se rattachent plusieurs considérations assez importantes. Les tumeurs hémorrhoïdales soit internes, soit externes, et le flux qui en est la suite, sont le plus souvent exempts d'inconvénient majeur; ils peuvent être le résultat d'une surabondance sanguine générale, ou d'un état pléthorique local; d'autres fois ils dépendent de la constipation ou de la diarrhée qui peuvent également, mais par un mode d'action différent, irriter le tissu cellulaire de cette partie. On les rencontre parfois chez des malades épuisés, et, dans ces cas, ils ne

sont nullement l'annonce d'une crise salutaire; aussi *Haller* a-t-il observé que le flux hémorrhoïdal, chez des sujets très-affaiblis, ajoutait au danger de la maladie.

L'observation suivante, extraite d'*Hoffmann*, vient confirmer l'opinion de ce grand physiologiste.

Un homme âgé de quarante ans, d'un tempérament mélancolique, menait habituellement une vie sédentaire, et se livrait aux travaux du cabinet, qu'il prolongeait jusque dans la nuit. Il tomba dans l'hypocondrie. Le flux hémorrhoïdal, auquel il était sujet depuis l'âge de dix ans, devint plus abondant, et n'apporta aucun soulagement. Une goutte vague vint se joindre à cet état fâcheux. Lorsque les attaques étaient régulières et occupaient les extrémités, tous les symptômes de la vésanie diminuaient.

Nous voyons dans ce cas deux faits dignes de remarque : 1°. le flux hémorrhoïdal, qui n'est d'aucun avantage; 2°. les attaques de goutte qui suspendent l'hypocondrie.

Mais quand l'écoulement hémorrhoïdaire survient chez un malade doué d'un tempérament sanguin, ou dont l'hypocondrie est la suite d'un flux hémorrhoïdal supprimé, c'est un fanal que la nature établit pour guider la marche du praticien, si l'hémorrhagie tarde à s'établir complètement, ou si elle se supprime par la suite. Cet

écoulement, soit qu'il ait déja existé, soit qu'il se déclare pour la première fois, est alors presque toujours favorable aux malades qui ne sont pas réduits à une grande débilité ; aussi cette observation nous a-t-elle été transmise par *Hippocrate*. *Hemorrhoïdes melancholiam et lienis morbum curant;* et a été confirmée par un grand nombre de médecins, *Stahl*, *Alberti*, *Hygmore*, etc. *Galien* avait également observé que le flux hémorrhoïdal était un préservatif contre cette affection nerveuse.

L'apparition des règles, leur suppression, leurs anomalies, leur retour, leur trop grande abondance, influent beaucoup aussi sur les phénomènes propres à cette névrose, ainsi que sur sa terminaison, et doivent singulièrement fixer l'attention du médecin. L'absence des menstrues chez une femme hypocondriaque, mérite, par les mêmes raisons, d'être considérée sous plusieurs rapports, selon qu'elle a été cause ou conséquence de la névrose, ou qu'elle est accidentelle. Lorsque l'aménorrhée a produit celle-ci, la circonstance est moins fâcheuse ; rarement alors, l'hypocondrie se prolonge-t-elle pendant long-temps, quand, de bonne heure, on emploie les moyens recommandés pour rappeler l'hémorrhagie supprimée. Si l'aménorrhée est le résultat des progrès de l'affection nerveuse, de la débilité croissante, elle aggrave l'état des malades, et

peut être en quelque sorte oubliée, parce qu'en combattant la maladie générale, en relevant les forces, on fait ce qu'il y a de plus avantageux et de plus propre à faire reparaître le flux menstruel.

La suppression des règles qui survient spontanément ou accidentellement au milieu d'une hypocondrie simple, et sans être provoquée par une cause physique ou morale, de nature à bouleverser de nouveau l'économie, n'est pas toujours un événement très-défavorable : en cherchant à régulariser une fonction, on parvient quelquefois à réhabiliter les autres, et le retour des mois n'est souvent qu'un premier pas vers le rétablissement de la santé. Les autres hémorrhagies, comme l'épitaxis, l'hémoptysie, l'hématémèse, l'hématurie, etc., doivent également modifier la marche de la maladie, et influer sur le traitement; mais les inductions qu'on en peut déduire, sont d'une moindre importance, et d'ailleurs faciles à saisir.

On voit en outre d'autres maladies suspendre, ou même dissiper entièrement cette vésanie. *Réveillon*, qui fut hypocondriaque au suprême degré, rapporte que, pendant le cours d'une fièvre quotidienne qui lui dura six mois, il ne ressentit aucun symptôme de son hypocondrie; celle-ci reparut quinze jours après la terminaison de la fièvre intermitente.

Lorsqu'une maladie incidente quelconque a

suspendu les symptômes nerveux, ceux-ci se reproduisent quelquefois à l'improviste. Une jeune femme fort vaporeuse éprouve une fièvre bilieuse très-intense ; son hypocondrie paraît suspendue. Vers le quatorzième jour, au milieu d'un redoublement, il survient des symptômes, résultat de l'exaltation habituelle. Un médecin, témoin de cet orage, en fut effrayé, et fit partager aux parens l'inquiétude qu'il éprouvait. On réunit une consultation, et il fut reconnu que ce nouveau désordre dépendait, non d'une forte affection cérébrale, mais d'une sensibilité exquise qui avait développé, au milieu d'une pyrexie aïguë, des accidens nerveux qui furent bientôt diminués; et notre malade, plus heureuse que *Réveillon*, fut dès-lors presque entièrement guérie. Dans une autre circonstance, une fièvre intermittente pernicieuse a paru suspendre les phénomènes de l'hypocondrie.

Quand un organe prédominant, ou plus encore, un système entier est frappé, l'économie en général paraît bien moins susceptible des impressions étrangères ; c'est ainsi que les hypocondriaques sont rarement exposés aux affections épidémiques ou contagieuses; cette remarque a été faite par un grand nombre d'auteurs, et spécialement par *Reil. Hypocondriaci à morbis contagiosis et epidemicis rarius corripiuntur; nervi, ad spasmos efficiendos activi, sensu pro contagio*

carent; si quondam inficiuntur, hypocondria cessat. Reil. Heureuse prérogative : il semble que la nature, juste dispensatrice des plaisirs et des peines, des jouissances et des regrets, ait voulu les consoler de leurs maux par cette inaptitude à beaucoup d'autres maladies. Enfin pourrait-on appliquer à ces malades ce qu'a dit *Hippocrate : Qui acidum eructant ad peripneumoniam non sunt prædispositi.*

Pendant la grossesse, les accidens de l'hypocondrie sont quelquefois suspendus, ce qu'on peut attribuer, ou à l'activité particulière dont jouit alors l'utérus qui devient un centre d'action, ou à l'influence qu'exerce cet événement sur l'esprit de la malade : en effet, la femme n'est plus alors constamment occupée de ses retours sur elle-même, qui favorisaient son état maladif; elle se livre à d'autres pensées, elle vit dès-lors, moins pour elle que pour son enfant; elle se prépare de bonne heure aux soins qu'elle lui devra, et qui formeront sa plus grande comme sa plus douce occupation. On conçoit ainsi facilement par quel mécanisme ou par quelle heureuse diversion la grossesse peut dissiper, au moins pour quelque temps, tous les phénomènes de cette affection. Nous citerons à ce sujet l'exemple d'une dame qui, pendant deux gestations consécutives, a été exempte de tout signe hypocondriaque.

Ces vésanies présentent souvent une multitude de symptômes incohérens, de phénomènes inextricables; tantôt elles sont simples, et simulent néanmoins une foule d'autres maladies, tantôt elles sont réellement compliquées par une ou plusieurs affections, et cet état complexe peut paraître simple, vu la prédominance du désordre nerveux. Mais comme il est rare qu'un grand nombre de lésions organiques coexistent ensemble, ou se prolongent longtemps, lorsqu'il se rencontre simultanément chez un hypocondriaque beaucoup d'accidens divers et propres à faire soupçonner la réunion simultanée de plusieurs désorganisations dans nos viscères, cette multitude de symptômes est, en quelque sorte, un motif qui doit les faire attribuer à la présence d'une névrose, plutôt qu'à une altération profonde ou à la concomitance de plusieurs complications. Il importe donc d'être familiarisé avec les phénomènes et les nombreuses anomalies de la nature, afin de ne pas prendre le change dans le diagnostic et le traitement des diverses maladies.

A l'aspect de tant de symptômes si variés et rendus quelquefois si confus par la coexistence de ceux qui appartiennent à d'autres affections, on ne peut méconnaître le besoin de recourir a une méthode analytique : c'est donc un grand service qu'a rendu à la science le professeur cé-

lèbre qui, le premier en France, a appliqué avec tant de succès l'analyse à l'étude des maladies.

Nous venons d'examiner l'influence qu'exercent sur la marche de cette névrose certains phénomènes physiologiques ou morbifiques : nous verrons également l'action de quelques médicamens, les diverses conditions de la vie, l'état de l'atmosphère, etc., agir en sens contraire les uns des autres, sur les symptômes de l'hypocondrie. Ainsi tels médicamens produisent chez un malade un soulagement marqué, tandis que, paraissant également bien indiqués, ils ajoutent chez un autre, au malaise. La même substance qui, à une époque, a soulagé, à une époque plus éloignée et dans les mêmes circonstances, du moins en apparence, sera nuisible au même individu ; tandis que le remède, qui naguère a échoué, réussira peut-être plus tard, quoique employé d'une manière identique ; parce que la sensibilité varie, non-seulement suivant les constitutions, mais encore selon les différens états dans lesquels on se trouve ; elle n'existe pas non plus au même degré dans tous nos organes, dans toutes nos parties ; ces effets opposés peuvent en outre dépendre de causes qui, plus ou moins imperceptibles, échappent parfois à l'observation la plus attentive. Bien convaincus des modifications singulières qu'exerce l'action des médica-

mens sur les accidens de cette vésanie, nous avons souvent conseillé de renoncer aux moyens qui semblaient le mieux en rapport avec l'état morbifique, toutes les fois que le malade ou plutôt ses organes les repoussaient.

L'habitude d'une vie active, de l'exercice, une bonne nourriture et l'aisance, l'*aurea mediocritas*, rendent en général la marche de l'affection beaucoup moins rapide, ou la maintiennent quelquefois, pendant un grand nombre d'années, à un degré modéré; plus souvent encore ils en facilitent la guérison; tandis qu'un état sédentaire, un travail de tête continu, forcé ou volontaire, la pénurie, quelquefois un climat ou une habitation insalubres, accélèrent les progrès du mal, et favorisent l'invasion des complications.

Les phases de la lune, le retour des saisons, l'intensité du froid ou de la chaleur, les variations brusques de l'atmosphère, les détonations électriques, l'impression trop prolongée d'un temps humide, le cours orageux des vents, etc., ajoutent presque toujours à l'intensité des accidens nerveux. On connaît l'influence de ces différens états atmosphériques sur la sensibilité des individus tourmentés par des rhumatismes, par la goutte, ou seulement par de simples callosités aux pieds; cette même sympathie s'observe, mais plus constamment encore, chez les personnes en proie

aux affections hypocondriaques. Une température douce, un temps serein, les vents du nord et du nord-est sont en général favorables à ces malades qui sont avertis par l'exaltation générale ou locale de leur sensibilité, des variations atmosphériques avant même qu'elles s'opèrent.

Une autre source, et plus puissante de modifications nombreuses, ce sont les affections morales : considérées comme causes, elles jouent un très-grand rôle dans l'histoire de cette vésanie, mais elles en modifient encore singulièrement la marche, quand elles surviennent dans le cours de l'affection ; si elles plongent de nouveau le malade dans la tristesse ou la douleur, elles aggravent d'autant plus son état fâcheux, que leur action est plus intense ou plus continue, et l'individu qu'elles atteignent plus nerveux. Mais lorsque les affections morales participent de la joie, quand elles sont un sujet puissant de satisfaction solide et durable, elles affaiblissent, suspendent ou dissipent l'hypocondrie. La différence de leur action dépend d'une foule de circonstances de l'ancienneté ou de l'intensité de la vésanie, de la cause plus ou moins amovible qui l'a produite, et enfin de l'énergie et de la durée de l'impression contraire ou favorable qu'elles exercent.

Telles sont, du moins en grande partie, les formes que revêt le plus ordinairement l'hypo-

condrie; ces variétés, ces nuances sont nombreuses, et méritent d'être prises en considération, puisqu'elles influent sur la marche et la durée des accidens, sur le pronostic, sur le choix des moyens thérapeutiques, enfin sur le mode de terminaison de cette névrose.

Nous avons considéré jusqu'ici les causes de l'hypocondrie, sa marche, ses symptômes et ses variétés; il nous reste maintenant à étudier ses diverses terminaisons, ses complications, son diagnostic, son pronostic et son traitement.

CHAPITRE VI.

Terminaisons de l'Hypocondrie.

Les terminaisons de l'hypocondrie sont variées; tantôt cette vésanie finit par le retour à la santé, tantôt elle se juge d'une manière critique, ou se convertit en d'autres maladies qui en sont la crise, et qui se dissipent elles-mêmes immédiatement après; dans quelques cas, cette névrose est remplacée par d'autres affections qui se prolongent plus ou moins, et alors elle disparaît entièrement; en dernier lieu il s'y joint d'autres maladies avec qui elle marche de concert, et c'est ce qu'on nomme les complications, qui feront le sujet du chapitre suivant.

PREMIÈRE SECTION.

Terminaisons favorables, suites du traitement.

Les exemples de guérison due aux efforts de l'art n'ont pas été jusqu'ici aussi multipliés qu'ils auraient pu l'être, et l'on s'en étonne avec raison, quand on considère la nature de cette vésanie toujours compatible, au moins dans le principe ou dans son état de simplicité, avec l'intégrité des tissus organiques. Le défaut de succès dans bien des cas doit être attribué aux erreurs dans le diagnostic de ces maladies, à la négligence ou à l'ignorance de leurs causes, à l'application inconsidérée d'une thérapeutique banale et exclusive, soit les délayans, soit les purgatifs trop long-temps employés avec une aveugle prédilection. Tout porte à croire, ainsi que les médecins qui font aujourd'hui la médecine d'observation en sont convaincus, que l'on comptera désormais un bien plus grand nombre de terminaisons heureuses; et les succès aussi nombreux qu'incontestables obtenus dans le traitement des affections les plus analogues, donnent à notre sentiment un nouveau poids. Ainsi donc, la solution favorable de l'hypocondrie peut être le résultat d'un traitement bien dirigé; c'est un mode de terminaison très-fréquent : mais la guérison ne s'opère ordinairement que d'une manière lente et progressive; toutefois cette vésa-

nie, dans un petit nombre de cas, a été dissipée très-promptement. Je pourrais citer deux dames chez qui l'affection nerveuse était produite par une vie trop sédentaire, etc., et qui toutes deux ont été guéries en moins de huit jours, par un régime approprié, et un genre de vie tout différent. On voit également le retour d'une hémorrhagie, dont la suppression avait déterminé l'hypocondrie, fixer un terme à cette névrose : tous les praticiens ont observé, dans des cas analogues, les bons effets des saignées ou de l'application des sangsues pour rappeler les diverses hémorrhagies. Qui ne sent l'influence d'une vie activement occupée, sur l'homme dont la maladie reconnaît pour principe les contentions d'esprit les plus soutenues !

La guérison participe encore, dans l'observation que nous allons rapporter, de la nature de la cause qui avait produit la névrose hypocondriaque. Un boucher fort aisé, et livré, par suite de son aisance, à une vie peu active, éprouvait la plupart des symptômes de l'hypocondrie ; ses digestions s'exécutaient avec peine et lenteur ; il se plaignait de borborygmes, de tensions ou de gonflemens, et parfois de douleurs vives, tantôt aux hypocondres, tantôt à l'épigastre ; son pouls ne présentait aucune fréquence ; il n'y avait ni soif ni chaleur, et le malade buvait et mangeait comme en parfaite santé. Des spasmes

variés se manifestaient tantôt à la poitrine, tantôt à la tête, où il ressentait des élancemens, des pesanteurs, des étourdissemens, etc. Ces divers accidens augmentaient d'une manière sensible, quand une affection dartreuse, fixée habituellement à la partie supérieure des cuisses, s'affaiblissait ou disparaissait complètement. Conduit par cette observation à soupçonner le transport sur les organes intérieurs du principe dartreux, et à prescrire un régime approprié, j'engageai ce malade à diminuer progressivement la quantité de liqueurs, de vin et de café pur qu'il prenait à son ordinaire, à augmenter d'une manière également graduée, les alimens doux, les légumes herbacés qui devaient remplacer la nourriture plus excitante dont il faisait usage habituellement. En même temps je lui conseillai les sucs d'herbes pendant deux ou trois mois, des bains tièdes de temps à autre, des lavemens émolliens et des demi-lavemens avec huit à dix gouttes de laudanum, pour diminuer l'irritabilité de l'abdomen ; je lui recommandai enfin une vie plus active. Au bout de peu de temps notre hypocondriaque retira un très-grand avantage de ce traitement, et depuis cette époque il jouit d'une fort bonne santé.

Je termine mes citations en ce moment par l'observation suivante, qui me semble encore appuyer l'opinion que j'ai émise : c'est le seul

exemple d'hypocondrie bien caractérisée que j'aie observé à un âge aussi peu avancé. Un jeune homme, âgé de dix-huit ans, vient à Paris pour se livrer à l'étude de la médecine : le regret d'avoir quitté ses parens, le souvenir d'une jeune personne qu'il aimait beaucoup, et qui se maria peu de temps après son départ, enfin les obstacles qu'il rencontra dans ses travaux, renforcèrent chez lui la malheureuse habitude de l'onanisme; il tombe, par suite d'excès journaliers, dans une hypocondrie des plus prononcées : constriction douloureuse vers l'estomac, borborygmes, digestions pénibles, lassitudes spontanées, toux fréquente, expectoration muqueuse, palpitations, teint pâle et jaune, sommeil agité, trouble léger dans les idées, craintes non motivées de maladies diverses, aversion pour la société, tristesse habituelle, impatiences et bizarreries fréquentes.

Dans cette situation déplorable, ce jeune homme réclame mes conseils : j'intéressai son amour-propre, je lui parlai le langage de l'amitié et de la bienveillance; j'eus soin de l'assurer que, pour renoncer à ce funeste penchant, il suffisait de le vouloir fermement; je lui recommandai d'éviter les occasions qui favorisaient cette fatale habitude, et lui indiquai, autant que possible, les moyens de la surmonter.

Les toniques, et surtout le vin de quinquina,

quelques légers calmans, et les conseils moraux dont nous avons fait mention, rendirent bientôt à la société et à une santé parfaite cet individu, qui sentait toute la honte de sa conduite, mais qui, abandonné à lui-même, n'avait pu jusqu'alors rentrer dans la bonne voie.

DEUXIÈME SECTION.

Crises ou Guérisons opérées exclusivement par la nature.

L'hypocondrie se termine quelquefois sans le secours d'aucun médicament, sans l'intervention d'aucune satisfaction morale, sans aucune crise accessible à nos sens; dans d'autres cas, la guérison est également spontanée; mais il existe des phénomènes critiques qui ne sont point en rapport avec les médicamens mis en usage, et qui n'en sont point le résultat immédiat. Ainsi, tantôt ce sont les propriétés vitales qui recouvrent leur type naturel, tantôt c'est un appareil dont les fonctions se rétablissent; d'autres fois c'est un organe qui renaît à l'ordre régulier, un système qui rentre dans son état naturel, après avoir repoussé les obstacles qui entravaient la marche de l'organisation.

Nous allons indiquer ces mouvemens vitaux, connus généralement sous le nom d'*efforts critiques de la nature* (1). Nous verrons, par ce

(1) On appelle *crise* l'effort de la nature qui tend à porter

court exposé, que les crises sont tantôt incomplètes, tantôt complètes, et qu'il faut souvent plusieurs évacuations ou mouvemens de la nature pour opérer une crise complète.

Febris spasmum sovit, a dit *Hippocrate;* et cette sentence, confirmée par l'expérience, est applicable ici, puisqu'on voit l'hypocondrie se dissiper spontanément après un mouvement fébrile, une fièvre aiguë ou intermittente; d'autres fois après une inflammation. Nous allons examiner rapidement ces mouvemens critiques dans les différens systèmes qui les fournissent le plus ordinairement.

Système cutané. C'est un des plus féconds en phénomènes critiques; des sueurs générales ou partielles aux mains, aux aisselles, et surtout aux pieds, ont produit la solution de cette névrose : des éruptions chroniques, des dartres ont amené le même résultat : *Nam sæpè subitò exanthemata, ulcera, etc., oriuntur et eodem momento morbus nervosus præsens cessat.* Reil. Le traité *de Melancholiâ*, par *Lorry*, fait également mention de ce mode de crise. *Sæpè scabies, impetigo,*

---

au-dehors un principe délétère dont la présence gêne l'exercice de nos fonctions : peut-être serait-elle mieux définie : l'augmentation subite des propriétés et fonctions vitales d'un ou plusieurs organes, par suite de laquelle l'organe malade ou le système en général éprouve un changement utile, ou même un retour parfait à l'état de santé.

herpes erumpentes, sanitatem retulêre. LORRY. Au rapport de *Boërhaave*, un malade fut guéri de son affection nerveuse par l'apparition spontanée d'une gale humide.

La convalescence d'un de mes malades fut précédée par l'éruption d'une grande quantité de petits boutons, qui se manifestèrent sur plusieurs points de la surface du corps.

Système cellulaire. Le tissu cellulaire peut également être le siége d'accidens salutaires : il s'y forme en effet des clous, des furoncles, des phlegmons, des abcès qui exercent sur certaines affections nerveuses une influence très-favorable. Le docteur *Heim* a vu l'hypocondrie et la dyspepsie disparaître très-promptement après l'éruption de plusieurs furoncles : *Attulit sæpè curationem superveniens scabies fœda aut varix numerosa, ingens, enata, valdè tumentium fluxus hæmorrhoïdum atrabilis per superiora et inferiora rejectio.* VAN-SWIETEN.

M. W**, sujet depuis long-temps à une hypocondrie des plus fâcheuses, ne commença à éprouver d'amélioration sensible qu'après l'explosion d'un grand nombre de furoncles qui survinrent particulièrement vers le dos.

Système glanduleux. Il peut également s'établir dans les glandes des engorgemens critiques, des sécrétions ou des efforts salutaires; quelquefois cependant le mouvement de la nature n'est

pas assez prononcé, et n'amène qu'une crise incomplète, comme nous l'avons déjà dit.

Un citoyen distingué, tourmenté par une hypocondrie grave, rendit pendant plusieurs jours une urine noire comme de l'encre, et en fut soulagé. Après plusieurs mois l'urine revenait avec la même couleur, et produisait le même soulagement. (*Dol. ann.* VIII, *p.* 144, *Éphém. des Cur.*)

On a prétendu qu'une sécrétion abondante de larmes avait fourni la crise dans des cas de vésanie hypocondriaque : je n'ai point observé ce phénomène, mais je conçois qu'une affection morale puisse émouvoir vivement la sensibilité d'un malade, exciter ses pleurs, et ramener la santé en dissipant l'état physique et moral qui constituait la névrose. Les glandes salivaires sont aussi très-aptes à fournir des écoulemens critiques.

Système fibreux. Si l'on range la goutte dans les affections du système fibreux, qu'elle semble affecter par une sorte de prédilection, nous rappellerons que son apparition fixe souvent le terme de cette névrose; mais dans ce cas, il y a plutôt conversion de maladie qu'une crise véritable, à moins que l'accès de goutte ne soit unique : *Sub schemate hypocondriasis cum materiâ seu melancholiæ imò et maniæ, nam hæc ægritudines subortâ arthritide curantur, nec est infrequens*

futuros arthriticos fieri priùs hypocondriacos cum vel sine materiâ, vel hæmorrhoïdarios qui morbi subortâ podagrâ regulari disparent. STOLL.

Un homme âgé de trente-deux ans était sujet, depuis deux ans, à une hypocondrie dont il fut tout à coup délivré par une attaque de goutte. Dans ce cas, la névrose a-t-elle été guérie par une irritation plus vive qui a fait cesser une irritation plus faible, ou bien la goutte qui, errante sur les organes abdominaux, déterminait les accidens de l'hypocondrie, a-t-elle fait cesser le désordre en occupant un autre siége? L'une et l'autre opinion est admissible, mais on ne peut en adopter aucune de préférence, faute de renseignemens plus détaillés.

Système muqueux. Le système muqueux est celui dont les sécrétions opèrent le plus grand nombre de crises; il fournit les sécrétions nasale, buccale, gastrique, intestinale, vaginale, etc.; ce sont surtout les diarrhées qui amènent fréquemment la guérison de ces vésanies; la leucorrhée et les écoulemens de l'urèthre n'ont produit que bien rarement un résultat analogue; cependant un de mes cliens ne s'est jamais mieux porté que pendant la durée d'un catarrhe de l'urèthre, qui fit cesser tout symptôme hypocondriaque.

Kæmpf, ayant vu des obstructions terminées par des flux de ventre, employait des lavemens

composés pour obtenir des crises analogues. C'est cette observation de la marche, suivie par la nature, qui justifie et autorise l'emploi raisonné des purgatifs, dont on fit jadis un abus monstrueux.

Système sanguin. Sans adopter aveuglément l'opinion des stahliens, nous reconnaîtrons cependant avec eux tout le bénéfice que l'économie retire dans une foule de maladies et de névroses, des hémorrhagies naturelles ou accidentelles, du retour spontané des règles, des saignemens du nez, et surtout du flux hémorrhoïdal; mais ces hémorrhagies ne sont pas toujours phénomènes critiques, et ne forment chez quelques malades qu'un symptôme particulier de la maladie, comme on l'observe dans quelques cas d'hypocondrie, d'engorgement, ou même d'altération du foie et de la rate; plus rarement encore l'hémopthysie, l'hématémèse et l'hématurie constituent-ils des crises complètes ou même incomplètes.

Outre ces différens systèmes, plusieurs de nos organes peuvent fournir les mêmes résultats : ainsi l'estomac, par des vomissemens copieux; le foie, en sécrétant une grande quantité de bile; enfin le poumon, par une expectoration des plus abondantes : *Hipocondriacis accedentes vomitus, tam cruenti quam non cruenti, sæpè salutares existunt, modò non sint nimii, nec diuturni; commodus et utilis est vomitus ubi pituitæ bilis per-*

mixta est flava exquisitè, iisque nec valdè crassus est, nec admodùm copiosus. In viris ex hemorrhoïdibus interceptis, hypocondriacis redditis notavimus indemnes cruentos vomitus periodicos et vertiginem junctam gravem stomachicam dixero sic simul depulsam. KLEIN (1).

Il est encore un autre mode de guérison, et qui de tous est le plus fréquent, c'est celui où la cure de l'hypocondrie est le résultat des mouvemens de la nature secondés par les efforts de l'art; mais il rentre également dans les deux sections précédentes. Souvent aussi un sujet de satisfaction, la fin d'une grande peine, dissipent entièrement cette névrose.

TROISIÈME SECTION.

Terminaisons de l'Hypocondrie par d'autres maladies.

Les maladies qui terminent le plus ordinairement l'hypocondrie, sont les affections des organes abdominaux, leurs phlegmasies aiguës, et surtout chroniques; la dégénérescence de leur tissu, la phthisie pulmonaire, les anévrismes du cœur.

Nous ne chercherons point à démontrer longuement l'influence de cette névrose sur le dé-

(1) On voit, d'après ces conditions du vomissement critique, que celui-ci diffère du vomissement symptôme de l'hypocondrie ou du squirrhe de l'estomac.

veloppement de ces diverses affections; nous avons déja fait sentir combien l'exaltation permanente de la sensibilité des viscères de l'abdomen, favorise leur inflammation et la lésion de leur tissu; combien les palpitations fréquentes du cœur exposent un organe aussi important, combien enfin les spasmes nerveux et le trouble de la circulation portent atteinte à l'organisation si délicate des poumons; nous ne pourrions d'ailleurs indiquer ici les terminaisons de ces diverses maladies, sans aborder le sujet des complications, et sans tomber, en traitant de ces dernières, dans des répétitions fastidieuses; aussi préférons-nous exposer l'histoire des terminaisons de l'hypocondrie associée à d'autres maladies, lorsque nous tracerons celle de ses complications. Il nous paraît suffisant d'énoncer ici les signes généraux qui font appréhender la terminaison de cette névrose par d'autres maladies; ce sont les symptômes propres à une affection, à une lésion le plus souvent locale; ce sont leur immobilité, leur constance, leur continuité, et leur développement progressif; c'est ordinairement le trouble, tôt ou tard prédominant, d'une fonction importante; par exemple, la perte de l'appétit et la difficulté croissante des digestions, une diarrhée ou une constipation permanente, quand surtout celle-ci n'est pas habituelle ou constitutionnelle; c'est encore l'altération de la physio-

nomie ; enfin c'est un mouvement fébrile continu ou avec des intermissions, et accompagné de sécheresse à la langue, de chaleur, et surtout de soif. Nous reviendrons sur cet objet en traitant des complications, et plus encore en exposant l'histoire du diagnostic.

CHAPITRE VII.

Complications de l'Hypocondrie.

On appelle complication, la réunion simultanée de plusieurs maladies : quelquefois celles-ci se déclarent en même temps, ou à peu de distance les unes des autres ; dans d'autres cas, il existe une affection première à laquelle il s'en joint, au bout d'un temps plus ou moins long, une seconde et quelquefois une troisième, etc.; tantôt celle-ci se manifeste spontanément, tantôt elle n'est que favorisée par le désordre primitif, assez souvent elle en est une conséquence directe.

Ces distinctions sont peu importantes : celles relatives à la nature ou au danger que présente la maladie qui forme la complication, sont d'un plus grand intérêt. En exposant les affections qui aggravent le plus ordinairement la marche de l'hypocondrie, nous indiquerons, en général, l'influence qu'elles peuvent exercer ou le degré du péril dont elles menacent le malade.

Il ne faut pas conclure du grand nombre de complications qui vont être rapportées, que l'hypocondrie s'observe presque toujours réunie avec d'autres affections ; il est au contraire très-certain que le plus souvent on la rencontre simple et parfaitement isolée ; d'ailleurs, plusieurs de ces complications sont extrêmement rares ; on doit en outre, considérer qu'elles peuvent également, pour la plupart, surprendre l'homme au milieu de la santé la plus florissante ; enfin, parmi ces maladies, il en est dont les rapports avec l'affection hypocondriaque sont très-peu directs, et qui coïncident avec celle-ci, en raison du grand nombre d'individus qui en sont atteints, ou de la longue durée dont elle-même est souvent susceptible.

Un de ces malades fut pris de douleurs vives dans la cuisse droite : elles allèrent en augmentant, et l'on reconnut bientôt un rhumatisme de toute la cuisse avec périostose considérable du grand trochanter et du tiers supérieur du fémur : la maladie fut long-temps rebelle et ne céda qu'aux sudorifiques les plus rapprochés.

Au milieu de son hypocondrie, un homme éprouve une attaque d'apoplexie, qui fut combattue de suite et traitée avec succès. Il est bien évident que ces deux complications n'ont aucun rapport direct avec l'affection hypocondriaque.

Les circonstances qui donnent naissance chez

les hypocondriaques aux complications, sont, en général, toutes les causes des maladies, mais nous indiquerons, comme agissant dans ce cas d'une manière spéciale, d'abord, les affections pénibles de l'âme; en second lieu, l'abus des purgatifs, des fortifians ou des toniques spiritueux, puis les excès dans le régime, enfin le dérangement de nos sécrétions, des hémorrhagies habituelles ou accidentelles. Nous pourrions présenter ici les signes primordiaux de chacune des maladies qui compliquent le plus ordinairement cette névrose, mais nous aimons mieux faire connaître ces complications par des histoires particulières, qui nous semblent plus propres à frapper l'attention, devant surtout rappeler leurs différens symptômes en traitant du diagnostic; nous nous bornons à annoncer en ce moment, d'une manière sommaire, qu'à mesure qu'il s'établit une autre affection, et particulièrement une lésion organique, on doit, avec une observation attentive, d'une part, voir augmenter les signes locaux de celle-ci, et de l'autre, diminuer progressivement les phénomènes sympathiques de l'hypocondrie, qui, de toutes nos maladies, est la plus féconde en résultats sympathiques.

Parmi les affections qui viennent aggraver l'hypocondrie, on remarque quelquefois l'hystérie et la mélancolie, plus rarement les aliénations,

mais souvent la phthisie, et surtout les phlegmasies chroniques abdominales, et la dégénérescence des tissus organiques de l'abdomen : nous nous contenterons d'indiquer quelques-unes de ces complications, et d'en offrir les caractères principaux; car, pour en traiter l'histoire à fond, il faudrait consacrer à cet objet seulement un espace très-considérable.

Ce sont ces dernières complications que beaucoup de médecins, et spécialement *Van-Swieten*, ont désignées sous le titre de *mélancolie avec matière*. Ce qui précède me dispense de faire ressortir la double erreur de *Van-Swieten* dans l'abus du mot mélancolie pour hypocondrie, et dans l'idée que celle-ci peut être due à des lésions d'organes, tandis qu'elle n'est essentiellement qu'une maladie nerveuse, et une maladie nerveuse tout-à-fait différente de la mélancolie : cette dénomination inexacte peut, en outre, faire confondre la mélancolie avec les complications de l'hypocondrie, *et vice versâ*.

Nous allons donc exposer d'abord les autres névroses ou vésanies qui sont une conséquence assez ordinaire de l'hypocondrie, et qui s'en rapprochent par leur nature, tandis qu'elles en diffèrent par leur siége; nous ferons ensuite succéder un court exposé des phlegmasies lentes et des lésions organiques qui atteignent les viscères abdominaux, et qui dépendent fréquemment des

névroses digestives. Ces lésions ont un siége commun avec l'hypocondrie, mais leur nature est toute différente; aussi forment-elles une classe séparée. Enfin, nous terminerons l'article des complications, en exposant quelques-unes des maladies qui n'émanent ni directement ni indirectement de l'affection hypocondriaque, et dont la concomitance est le résultat de leur extrême fréquence.

PREMIÈRE SECTION.

Complications de l'Hypocondrie avec les Névroses et Vésanies.

Nous avons rapporté, pages 23 et 102, des exemples d'hystérie compliquée d'hypocondrie; aussi renvoyons-nous à ces histoires particulières pour les complications de l'hypocondrie avec l'hystérie.

L'observation suivante, relative à une demoiselle pour laquelle nous avons été consulté, nous offre une sorte de complication triple de l'hypocondrie avec l'hystérie et la mélancolie.

Une demoiselle, âgée de vingt-neuf ans, d'une faible constitution et d'une santé languissante, n'ayant jamais été réglée, fut sujette à une leucorrhée dont le cours a souvent été dérangé et qui s'est totalement supprimée depuis un an. Dès son enfance, elle a montré un caractère décidé, une imagination vive, une susceptibilité

extrême; au point que tout ce qui se passait dans sa famille, ce qui même lui était étranger, l'affectait fortement. On remarque bientôt chez elle un mélange de peines et d'inquiétudes continuelles : elle se persuade un jour que son père n'a plus pour elle la même tendresse, et manifeste tout à coup le désir et l'impatience de voir sa mère qui était absente. En même temps, ses digestions deviennent difficiles, elle se plaint de malaise à l'estomac, de vents, de gonflemens dans les hypocondres, de palpitations, d'une céphalalgie habituelle et plus ou moins forte, d'insomnie, de rêves pénibles. Elle témoigne beaucoup d'empressement aux personnes qui veulent s'entretenir de son état, et repousse avec humeur toute autre conversation.

Elle éprouve aussi des spasmes convulsifs, des resserremens à la gorge, des cloux ou douleurs locales, souvent elle pleure sans motifs; d'autres fois elle est prise de convulsions générales avec perte incomplète de connaissance.

Le retour de sa mère ne la calme pas; elle devient au contraire plus agitée, plus emportée, s'irritant de tout, menaçant, à la moindre contrariété, de se détruire; bientôt, désespoir encore plus prononcé, dégoût de la vie, penchant au suicide, suivi de tentatives.

On eut recours successivement à l'application des sangsues à la vulve, aux pédiluves, aux

bains tièdes. On prescrivit intérieurement les boissons délayantes, la liqueur minérale d'*Hoffmann*, l'opium, les purgatifs; on insista en outre sur l'exercice, sur les moyens de diversion et sur les consolations de l'amitié. Au bout de sept à huit mois, cette demoiselle éprouva un mieux sensible qui, avec le temps, a fait encore de nouveaux progrès.

Le premier paragraphe nous paraît offrir les symptômes de l'hypocondrie; dans le deuxième, on trouve ceux qui appartiennent à l'hystérie, et le troisième enfin, nous représente les phénomènes particuliers de la mélancolie avec penchant au suicide.

Nous trouvons dans l'observation qui suit, un exemple d'hypocondrie compliquée avec une mélancolie bien prononcée, mais peu grave.

Un jurisconsulte très-distingué, âgé de cinquante-deux ans, doué d'une bonne constitution et d'un caractère aimable, éprouve depuis long-temps du trouble dans sa santé : ses digestions sont lentes et pénibles, et surtout facilement dérangées par le moindre écart dans son régime ordinaire; il se plaint de flatuosités, de borborygmes, et d'alternatives de constipation ou de diarrhée. A diverses époques il a ressenti des spasmes vers la poitrine, de l'oppression et des palpitations : les variations atmosphériques et le vent nord-est spécialement exercent sur lui

une influence remarquable : il parle de sa santé avec un plaisir spécial et une exaltation constante ; à l'en croire, personne n'a des nerfs aussi délicats, aussi susceptibles ; mais si vous parvenez à détourner son attention, ou s'il s'engage dans une conversation étrangère à sa maladie, il montre un jugement des plus sûrs, un tact des plus fins, et un esprit très-orné.

Une singularité non moins extraordinaire, c'est la crainte de se trouver mal, qui le poursuit constamment dans certaines circonstances, crainte qu'il sait n'être pas fondée, puisque jamais il n'est tombé en syncope, mais que sa raison et sa volonté ne peuvent surmonter. Ainsi, au palais, dès qu'il porte la parole, il est aussitôt saisi par la crainte d'une lipothymie qui appellerait sur lui, d'une manière désagréable, l'attention du public. Au spectacle, dans une loge, et sur le dernier rang, il n'éprouve aucune inquiétude, parce qu'il peut sortir librement ; mais à l'orchestre, au milieu d'un grand nombre de spectateurs, de même, dans une assemblée publique, il a toujours cette frayeur panique, et qu'il reconnaît comme telle sans pouvoir la dompter ; sa crainte est d'autant plus forte, qu'il voit plus d'obstacles pour se soustraire à l'attention de la société, s'il venait à se trouver mal. Jadis toutes les sensations un peu vives se faisaient sentir à l'épigastre ; maintenant elles se rapportent à la tête.

Nous avons conseillé à ce légiste une vie active, un régime tonique bien réglé, et une certaine contention d'esprit, dont il sent également la nécessité, et nous avons ainsi contribué à diminuer sensiblement le désordre physique et moral; maintenant sa santé est habituellement très-bonne.

En parcourant la vie de *Zimmermann*, nous verrons une hypocondrie grave qui, par la suite, s'est compliquée avec une mélancolie, dont la terminaison a été funeste.

Zimmermann naquit à Brug, d'une famille distinguée depuis plusieurs siècles par l'estime la mieux méritée. A la fin de ses études, il se trouve livré à lui-même par la mort de ses parens; isolement pénible, surtout pour l'homme qui joignait à une imagination vive une sensibilité extrême. Dès-lors, celui qui ne vivait que pour les siens, se consacre de son propre mouvement à l'art dont le but est la santé des hommes. Il eut pour maître, ou plutôt pour ami, le célèbre *Haller;* ce rapprochement garantissait déjà l'éclat futur du nom de *Zimmermann.* A vingt-deux ans il écrit à M. *Tissot: Je mène dans ce pays la vie d'un homme qui voudrait vivre après sa mort.* Mais ces travaux trop prolongés altérèrent bientôt sa faible constitution; et il éprouve alors une première atteinte d'hypocondrie. Nous verrons *Zimmermann*, de plus en plus affecté dans son

existence physique, payer bien cher une célébrité précoce.

Une de ses lettres à son ami nous fournit une nouvelle preuve de sa disposition constante à cette vésanie. *J'aime la solitude,* lui marquait-il, *et je ne trouve de plaisir que chez moi ; j'écris pour me procurer un amusement.*

Dès-lors un séjour plus tranquille, isolé de toute société, vint accroître cet amour de la retraite et de l'étude, dont il faisait ses délices. Sa vive sensibilité fut bientôt mise en jeu par diverses contrariétés, et les symptômes d'hypocondrie s'exaspérèrent ; il éprouvait entre autres phénomènes, un trouble marqué dans les fonctions digestives, des alternatives de tristesse et de gaîté passagères, et la nuit des songes inquiétans.

Dans son *Traité de l'Expérience*, il lui est échappé quelques plaisanteries qui semblent s'être introduites sous les auspices d'une excessive gaîté ; *c'est,* dit M. Tissot, *le bout de l'oreille d'un hypocondriaque qui laisse apercevoir ses momens d'inégalité ;* bientôt léger soulagement, fruit de ses voyages et de la guérison d'une hernie compliquée, dont *Mekel* l'opéra ; mais un excès de travail le jette de nouveau dans l'hypocondrie. Un projet d'écrire sur cette maladie, à laquelle il eût pu fournir de son propre fonds, fut aussitôt abandonné que conçu, et son ouvrage sur la soli-

tude, auquel il travaillait depuis long-temps, le ramenait sans cesse à des idées mélancoliques.

Si personne ne fut plus que lui en butte aux basses intrigues de la jalousie, personne n'en fut mieux vengé par la haute considération qu'il mérita, et qui le fit appeler successivement par Léopold II, le roi d'Angleterre, Catherine II et le grand Frédéric.

En 1794, des chagrins, nés de la révolution française, et l'invasion qui menaçait son pays, vinrent augmenter l'amertume de son existence, qu'il dépeint dans ces mots à son ami : *Je cours risque de devenir encore cette année un pauvre émigré, forcé d'abandonner sa maison, avec la chère compagne de sa vie, sans savoir où donner de la tête, où trouver un lit pour y mourir.....*

A ce trouble moral succède le désordre physique le plus prononcé : bientôt insomnies fréquentes, illusions d'optique, apparition de fantômes pendant la nuit ; dégoût, perte d'appétit, des forces et de l'embonpoint ; perversion des fonctions de l'estomac, dépérissement gradué, tremblemens, étourdissemens exaspérés, surtout par l'usage du café ; syncopes après le moindre exercice, versalité morale et défaut de confiance pour les conseils qu'il réclamait à chaque instant, confusion légère et fugace dans les idées, terreurs paniques et pusillanimité qui contrastait avec le caractère mâle de *Zimmermann*. Au milieu de ces

phénomènes nombreux dûs à l'hypocondrie, on retrouve de bonne heure une propension à la mélancolie dans cet amour extrême de la solitude; propension exaltée ensuite, et prenant le caractère d'un délire exclusif, *la crainte continuelle de voir l'ennemi entrer chez lui et dévaster sa maison.* Tourmenté de plus en plus par divers chagrins, et réduit, par suite de cette hypocondrie mélancolique, à un état de marasme, cet illustre médecin termina sa carrière en 1795.

On trouve dans une très-bonne dissertation sur la mélancolie, par le docteur *Charpentier*, des exemples d'hypocondrie mélancolique; et le *Traité de la Manie*, par le professeur *Pinel*, nous offre également la mélancolie et même la manie compliquant les névroses hypocondriaques (1).

En examinant la réunion fréquente de la mélancolie et des aliénations avec l'hypocondrie, on est facilement convaincu qu'il existe une sorte d'affinité entre ces diverses vésanies; toutefois nous ferons remarquer que quand une aliénation telle que la manie, la démence ou l'idiotisme, compliquent l'hypocondrie; celle-ci semble totalement dissipée ou tellement affaiblie, qu'on aurait souvent beaucoup de peine à en apercevoir les traces ou les phénomènes; au contraire, dans

(1) *Voyez* Traité de la Manie, p. 54.

les cas de complication d'hypocondrie et de mélancolie, les symptômes propres à l'une et l'autre affection sont ordinairement distincts, et rendent ainsi toute méprise très-difficile. La même considération peut aussi s'appliquer aux lésions de la mémoire ou amnésies (1).

Manget a consigné dans ses œuvres l'observation d'un homme âgé de soixante-quatre ans, qui, au milieu d'une hypocondrie invétérée, ressentit, deux années de suite, à une certaine époque, une perte de mémoire telle, que pendant plusieurs jours il ne se rappelait ni son nom, ni ce qu'on lui avait dit, ni ce qu'il voulait écrire, etc. *Manget* penche à croire que cette lésion de la mémoire dépendait de l'hypocondrie; mais comme un pareil symptôme est fort rare dans cette névrose, je serais porté à le considérer plutôt comme une complication accidentelle.

Une autre observation, rapportée par le même auteur, nous offre le tableau d'une hypocondrie des plus graves, avec altération des facultés intellectuelles, et surtout de la mémoire, que le malade recouvrait vers le soir; alors seulement il pouvait lire et écrire, car jusque-là il avait oublié tous les caractères. Cette amnésie fut de

---

(1) Voyez, pour ces maladies, dont l'histoire est si peu avancée, la dissertation que nous avons insérée dans les Mémoires de la Société de Médecine de Paris. (*Paris*, 1816.)

peu de durée; mais elle me semble également pouvoir constituer une complication par son retour régulier, son intensité, etc.

Cette névrose peut coexister avec l'épilepsie, ou celle-ci se joindre à la première, sans que l'une ou l'autre de ces deux circonstances puisse constater une espèce particulière d'hypocondrie ou d'épilepsie; on doit considérer cette réunion comme une complication. Mais l'histoire d'un épileptique chez qui l'on rencontre deux ou trois symptômes nerveux, et qui n'offre d'ailleurs aucun des signes primordiaux propres à l'hypocondrie, ne peut caractériser cette complication. Un de nos confrères, dans une dissertation, très-bien faite d'ailleurs, sur l'épilepsie, a désigné sous le titre d'*épilepsie hypocondriaque ou vaporeuse*, l'observation suivante, qui pour nous n'est ni une complication ni une espèce particulière.

« Jacques-Joseph S**, âgé de soixante-quatre ans, d'une mobilité peu ordinaire à cet âge, né à Paris de parens sains, fut bien portant jusqu'à l'âge de dix ans, qu'effrayé par son frère, qui s'était caché pour lui faire peur, il eut un accès épileptique. Huit à dix jours après, nouvel accès; ensuite accès tous les deux ou trois mois, et même plus rarement.

» A dix-huit ans, se trouvant en route pendant un orage, il vit le tonnerre tuer une personne non loin de lui, ce qui lui causa beaucoup de

frayeur. Arrivé chez lui, il raconte à ses parens l'événement dont il a été temoin, et se sentant fatigué, il se déshabille pour se mettre au lit; mais en ôtant son habit, il en trouve les deux pans de derrière enlevés. L'odeur de soufre et la trace de la brûlure lui découvrent la cause de cet accident; il frémit du danger qu'il a couru et éprouve sur le champ un accès d'épilepsie. Le lendemain, ictère universel, et dès-lors, accès tous les trois ou quatre jours jusqu'à dix-neuf ans. Dans cet intervalle, il fut électrisé par *Comus*, quinze jours de suite, sans succès.

» A dix-neuf ans, les accès s'éloignèrent; à vingt ans ils ne revenaient plus que tous les quinze jours ou trois semaines; à vingt-sept ans ils étaient plus éloignés encore, mais un mouvement de colère, un excès de vin, les rappelait constamment.

» A vingt-huit ans, les accès cessèrent; à trente et un ans, il se maria, eut sept enfans de sa femme avec laquelle il vécut onze ans. Dans cet intervalle, il se souvient cependant d'avoir eu deux accès, l'un à la suite d'une peur, l'autre dans un mouvement de colère (1); mais il n'en eut

(1) Ce malade a éprouvé beaucoup moins d'accès pendant les onze années de son mariage : est-ce à cette dernière circonstance qu'il faut attribuer la suspension des accidens? J'en doute, puisqu'ils avaient cessé trois ans avant cette époque, et qu'ils ont encore diminué sensiblement depuis cinq ans,

aucun jusqu'en 1793, qu'affaibli par la disette, la mauvaise nourriture, accablé d'inquiétudes et de peines relatives à tout ce qui se passait à cette époque, il eut de nouveaux accès revenant tous les deux jours : il était alors âgé de cinquante-quatre ans.

» Jusqu'à cinquante-sept ans ils suivirent la même marche ; alors Jacques-Joseph entra à Bicêtre, où il a toujours demeuré depuis ce temps. Ses accès, très-fréquens les deux premières années, ont toujours été en s'éloignant depuis. Il y a maintenant près d'un an qu'il n'en a eu.

» Dans les premiers temps de l'invasion de son épilepsie, il ne sentait pas venir l'accès. A vingt ans, celui-ci s'annonçait quelques secondes d'avance, par le sentiment d'une boule qui, montant et descendant dans l'abdomen, se fixait au cœur. Alors, perte de connaissance, chute, cris, pleurs, agitation de tout le corps, et par intervalles, mouvemens convulsifs si violens, que trois personnes pouvaient à peine le retenir ; point d'écume à la bouche. Après l'accès qui durait depuis quinze jusqu'à vingt-cinq minutes, le malade se sentait très-fatigué, sans toutefois être obligé de garder le lit.

---

postérieurement à son veuvage ; dans tous les cas, le fait fût-il démontré, il ne constituerait à nos yeux qu'une exception à l'opinion que nous avons émise, page 133.

» Depuis le retour de l'épilepsie, en 1793, les signes précurseurs de l'accès sont encore plus marqués. Cinq à six jours d'avance, il éprouve une palpitation incommode que remplacent, au moment de l'accès, le sentiment de la boule et le reste des symptômes décrits ci-dessus. Après chaque accès, le malade se sent une grande disposition à se mettre en colère. Comme il y à un an qu'il n'a eu d'accès, il est probable qu'il guérira de cette deuxième rechute, surtout en éloignant avec soin les causes occasionnelles qui ont toujours rappelé l'épilepsie ». (MAISONNEUVE.)

Nous ne voyons, comme nous l'avons annoncé déjà, dans cette observation, qu'une épilepsie bien constatée, mais simple : ce n'est, à notre avis, ni une espèce particulière d'épilepsie, ni une complication de celle-ci avec l'hypocondrie, car quelques symptômes éphémères, et encore moins un symptôme unique, ne peuvent, suivant nous, faire admettre cette complication.

DEUXIÈME SECTION.

Complications de l'Hypocondrie avec les affections ou lésions des organes abdominaux.

Nous avons dit qu'un état habituel d'irritation du système nerveux de l'estomac ou des intestins, etc., déterminait peut-être constamment l'hypocondrie ; nous ajouterons que les phlegmasies aiguës ou chroniques peuvent se joindre

d'autant plus facilement à l'hypocondrie, que la sensibilité exaltée des viscères qui président ou coopèrent à la digestion, est une circonstance très-favorable à leur inflammation, et qu'elle peut même, dans quelques cas, constituer un premier degré de cette dernière maladie.

Le nombre et la durée des affections hypocondriaques nous expliquent la fréquence de leur réunion avec les phlegmasies chroniques qui sont elles-mêmes très-nombreuses : remarquons, en outre, que l'identité de siége peut encore favoriser la complication de ces diverses maladies. A mesure que les symptômes de l'affection locale se dessinent, les phénomènes dépendans de la névrose s'affaiblissent ordinairement, et tôt ou tard les premiers deviennent prédominans, au point qu'alors l'hypocondrie peut être masquée presque entièrement.

L'observation suivante nous offre plusieurs traits de la complication de l'hypocondrie avec une phlegmasie gastro-intestinale, d'abord aiguë, puis chronique.

Un artiste, doué d'une sensibilité très-exquise et d'un talent distingué, aimait la littérature avec passion et s'adonnait à l'étude de l'art dramatique avec le plus grand zèle. Né de parens sains, et qui ont prolongé leur carrière fort loin, il parvint jusqu'à l'âge de quarante ans sans avoir ressenti aucune atteinte notable dans sa santé; mais depuis

lors, son estomac n'exécuta plus ses fonctions avec la même régularité ; les digestions devinrent difficiles ; le malade était souvent fatigué par des vents, des nausées et quelquefois par des vomissemens alimentaires qui se calmaient promptement à l'aide d'un régime un peu plus sévère. Il se plaignait fréquemment de palpitations, d'étourdissemens, de bourdonnemens d'oreilles, de frayeurs paniques, de bruits violens et singuliers qu'il entendait la nuit et qui troublaient son sommeil. Sa susceptibilité était en général très-prononcée.

Des affections morales fort pénibles vinrent aggraver cet état nerveux auquel le malade s'efforça inutilement de remédier par l'usage de l'eau-de-vie et du thé. Son caractère mélancolique se prononça de plus en plus ; et tout discours, toute description, propres à faire connaître sa situation, étaient remarquables par son exagération, et par l'inquiétude dont il était empreint. Ce fut dans ces circonstances qu'un nouveau désordre se prononça ; la langue devint muqueuse et chargée ; il s'y joignit une douleur de tête sus-orbitaire, l'amertume de la bouche et une fièvre continue. Néanmoins l'émétique ne fut pas administré, on s'en tint aux délayans, aux lavemens émolliens, et de temps à autre, à quelques légers laxatifs. La maladie parcourut ses trois septenaires, et tout annonçait une guérison

prochaine, lorsque M. R** prit de son chef sept pilules drastiques (invasion de la phlegmasie). Dès le soir il survint une cardialgie violente, une syncope, des sueurs froides, suivies de vomissemens bilieux.

Les jours suivans il y avait nausées, hoquet, rapports fréquens, sensibilité à l'épigastre, et de temps à autre vomissemens de mucosités jaunâtres, et même par fois de matières alimentaires, fièvre continue avec redoublemens irréguliers qui étaient surtout déterminés par la moindre quantité d'alimens ou de boisson excitante; soif plus ou moins vive, dégoût général, haleine fétide, par suite peut-être du mauvais état des dents: la langue offrait constamment un enduit saburral très-épais et tenace. Il y avait toujours une sensibilité sourde dans différens points de l'abdomen, et des évacuations de couleur et de consistance variées, plus fréquentes en général que dans l'état de santé. Pendant toute la durée de cette phlegmasie il eût été très-difficile de reconnaître les symptômes spéciaux de l'hypocondrie. Deux causes contribuèrent singulièrement à perpétuer la maladie, et à en produire les redoublemens, l'indocilité du malade et son irrascibilité. Après quatre mois de souffrances, il se soumit enfin au régime sévère qu'on lui recommandait depuis long-temps, et dès-lors les accidens diminuèrent.

On employa successivement les adoucissans,

les délayans, les fondans unis aux légers narcotiques. Plusieurs vésicatoires volans furent appliqués sur l'abdomen. Dans la suite, on eut recours aux légers toniques, à l'eau rougie et sucrée que le malade supportait mieux que toute autre boisson, et plus tard au vin de Malaga, par petites doses, etc. Enfin, après six mois de maladie et de traitement, bien plus par le travail de la nature que par les efforts de l'art, M. R** recouvra une très-bonne santé; il a cependant depuis lors ressenti une nouvelle attaque de son hypocondrie, mais peu prononcée et sans aucune réminiscence de l'inflammation abdominale.

Hypocondrie compliquée de Phlegmasie chronique.

Mademoiselle Adèle, âgée de vingt-deux ans, d'un tempérament nervoso-bilieux, d'une constitution délicate, douée de beaucoup de gaîté et d'une grande vivacité, appartient à des parens très-sains et dont la santé est encore fort bonne, quoiqu'ils soient avancés en âge. Les premières années de sa vie ont été orageuses; elle a éprouvé à cette époque la plupart des maladies qui affectent les enfans. A douze ans elle a eu la petite vérole, et à seize, ses règles ont paru sans douleur et sans causer le moindre désordre. Elles ont été assez abondantes les premiers mois, mais ensuite elles ont diminué en quantité; de sorte que

chaque mois elle perdait au plus deux onces de sang dans l'espace de quatre à cinq jours.

Il y a deux ans que, par suite d'une violente jalousie, elle devint sombre et rêveuse, perdit le goût du travail, maigrit, s'éloigna du monde, et fut prise d'une fièvre bilieuse qui dura peu, mais qui la laissa dans un état de langueur et d'abattement (invasion de l'hypocondrie). Peu de temps après ses parens inquiets appelèrent un médecin, qui, après avoir recueilli les renseignemens ci-dessus, observa les phénomènes suivans : pâleur de la face, air inquiet et triste, langue blanchâtre, bouche pâteuse, légèrement amère; douleur vers l'estomac, digestions pénibles, accompagnées de beaucoup de vents qui, rendus par le haut, soulageaient momentanément; ventre douloureux avec borborygmes, constipation, chaleur naturelle de la peau, pouls serré, parfois irrégulier, mais sans fréquence; douleurs dans les cuisses et dans les jambes; urines abondantes, tantôt très-rouges, d'autres fois citrines, toujours avec sédiment. La malade se plaignait de passer les nuits dans une agitation considérable et dans des songes effrayans qui déterminaient le réveil ; alors des palpitations se faisaient sentir pendant quelques heures ; elles étaient suivies d'une sueur abondante de tout le corps. Cet état a duré sept à huit mois sans changement marqué dans les phénomènes qui

viennent d'être énoncés; mais au bout de ce temps des terreurs paniques sont venues aggraver les souffrances de la malade; tantôt elle craignait d'être affectée de phthisie, d'autres fois de devenir folle pour le reste de sa vie. Elle avait souvent, pendant un mois, un appétit dévorant; durant ce temps les digestions se faisaient facilement, quoique les borborygmes continuassent avec une éruption de vents considérable; il arrivait souvent qu'à cette espèce de boulimie succédait une anorexie complète avec une sorte d'horreur pour tous les liquides colorés; enfin il s'y joignait des bâillemens incomplets et fréquens. On a opposé à cette maladie des purgatifs, des anti-spasmodiques, des fondans, et sans succès pendant l'espace de vingt mois; au contraire, le mal semblait faire des progrès, surtout par l'emploi des purgatifs.

C'est ici que commence une autre série de symptômes qui dénotent une phlegmasie chronique. Il y a quatre mois qu'un flux dysentérique s'est manifesté; et malgré tous les moyens que divers médecins appelés tour à tour ont indiqués, ce flux subsiste encore et s'accompagne de douleurs abdominales plus ou moins vives, et qui n'ont pu être calmées. La face est pâle, grippée, la langue peu humide; il y a dégoût, soif plus forte le soir, désir des boissons froides, éructations fréquentes avec nausées, de temps

en temps vomissemens de matières muqueuses, et alors cardialgie, mais peu intense (les vomissemens sont survenus depuis peu). L'abdomen est un peu tendu, sonore, douloureux d'une manière obtuse ordinairement, mais par fois, et surtout lorsqu'on presse la région ombilicale, les souffrances deviennent d'une *acuité* insupportable. Il y a tous les jours sept ou huit selles et un peu de soulagement après chaque évacuation; les urines peu abondantes sont tantôt rouges, tantôt presque incolores, recouvertes d'une pellicule graisseuse, ou avec un sédiment d'un jaune rouge. Du côté de la poitrine on ne remarque qu'une gêne très-légère, qui nous paraît dépendre de la faiblesse. La peau est généralement sèche, terreuse en certains endroits, comme aux bras, au ventre; sa chaleur est plus élevée que dans l'état naturel, principalement vers l'ombilic. Le pouls est petit, serré, faible, donnant 92 pulsations par minute, et le soir la fièvre devient plus prononcée : cette exacerbation dure de cinq à six heures; vers la fin, il y a une moiteur légère et partielle. Les nuits sont pénibles, et le sommeil n'a lieu qu'autant qu'on le provoque : la malade est singulièrement maigrie. Les règles ont manqué à la dernière époque, pour la première fois. Au moral, situation des plus fâcheuses en général : l'idée de tous les maux vient sans cesse assaillir son imagination; à chaque instant

elle désire un nouveau médecin, de nouveaux remèdes ; tantôt elle désespère de son rétablissement, et alors les pensées les plus noires, les plus sinistres occupent son esprit : tantôt l'espérance la séduit sous toutes les formes, et dans cette disposition elle organise mille plans de conduite pour sa prochaine convalescence. Les médicamens qui paraissent maintenant le plus la soulager, sont les adoucissans calmans, unis aux légers toniques.

Il nous semble bien évident qu'il a existé chez cette malade une hypocondrie qui s'est compliquée, au bout de vingt mois, avec une phlegmasie chronique des intestins; celle-ci s'est prolongée par la suite jusqu'à l'estomac. Je ne doute pas enfin que l'abus des purgatifs n'ait beaucoup favorisé le développement de l'inflammation.

L'observation suivante, tracée par *Hoffmann*, nous paraît offrir une hypocondrie qui s'est compliquée de très-bonne heure, avec une phlegmasie chronique intestinale.

Un homme distingué, âgé de trente-deux ans, d'un tempéramment phlegmatique et sanguin, ayant les chairs molles et flasques, fut élevé très-mollement et avec beaucoup de soin : il n'éprouva aucune maladie et ne fut jamais sujet aux constipations.

A trente-huit ans, il s'adonna à la bonne chère dans de grands repas, et but avec profusion du vin

acidule de Franconie ou du Rhin, pendant plusieurs semaines. Il fut pris d'un dévoiement très-intense qu'il modéra, sans toutefois l'arrêter entièrement, avec des poudres opiacées dont il força imprudemment la dose, contre l'avis de son médecin. Dès-lors il ressentit du malaise dans les hypocondres, des anxiétés précordiales, des spasmes, des flatuosités, des borborygmes, des gonflemens; les digestions devinrent pénibles, les forces diminuèrent, le sommeil fut agité, inquiet; des idées tristes et des absences de raison se joignirent à ces divers accidens (1).

On consulta plusieurs médecins, qui reconnurent tous l'affection hypocondriaque, et opposèrent tantôt les martiaux et les stomachiques chauds, d'autres fois les volatils et les aromatiques; mais tous leurs efforts furent inutiles, le dévoiement continuait avec des douleurs terribles : les déjections étaient fréquentes (il allait cinq fois et plus par jour), et semblaient corroder l'anus; il s'élevait par la bouche des rots acides et brûlans; enfin le malade rendait des vents dont l'issue diminuait ses coliques : cette série d'accidens subsista pendant deux ans.

---

(1) Jusqu'ici nous ne voyons qu'une hypocondrie simple, dont l'origine provient de la suppression d'une diarrhée par l'usage inconsidéré des narcotiques; dans le paragraphe suivant, il nous semble permis de reconnaître une phlegmasie intestinale chronique, compliquant l'hypocondrie.

On pratiqua une saignée du pied, on mit en usage les pilules de *Becher,* des sels apéritifs et des eaux minérales; le mal n'en fit pas moins de progrès.

L'appétit se maintenait (1), mais les alimens étaient rendus sans être digérés : le matin, et à la fin de la digestion, il vomissait, après beaucoup d'anxiétés, de chaleurs intérieures et de froid aux extrémités, une lymphe corrosive comme de l'eau forte. La bouche était sèche ; il y avait de la soif : vers le soir, lorsqu'à l'extérieur il avait froid, il lui survenait au dos une chaleur accompagnée de sueur. Les martiaux ne réussirent pas, et il survint une si grande difficulté de respirer, avec froid des extrémités, qu'il paraissait très-souvent prêt à suffoquer.

C'est alors qu'il réclama nos soins : nous fîmes appliquer, sur une tumeur placée à l'anus des sangsues, et nous lui donnâmes notre élixir viscéral avant les repas : nous lui conseillâmes, à prendre après sa digestion, la poudre *précipitante* faite avec l'écorce de cascarille, etc.; le matin une infusion théiforme pour boisson ordinaire;

(1) Quand les malades conservent un bon appétit et n'éprouvent point de vomissemens, il est presque certain que l'inflammation est bornée aux intestins; mais lorsqu'aux symptômes ci-dessus il se joint l'anorexie, la douleur à l'épigastre, le vomissement, etc., alors l'estomac participe presque toujours à l'inflammation.

une décoction appropriée ; de deux jours l'un les pilules anti-spasmodiques composées avec l'extrait de mille feuilles, de camomille, le suc de férule, la myrrhe, le safran et le castoreum, etc. A ces moyens nous ajoutâmes un bon régime et l'usage des eaux de Schwalbach. Le malade, ayant suivi ce traitement, en retira, au bout de quelque temps, un très-grand soulagement (HOFFMANN).

Hypocondrie convertie en une Gastrite chronique, et terminée par une Gastrite aiguë mortelle.

M. P**, âgé de quarante-six ans, fut doué d'un caractère fort gai et d'une bonne constitution : il se livra dans sa jeunesse, et sans mesure, aux plaisirs de l'amour; long-temps sa santé ne parut pas en souffrir, mais un rhumatisme articulaire, ou des grandes articulations, atteignit enfin cette organisation qui semblait inébranlable : la crise se fit sur la vessie, qui devint le siége d'un catarrhe chronique. Cette crise, et la continuation de l'affection de vessie qui en résulta, furent sans doute favorisées par les excès auxquels M. P** s'était adonné pendant long-temps. L'urine fut d'abord blanchâtre, sédimenteuse, puis muqueuse ; le malade se plaignit dès-lors de douleurs légères à la vessie, et de fréquentes envies d'uriner qui le tourmentaient

même le jour, et l'obligeaient à se lever cinq ou six fois chaque nuit.

Ce fut alors que je le vis pour la première fois, en 1802 (1) : il avait à cette époque trente-quatre ans. Je l'engageai à faire examiner d'abord l'état de sa vessie par un des grands maîtres de l'art ; et peu de temps après il fut sondé par M. *Dubois*, qui confirma l'existence d'un catarrhe vésical. Des souffrances habituelles, et la gêne qu'il éprouvait quand il était dehors, lui firent prendre la résolution de renoncer à toute société.

Cet isolement presque absolu, qui contrastait avec son genre de vie ordinaire, une application plus soutenue et pénible aux travaux de sa profession, l'ennui de sa position, la douleur, l'insomnie, la vie sédentaire et des chagrins de diverse nature, amenèrent insensiblement le trouble des fonctions digestives, une véritable hypocondrie.

M. P** ne digérait qu'avec peine ; il était tourmenté par des vents, des borborygmes, une constipation presque habituelle, et ressentait un malaise générale, des étourdissemens et une faiblesse très-grande qui avoisinait la syncope : on remarquait en outre au moral un abattement

(1) Je l'ai suivi pendant douze ans, sauf quelques intervalles assez courts, durant lesquels je ne le perdais pas de vue, et j'ai été le triste témoin de ses derniers momens.

très-prononcé, des craintes relatives à diverses maladies, et une très-grande versatilité dans ses idées.

L'intensité et la persévérance des causes de cette maladie firent échouer tous les efforts de l'art : M. P** ne pouvait se livrer à aucun exercice, ni rechercher dans la société la distraction qui lui était nécessaire, puisqu'il était obligé d'uriner de quart d'heure en quart d'heure. Les médicamens toniques qui exerçaient sur l'estomac une action favorable lui étaient fréquemment interdits, parce qu'ils exasperaient la sensibilité de la vessie. Ce malade était en outre fort indocile : il se refusa long-temps à l'usage des bains sulfureux, aux vésicans (sans cantharides), et à d'autres moyens qui paraissaient indiqués. Il se mit à plusieurs reprises entre les mains des charlatans, qui le fatiguèrent de remèdes échauffans, d'anti-vénériens, etc. Ce fut à leur ignorante témérité qu'il dut une nouvelle série d'accidens, pendant laquelle les symptômes de l'hypocondrie furent en grande partie masqués. La difficulté des digestions augmenta, il s'y joignit la perte de l'appétit; plus tard, un dégoût presque général, une cardialgie légère, mais habituelle. Il existait souvent des rapports, des nausées, et même des vomissemens, de la soif, et un mouvement fébrile avec sécheresse de la langue et de la peau; d'autres fois il survenait de vives exacerbations souvent

produites par le repas le plus léger, ou de nouvelles contrariétés ; les évacuations tantôt plus, tantôt moins abondantes, étaient bilieuses ou séro-muqueuses; on ne pouvait méconnaître dans cette succession de symptômes ceux qui appartiennent à une inflammation lente de l'estomac.

Après sept à huit mois de ce nouveau genre de souffrances, M. P** fut pris, le 20 novembre 1814, par suite de fatigues, d'un frisson suivi de chaleur, de soif, de mal de tête, et de douleurs vers l'épigastre. Le 21, le pouls était dur et fréquent, mais non développé, la physionomie annonçait un état d'angoisse et d'altération profonde; la bouche était amère, la langue sèche; il y avait céphalalgie violente, tension et sensibilité à l'épigastre; le reste de l'abdomen était souple. Je prescrivis les adoucissans, une potion antispasmodique, les applications émollientes sur l'épigastre, des lavemens émolliens et un peu laxatifs; des sinapismes furent appliqués aux extrémités inférieures.

Le 22, même état auquel il se joignit des nausées et des vomissemens très-pénibles, composés de mucosités blanchâtres et bilieuses.

Le 23, léger amendement; les 24 et 25, retour des accidens au même degré que le 21 et le 22. Le 26 novembre (septième jour de la phlegmasie aiguë), le mal de tête augmenta, et

une inflammation très-douloureuse survint à l'œil droit : un vésicatoire fut appliqué à la nuque. Le 29 novembre (dixième jour), le malade fut toute la journée en proie à un très-grand malaise, et à un hoquet convulsif; le lendemain (onzième jour), il y eut quelques momens de rémission, le hoquet ne revint pas; l'ophthalmie et la douleur de tête parurent céder au vésicatoire; le pouls était moins dur, mais toujours fréquent ; la bouche de plus en plus mauvaise, et la langue sèche et brunâtre. Du onzième au quinzième jour les accidens restèrent à peu près les mêmes; le hoquet reparut à plusieurs reprises, mais sans persévérance soutenue; la soif fut moins vive, la figure resta toujours altérée, et l'état d'angoisse et de souffrance ne diminua pas sensiblement : on revint plusieurs fois, dans le cours de la maladie, aux sinapismes. Le seizième, prescription de deux vésicatoires aux cuisses, que le malade refusa, et qui ne furent appliqués que le lendemain ; apparence de mieux, qui ne pouvait tromper sur un péril aussi imminent : vomissemens de matières ou stries brunâtres et noirâtres qui nageaient dans une certaine quantité de sérosité; sueur froide et visqueuse, pouls petit, misérable. Le 6 décembre, dix-septième jour de l'inflammation, respiration convulsive, assoupissement et alternatives de rêvasseries. M. P** succomba après une agonie très-douloureuse.

Ouverture. Le cerveau était un peu injecté ; les ventricules contenaient environ deux onces de sérosité, les poumons et le cœur n'offraient rien de particulier, l'estomac était diminué de volume, épaissi ; sa membrane muqueuse était d'un rouge livide, et présentait plusieurs points noirâtres ; tous les intestins étaient rétrécis ; la vessie rapetissée offrait une consistance comme squirrheuse ; sa membrane interne était fongueuse.

Dans l'observation suivante nous verrons une hypocondrie qui nous paraît avoir fini, après de longues années, par une péritonite aiguë, dont la terminaison a été également funeste.

M. de Ch., âgé de cinquante-deux ans, unissait une assez bonne constitution à un tempérament des plus nerveux ; l'invasion de son hypocondrie remonte à l'âge de trente-trois ans, et cette maladie fut renforcée par une vie molle et sédentaire, par un régime alimentaire trop recherché, et enfin, par l'abus des plaisirs de l'amour. Dès-lors diminution de l'appétit, borborygmes fréquens, constipation, douleurs erratives, et parfois vomissement de mucosités abondantes, langue muqueuse, douleur et resserrement habituel vers la gorge ; palpitations très-pénibles, froids irréguliers, amaigrissement, étourdissemens, tintemens d'oreille, illusions d'optique, idées bizarres, maux imaginaires ou plutôt exagérés, aversion contre la société, le mouvement et

l'exercice, et tendance irrésistible au sommeil après les repas; crainte de perdre la raison, et attention minutieuse pour tout ce qui est relatif à sa santé.

Les premiers moyens mis en usage furent les sangsues au siége, un grand nombre de bains tièdes, des boissons anti-spasmodiques, les infusions de tilleul, de narcisse des prés, de feuilles d'oranger, de menthe, de mélisse, etc. L'ensemble de ces moyens parut diminuer les accidens; mais des affections de l'âme très-pénibles, et la continuité d'un régime aussi irrégulier, ramenèrent les accidens. L'exercice du cheval, les voyages, la fréquentation des spectacles agirent plusieurs fois d'une manière utile; mais revenu à ses habitudes favorites, M. de Ch. en retrouvait les conséquences ordinaires; par la suite, l'abdomen devint plus sensible, et tout écart un peu prononcé dans le régime lui causait des coliques. C'est dans cette disposition occulte aux phlegmasies qu'il fut saisi, après un refroidissement, d'un frisson violent, de douleurs dans l'hypocondre gauche et l'épigastre, et de vomissemens très-abondans. La fièvre s'alluma, le pouls était fréquent, dur et serré, la soif vive, et la physionomie profondément altérée, grippée; les différens points de l'abdomen devinrent successivement le siége de souffrances inexprimables contre lesquelles échouèrent les saignées, les sangsues,

les bains, les cataplasmes, les lavemens émolliens, les boissons adoucissantes, les potions huileuses, etc. Des syncopes fréquentes se manifestèrent ; il survint une rétention d'urine, ou plutôt une suppression, puisque la sonde ne fit sortir qu'une très-petite quantité de ce liquide. Le hoquet, les vomissemens moins rapprochés, mais noirâtres, l'état misérable du pouls, les sueurs visqueuses, et la diminution des souffrances remplacées par un état d'anxiété plus fâcheux encore, terminèrent le sixième jour de l'inflammation cette scène déchirante (1).

Le fait suivant nous présente cette névrose terminée d'une manière également fâcheuse, par un engorgement squirrheux du foie. M. G** reçut en partage une bonne constitution, mais en même temps une complexion délicate, et joignait à des traits distingués un caractère aimable et une vive sensibilité. Dès l'âge de dix-huit ans, il s'attache à une jeune personne qui le flatte de l'espoir d'un tendre retour ; mais ses parens s'opposant à cette inclination, le font partir pour Paris. L'étude des beaux-arts, et surtout de la peinture, qu'il aimait avec passion, apporte quelque distraction à sa peine. Bientôt, comme si tous ses goûts devaient être contrariés, on l'oblige à entrer chez un banquier, où il remplace, par un travail fasti-

(1) Je n'ai pu obtenir l'ouverture.

dieux, la culture d'un art favori. En vain cherche-t-il à s'étourdir en se livrant aux plaisirs bruyans de la capitale, de nouveaux chagrins l'attendent encore, et troublent insensiblement la bonne santé dont il avait joui jusqu'alors.

Les fonctions digestives sont les premières lésées; l'estomac devient paresseux; chaque repas est suivi d'un état de souffrance; dans les intervalles, le malade est tourmenté par des tensions et des gonflemens vers l'épigastre et les hypocondres, par des flatuosités, des palpitations, des bâillemens, et un sentiment de malaise habituel; il répugne à faire de l'exercice, parce que ses jambes sont faibles et vacillantes; son caractère, naturellement très-gai, devenu morose, lui faisait prendre en aversion toute société, même peu nombreuse : un petit nombre d'amis intimes étaient son unique refuge.

Ce fut dans ces circonstances, et trois ou quatre mois après l'invasion de sa maladie nerveuse, qu'il partit pour Milan, où il obtint un emploi à la suite de l'armée. Pendant tout son voyage, lors de nos glorieuses campagnes d'Italie, il n'éprouva aucun dérangement dans sa santé; mais la paix de *Campo Formio* le ramène à Paris, où il reprend sa palette et ses pinceaux. Forcé, au bout de deux ans, à les abandonner de nouveau, il retourne en province, et y apprend la séparation de ses parens et la ruine de leur for-

tune, ainsi que le mariage de la jeune personne qu'il avait aimée. Accablé sous le poids de son malheur, il revient dans la capitale, et ressent chaque jour de nouveaux symptômes nerveux; l'hypocondrie reparaît avec le même cortége à peu près que nous avons indiqué déjà. Je le revis au bout de six mois, et son état n'était plus le même. La physionomie, profondément altérée, offrait une teinte jaunâtre; l'embonpoint était diminué, l'appétit presque nul, et la bouche habituellement mauvaise ; souvent les alimens étaient rejetés, et des douleurs vives occupaient l'épigastre et l'hypocondre droit. Je soupçonnai une lésion organique ; et quelque temps après il fut reconnu, par deux praticiens également recommandables, feu M. *Jeanroi* et le professeur *Dubois*, que le foie était réduit à un état squirrheux.

Un traitement approprié apporta quelque soulagement à ses souffrances : c'était tout ce qu'on pouvait espérer ; mais entraîné par des conseils indiscrets, il se livre entre les mains d'un charlatan, qui, par des purgatifs drastiques, avance le terme de son existence. Ainsi périt à vingt-quatre ans, un jeune homme que la nature avait d'abord favorisé, mais dont les dernières années furent une suite non interrompue de peines et de malheurs.

On trouve dans *Morgagni*, épître trente-neu-

vième, une observation très-détaillée, qui nous offre l'exemple d'une complication analogue: c'était une tumeur squirrheuse de l'iléum et d'une partie du jéjunum.

Les hypocondriaques sont encore sujets à d'autres complications; l'estomac et ses annexes sont parfois le siége d'hémorrhagies atoniques qui constituent cette affection, connue sous le nom de *méléna*. Dans ce cas, le vomissement fournit un sang noir et décomposé; les selles sont ordinairement de la même nature; rarement observe-t-on alors une constipation opiniâtre. Il faut distinguer cette maladie, qui est parfois exempte de désorganisation squirrheuse, du vomissement noir, atrabilaire que l'on rencontre dans les altérations cancéreuses ou organiques de l'estomac, du foie ou de la rate, et même dans les squirrhes du pylore non ulcérés, lorsque le malade approche du dernier terme de son existence.

L'observation suivante nous offre encore l'exemple d'une terminaison fâcheuse (1) produite par la réunion d'une hypocondrie et d'une lésion organique du rein droit. Un homme âgé de quarante-neuf ans, d'un tempérament mélancolique, et depuis plusieurs années hypocondriaque très-prononcé, se plaignait surtout d'une douleur vive à l'hypocondre gauche. Bientôt un

(1) *Sepulchretum anatom.*, lib. II, p. 660. BONNET.

flux hémorrhoïdal, dont il éprouvait du soulagement, vint à cesser : deux hémophthisies lui succédèrent dans l'espace de six mois; une troisième fut si considérable, que le malade succomba pendant l'accès.

Ouverture. La rate était livide et flasque, les vaisseaux mésentériques et gastro-épiploïques injectés et variqueux; le rein droit, plus volumineux que le gauche, *offrait à sa partie supérieure et entre ses membranes, un kyste très-étendu, contenant une sérosité jaunâtre.* Les poumons étaient engorgés, la rate, la veine-porte et le ventricule droit étaient également distendus par un sang noir et comme fermenté.

Les altérations organiques ne produisent presque jamais l'hypocondrie, mais elles viennent quelquefois compliquer cette névrose dont elles forment une des complications les plus fâcheuses. C'est ainsi que les vices organiques du pylore, du foie, de la rate, et même du pancréas, des reins, du canal intestinal, etc., succèdent aux maladies nerveuses des organes digestifs, et c'est alors qu'on peut dire *qu'à la peur du mal* succède *le mal de la peur.* En effet, après avoir long-temps redouté des maux qui souvent n'existaient pas, les hypocondriaques en éprouvent de très-réels, et dont le développement peut être favorisé par leurs craintes continuelles, ou par l'affection première qui les suscitait. Les symptômes géné-

raux qui peuvent faire craindre une altération dans le tissu de nos viscères, sont l'ancienneté et les progrès de la maladie, sa résistance à tous les moyens rationnels, l'affaiblissement du malade, la perte de l'appétit, l'amaigrissement général, l'expression de la physionomie, qui annonce l'inquiétude et la douleur, souvent la fréquence et la petitesse du pouls, la soif, avec redoublement vers le soir; la sécheresse de la peau, de la langue, et l'agitation de la nuit; ces signes ont été indiqués déjà page 408. Mais on doit s'attacher surtout, pour reconnaître la complication, aux symptômes spéciaux de chacun de ces vices organiques, c'est-à-dire, aux accidens qui résultent de la lésion même de l'organe.

Le précepte que donne *Baglivi* peut en outre aider à faire reconnaître les lésions organiques qui compliquent cette névrose : *In chronicis morbis, si facies naturalis sit ac boni coloris, numquam crede adesse obstructiones aliaque vitia in visceribus.* Bagl. Ce précepte est sans doute conforme à l'observation, mais il est trop général, et serait souvent en défaut, si on l'appliquait au début de ces désorganisations : apprécié à sa juste valeur, c'est un signe des plus importans.

TROISIÈME SECTION.

Complications de l'Hypocondrie avec les maladies qui ont des rapports moins directs avec cette névrose, ou qui sont accidentelles.

Une des maladies les plus cruelles, et peut-être la plus fréquente, c'est la phthisie pulmonaire: quand elle est bien caractérisée, cette affection ne rétrograde presque jamais; et l'hypocondriaque qu'elle vient surprendre est voué à une mort qui paraît certaine. Le fait suivant, que nous ne ferons qu'esquisser, nous offre un triple désordre.

Un homme âgé de cinquante-trois ans, sujet depuis plusieurs années à une hypocondrie déterminée par les travaux du cabinet les plus continus, avait éprouvé une diminution notable dans son état de souffrance habituelle, chaque fois qu'il avait remplacé des contentions d'esprit trop prolongées par un exercice soutenu et le séjour de la campagne; mais entraîné par son goût et les circonstances, il reprit ses occupations accoutumées, qu'il quitta enfin, mais trop tard; les symptômes d'une phthisie pulmonaire ne tardèrent pas à se développer. A cette maladie terrible, qui avait enlevé successivement et à un an d'intervalle, son épouse et son fils unique, il se joignit, pour comble de malheur, un cancer

de la langue. Les professeurs *Pinel* et *Boyer* furent consultés sur cette complication ; mais la victime était marquée, et ce magistrat, recommandable par ses lumières et ses vertus, partit pour la province, où bientôt la mort mit un terme à ses maux.

La réunion d'une phthisie commençante avec l'hypocondrie n'offre pas toujours une terminaison aussi funeste ; on peut quelquefois, par l'écart des causes de l'une et l'autre affection, et surtout par un traitement approprié, enrayer les progrès du mal, ou même procurer une guérison parfaite.

Dans d'autres cas, une lésion organique marche de concert avec l'hypocondrie : à ce concours de maux, on voit se joindre une phthisie pulmonaire qui avance le moment fatal.

Hypocondrie avec vice organique, terminée par une phthisie pulmonaire.

Madame **, âgée de trente-deux ans, reçut en partage une faible constitution, et parut dès son enfance disposée à la phthisie pulmonaire ; au moral, sensibilité vive et mobilité extrême dans ses affections. A quinze ans, perte d'une amie intime, dont elle ne voulut jamais s'éloigner, et dont elle reçut les derniers adieux. De là une source de chagrins concentrés, et que rien ne put

effacer. A vingt-deux ans, à la suite d'une fièvre adynamique, douleurs dans le flanc gauche, vers la région du rein ; douleurs profondes peu violentes en général, quelquefois très-intenses ; peu de temps après, symptômes d'hypocondrie, perversion de l'appétit, lenteur dans les fonctions de l'estomac, palpitations, trémoussemens vers la région précordiale, augmentation de la susceptibilité naturelle ; la nuit, réveil par le bruit d'une détente qui se fait sentir dans la tête, la poitrine ou le ventre ; diminution pendant deux grossesses des accidens, qui reprirent, immédiatement après, leur première intensité ; abattement moral, terreurs paniques, maux imaginaires, crainte de la mort, douleurs constantes vers le rein gauche, tiraillemens et douleurs plus vives pendant le décubitus sur le côté droit ; aucun trouble dans la sécrétion des urines, diminution des forces. En palpant l'abdomen, on reconnaît une tumeur que l'on soupçonne formée dans le tissu graisseux du rein. Même état pendant cinq à six ans, et développement peu sensible de la tumeur ; une vie plus active diminua tous les symptômes nerveux, mais sans aucune rémission dans les douleurs lombaires.

Pendant les chaleurs de l'an VIII, maux de tête violens, étourdissemens, et de temps à autres, coliques intenses ; pour la première fois, retard du flux menstruel, qui reparut au bout de dix

jours ; persévérance des douleurs dans la partie affectée.

Préludes de phthisie pulmonaire, dans les premiers mois de l'an XI; toux assez fréquente, gêne de la respiration, mouvement fébrile le soir, sueurs copieuses dans la paume des mains et à la plante des pieds, vomissemens abondans de mucosités; toujours lenteur et trouble dans les fonctions de l'estomac, anxiétés extrêmes, tensions spasmodiques vers les hypocondres. Durant quelques jours, légers soubresauts de l'utérus, resserrement de la mâchoire inférieure, constriction vers le larynx, mais intégrité des fonctions de l'entendement, absence du globe hystérique et de tout mouvement convulsif; palpitations et trémoussemens vers la région précordiale, et autres symptômes nerveux propres à l'hypocondrie, qui se soutiennent avec intensité pendant plusieurs jours consécutifs : à la fin des paroxysmes, urines sédimenteuses ; intervention d'hémorrhoïdes, qu'une seule application de sangsues fait disparaître ; dépérissement général et rétention du flux menstruel.

La malade ne retirait aucun avantage des antispasmodiques, et le soulagement momentané que procuraient les sangsues et les purgatifs, était également éphémère. Sur les derniers temps, la tumeur devint plus sensible, et la phthisie, après avoir parcouru ses différens degrés, con-

duisit la malade au marasme le plus prononcé, et bientôt à la mort (1).

Cette dernière terminaison de l'hypocondrie est fort ordinaire : elle a été observée par un grand nombre de praticiens, tels que *Morton* (2), *Baumes*, *Vicq-d'Azyr* (3). J'en ai vu moi-même plusieurs exemples. *With* suppose le transport de l'humeur morbifique sur l'organe pulmonaire. *Lorry*, dans son excellent traité *de Melancholiâ*, a consacré un chapitre entier à l'histoire des conversions de l'hypocondrie et de la mélancolie en phthisie pulmonaire et en hydropisie, etc. Enfin, au rapport de *Tissot*, *Cheyne* a remarqué que la phthisie tuberculeuse était une suite fréquente des névroses propres aux organes de l'abdomen et à l'utérus.

Les maladies du système sanguin ne sont pas non plus incompatibles avec l'hypocondrie : non-seulement l'organe principal de la circulation et les gros vaisseaux, mais même leurs extrémités capillaires sont sujettes à diverses altérations, qui viennent parfois compliquer cette névrose, et qui peuvent se terminer de la manière la plus fâcheuse. Nous avons déjà dit que la fréquence et la durée des palpitations nerveuses favorisaient

---

(1) Il n'y a point eu d'ouverture.

(2) *Morton de Phthysi*, *cap.* 4.

(3) Encyclop. méthodiq. méd., t. II, p. 275.

les dilatations organiques du cœur et de l'aorte, etc. connues sous le nom d'anévrismes de ce viscère et de ses annexes (1). On voit en outre les autres maladies du système sanguin coexister avec l'hypocondrie; mais qu'on ne se trompe pas; il est bien difficile de prononcer dans certains cas de palpitations, si celles-ci dépendent d'une sensibilité exaltée, d'un état pléthorique, en un mot, d'une cause amovible, ou bien d'un changement d'organisation dans le tissu artériel, ou même dans celui du cœur. Nous avons soigné, au troisième dispensaire, M. *Bellemain* et moi, une femme qui éprouvait depuis quinze ans des palpitations violentes et continuelles. Ce désordre fut entièrement dissipé par l'application, sur la région précordiale, de douze sangsues, que nous avions conseillées, sans autre espoir que celui de diminuer les souffrances.

Presque tous les praticiens ont également vu des exemples de palpitations, qui, par une durée désespérante, faisaient craindre des lésions organiques du cœur ou des gros vaisseaux artériels, et qui cependant se dissipaient tôt ou tard, lors même qu'on avait perdu tout espoir. Mais quand le tissu des organes est altéré, quand les tumeurs

---

(1) Dans la dissertation du docteur *Chardel*, sur les maladies du cœur, les affections idiopathiques de ce viscère sont exposées de la manière la plus satisfaisante.

ont usé les parois osseuses, et proéminent au-dehors ; lorsqu'enfin l'œdème des extrémités inférieures prélude à de nouveaux désordres, que peut-on attendre des secours de l'art !

Les fièvres essentielles sévissent contre un si grand nombre d'individus, qu'elles se développent quelquefois chez les personnes affectées d'hypocondrie ; cependant cette complication est assez rare : les névroses des organes digestifs sont en quelque sorte un préservatif contre un certain nombre de maladies sporadiques et épidémiques. Aussi rencontre-t-on rarement, parmi les hypocondriaques, des fièvres intermittentes (1). D'autre part, l'extrême sensibilité dont sont doués ces malades, pourrait, jusqu'à un certain point, les disposer aux fièvres ataxiques. C'est ainsi que nous avons soigné dernièrement une fièvre intermittente pernicieuse chez une dame hypocondriaque. Enfin, rappelons ici ce que rapporte *Morgagni*, qu'un homme affecté d'hypocondrie, fut pris d'une fièvre, à laquelle il succomba, avant même que cette dernière maladie eût été reconnue. Il est probable qu'on négligea de prêter une attention suffisante à ses

---

(1) Une lésion bornée à un appareil n'est-elle pas, en quelque sorte, un cas de préservation, sinon absolu, au moins fréquent, des maladies générales ? Ex. : la blénorrhagie, les exutoires dans la peste, etc.

plaintes. Cette assertion de *Morgagni* nous démontre combien il importe d'écouter attentivement les récits de ces malades, et d'examiner avec soin les accidens auxquels ils sont en proie. Lors même qu'ils se tourmentent mal à propos, il faut se conduire comme si leurs plaintes étaient fondées; procéder à l'inspection des différentes fonctions, et leur démontrer ensuite que leurs inquiétudes sont exagérées. On les persuadera bien plus facilement par un examen attentif, qu'en laissant voir une prévention et une légèreté également déplacées, et qui toujours les désolent : cette perquisition aurait en outre l'avantage, dans quelques cas, de nous faire découvrir un désordre qui existait sans même qu'on le soupçonnât.

Comme cette complication est assez rare, nous allons rapporter le seul fait analogue que nous ayons observé.

Hypocondrie, suite d'une frayeur vive et compliquée avec une fièvre quarte.

Une dame âgée de vingt-huit ans, et bien constituée, alliait à une sensibilité nerveuse très-vive un courage digne de faire honneur à son sexe : ses règles parurent à quatorze ans, et à seize elle se maria.

A l'âge de vingt-sept ans, elle quitte le beau climat de la France, où elle jouissait de tous les

avantages que procurent la fortune et la considération, des traits aimables, et surtout des qualités morales très-attachantes. Elle part pour la Russie, traverse rapidement la Hollande, la Prusse et les déserts qui conduisent au centre de ce vaste empire. Bientôt elle regrette sa patrie, et prend en aversion le climat de Pétersbourg. Toutefois sa santé n'avait jusqu'alors éprouvé aucune altération sensible.

Un jour, elle mange en dînant avec une autre personne, d'un mets très-renommé dans ces pays. Une heure après le repas, l'hôtesse arrive dans une agitation effrayante, et lui dit, en sanglottant, que son commensal est empoisonné. Cette nouvelle la jette dans un trouble physique et moral des plus alarmans, elle perd connaissance, et revenue à elle-même, elle éprouve des vomissemens, qui, peut-être, dépendaient moins des alimens qu'elle avait pris, que de la secousse morale qu'elle venait de recevoir.

Depuis lors ses digestions furent difficiles; son appétit devint très-irrégulier : elle était tourmentée par des nausées, des borborygmes presque continuels, surtout après le repas, et par des contractions spasmodiques qui affectaient les hypocondres ; elle ressentait en outre une douleur obtuse vers l'épigastre. La constipation et la diarrhée se succédaient. Il se joignit à ces premiers accidens des chaleurs vagues et tantôt des froids

passagers, des éblouissemens, une démarche incertaine, des tintemens d'oreille, des tremblemens dans les membres, avec apparence de paralysie, de l'affaiblissement, la perte de l'embonpoint, un sommeil pénible, et souvent interrompu par des rêves affreux.

Malgré le désir de revoir la France, elle fut forcée de se rendre à Moscou ; mais son retour dans sa patrie fut enfin arrêté. Les distractions d'un aussi long voyage, et le plaisir que lui donnait l'espérance, furent d'un faible secours pour sa santé.

A la suite de beaucoup de fatigues, et vers l'automne, elle fut prise d'une fièvre quarte, qui heureusement n'était point accompagnée de lésion organique. La veille du quatorzième accès, elle dînait chez un ancien ami, qui la reçut avec toutes les démonstrations qu'inspire un véritable attachement. Le lendemain, elle était dans le stade de la chaleur, lorsqu'on lui apporte une lettre; elle l'ouvre, et lit, ou plutôt s'imagine lire ces lignes : *Le masque est tombé; hier vous avez fait la malade, afin de nous mieux tromper, et pour enlever un objet précieux; toutes les personnes présentes s'en sont aperçues.* Qu'on juge de l'effet que dût produire cette accusation sur l'esprit d'une femme très-nerveuse, affaiblie, et dans l'instant le plus pénible d'une fièvre intermittente.

Ses traits se décomposent, ses forces l'aban-

donnent, elle semble prête à succomber ; mais revenue de cette syncope, elle passe plusieurs heures dans une agitation extrême. En vain, elle appelle à son secours une conscience irréprochable ; son égarement continue ; elle fixe ses mains, les isole, par la pensée, de ses facultés intellectuelles, et semble les interroger sur le vol dont elle se croit si injustement accusée.

Enfin un ami arrive, elle lui donne en frémissant cet horrible écrit. Quelle fut sa surprise, lorsqu'on lui prouva que loin de contenir des reproches, ou une accusation, cette lettre ne renfermait, au contraire, que les expressions d'une amitié sincère. Malgré le calme moral qui suivit cette explication, la nuit fut très-agitée, et la sueur qui terminait les accès fut beaucoup plus abondante que de coutume.

Le traitement de son hypocondrie avait été commencé dans les pays étrangers ; on avait beaucoup insisté sur les élixirs spiritueux, qui, plus stimulans que toniques, ne lui avaient jamais réussi. Depuis son retour en France, elle se confia aux soins d'un apothicaire, espèce de savantasse, très-disposé à faire fleurir sa boutique aux dépens des pauvres malades et de leur bourse.

Sa fièvre continuait alors, malgré le retour de la belle saison, et sa faiblesse allait croissant ; les phénomènes de l'hypocondrie se soutenaient

également. Après avoir recueilli tous les renseignemens convenables sur la constitution de cette dame, sur les causes qui avaient altéré sa santé, et sur sa position présente, je prescrivis le sirop anti-scorbutique et de fleurs d'orange le matin à jeun ; l'extrait de quinquina avant dîner, et longtemps avant l'accès ; tous les quatre jours elle restait au lit, et à la diète jusqu'à la fin de la fièvre ; tous les soirs elle prenait une petite dose de thériaque, qui lui procurait un très-bon sommeil ; sa boisson consistait en une infusion de fleurs de tilleul et de feuilles d'oranger édulcorée.

Un exercice gradué, des promenades en voiture, et le conseil de rechercher tout ce qui pouvait la distraire et lui inspirer de la gaîté, contribuèrent, avec les médicamens précités, à rendre son état beaucoup plus supportable.

Depuis lors, cette dame est partie pour le midi de la France, où sa santé s'est encore améliorée.

Les affections du système cutané, et surtout les dartres, s'associent assez fréquemment aux névroses des fonctions digestives. Les deux observations ci-jointes nous en offrent la preuve.

Observation d'Hypocondrie avec affection dartreuse.

Une dame, âgée de vingt-huit ans, jouissait d'une assez bonne santé ; elle était retirée à la

campagne, où elle passait chaque année tout le temps de la belle saison, lorsqu'elle perdit subitement son père, qu'elle aimait tendrement : dès-lors elle mena une vie plus sédentaire, et chaque jour sa douleur était renouvelée par le bruit des cloches, qui, selon *Boileau*,

> Pour honorer les morts font mourir les vivans.

Elle donnait un nouveau développement à sa tristesse et à ses inquiétudes, par la lecture habituelle de la médecine domestique de *Buchan*.

L'approche de l'hiver la ramène à Paris ; elle y consulte en arrivant un célèbre praticien, pour une disposition dartreuse qui s'était depuis peu manifestée sur son visage. Cette maladie fut diminuée par le traitement très-convenable qu'on lui ordonna ; mais les symptômes nerveux qui la tourmentaient, et dont pour lors elle ne parla pas, s'exaspérèrent singulièrement par l'usage des bains, des boissons délayantes, et un régime végétal. Plus tard, le vin de quinquina diminua les accidens de la maladie nerveuse, mais il parut avoir augmenté la couperose ; c'est alors que je fus consulté. Après avoir recueilli les renseignemens ci-dessus, je résolus de combattre simultanément les deux maladies, et de n'employer que des moyens appropriés à l'une et à l'autre. L'affection dartreuse, quoique peu prononcée, contrariait beaucoup les goûts de cette

dame, qui aimait la société; mais les phénomènes de la névrose étaient très-intenses. L'appétit était irrégulier, le ventre paresseux, le sommeil difficile; elle éprouvait des saccades, des palpitations douloureuses, qu'elle comparait aux oscillations d'une corde alternativement tendue et relâchée; des faiblesses, des éblouissemens, des douleurs vagues, et une inquiétude habituelle, qu'augmentaient de fréquentes contrariétés morales. Tantôt elle craignait d'avoir des vers ou une affection de la rate, tantôt elle s'imaginait qu'elle allait devenir folle; le plus souvent c'était une maladie du cœur et une hydropisie de poitrine dont elle se croyait affectée. Je la rassurais de mon mieux, en lui protestant que tous ces accidens dépendaient d'une sensibilité nerveuse exaltée, d'un estomac très-débile par suite des affections morales, et d'une vie trop sédentaire; mes consolations devinrent un besoin pour elle; mais aussitôt mon départ ses inquiétudes la désolaient de nouveau. De plus, je lui conseillai l'usage du sirop anti-scorbutique le matin à jeun, un mélange de rhubarbe, de magnésie et de cachou en poudre avant dîner; une décoction légère de racine de patience fraîche, dont elle buvait même à ses repas avec un filet de vin, ou qu'elle alternait avec la bière; dans le jour, cinq ou six pastilles soufrées; enfin, pour le soir, une potion calmante avec un demi-

grain d'opium gommeux, et ʒ j de sirop d'éther. Elle en prenait en outre une cuillerée toutes les fois que sa sensibilité était trop excitée.

J'insistai spécialement sur la nécessité d'une vie active, d'un exercice journalier, et de tous les moyens de diversion. Les promenades devinrent bientôt de plus en plus fréquentes; on les alternait avec le spectacle et d'autres sujets de distraction. Plusieurs fois je fus obligé de modifier le traitement, dont les bases restèrent les mêmes. L'affection dartreuse diminuant d'une manière sensible, je remplaçai la rhubarbe, qui était désagréable, par une petite dose de poudre de quinquina, que j'augmentai par la suite. Les sucs d'herbes, les bains tièdes de temps à autre pendant l'hiver, et quelques bains de rivière lors des grandes chaleurs de l'été, lui furent recommandés; plus tard je proposai également un voyage à Barèges, qu'elle ne put entreprendre.

Cette dame, restant toujours sous l'empire des affections morales les plus pénibles, n'a jusqu'ici éprouvé qu'une amélioration sensible, et non une guérison parfaite.

Autre exemple d'Hypocondrie compliquée de dartres.

M. D**, âgé de cinquante ans, et né de parens sains, fut doué d'une fort bonne constitution, et conserva long-temps une santé parfaite; mais

un genre de vie très-irrégulier, l'habitude de la bonne chère, l'abus des plaisirs, et les travaux du cabinet, y portèrent enfin atteinte. Les digestions s'exécutaient avec moins de facilité que de coutume, les hypocondres étaient tendus. M. D** était tourmenté par des vents, des borborygmes, et une constipation habituelle. Au bout de quelques mois, il se joignit à ces premiers accidens de nouveaux symptômes, des étourdissemens, des palpitations, des frayeurs paniques relatives à sa santé ou à son existence. Ce malade ayant subi plusieurs traitemens mercuriels, accusait le métal qui en fait la base d'être une des principales causes de tous ses accidens; il lui semblait voir l'effet de ce médicament dans la plupart des phénomènes qu'il éprouvait. Vers la même époque il se manifesta, sur le cuir chevelu, des croûtes farineuses et furfuracées, des croûtes pustuleuses sur les deux avant-bras et sur la crète du tibia, avec prurit très-incommode. Les principaux moyens mis en usage furent les bains tièdes ordinaires, puis les bains sulfureux, le sirop de quinquina et de rhubarbe mélangé, les pastilles soufrées, les boissons amères, un régime composé de viandes saines, et surtout de légumes herbacés, auquel on ajouta la bière bien fermentée, l'eau rougie, et le vin pur pris avec modération. On seconda ces agens par un exercice régulier et de fréquentes promenades à

cheval. L'une et l'autre maladie sont maintenant diminuées d'une manière sensible. On se propose, au printemps, d'employer les sucs d'herbes, l'usage du lait coupé avec une eau sulfureuse, etc. etc.

L'hypocondrie peut-elle parfois favoriser le développement des affections paralytiques, surtout chez les individus qui y sont très-disposés par leur constitution ou par une propension héréditaire? C'est un doute que l'observation qui suit peut contribuer à éclaircir.

Un homme âgé de cinquante-deux ans, né de parens qui furent disposés à l'hypocondrie, et dont le père mourut apoplectique après trois attaques successives, parvint jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans sans avoir éprouvé dans son état de santé habituelle aucun dérangement notable, et même sans avoir jamais commis aucun excès.

Peu après la fatale journée du 10 août 1792, dont il fut vivement affecté, il ressentit une sorte de contraction violente, de resserrement involontaire, tant à la poitrine qu'à la partie inférieure de la région abdominale. Ces premiers accidens se renouvelèrent avec plus de force lors des événemens déplorables des 2 et 3 septembre de la même année; il éprouvait fréquemment de l'embarras vers l'estomac, des borborygmes, des douleurs tantôt fixes, tantôt vagues; son appétit

diminua ; son sommeil était agité ; et dès qu'il voulait se reposer, il était pris d'un malaise qui l'obligeait à marcher ou à se tenir debout, afin d'être soulagé.

Depuis 1793 jusqu'en 1797, il rendit beaucoup d'ascarides, sans qu'il en résultat aucun soulagement. Il prit dans cet intervalle beaucoup de remèdes, et quatre-vingts bains tièdes, qui ne changèrent rien à sa position.

Au mois de février 1798, étant encore au lit entre six et sept heures du matin, il s'aperçut que le côté gauche du visage avait perdu de sa sensibilité naturelle, et que le bras et la jambe correspondans étaient frappés de paralysie ; avec beaucoup de peine, et à l'aide d'un bâton, il put faire quelques pas pour appeler du secours. On lui fit prendre de l'eau de Cologne ; on lui frictionna le visage et tout le corps avec divers spiritueux. Le médecin lui prescrivit l'émétique, auquel il joignit le vésicatoire et les frictions usitées. Ces moyens ne furent pas sans effet, mais le malade dut à l'électricité, employée pendant six semaines, l'usage de ses membres ; il ne lui resta qu'un peu de gêne dans l'articulation, un léger embarras à l'œil gauche et vers la langue, et un fourmillement à l'extrémité des doigts. Enfin on lui mit au bras un cautère, qui parut dissiper la roideur des articulations. Au printemps de 1798, cet individu éprouvait des spasmes, de l'oppres-

sion, de la difficulté à respirer, et toujours des douleurs : il lui semblait que tous les viscères abdominaux étaient abandonnés à leur propre poids, et qu'ils tiraillaient l'estomac, ce qui rendait la marche difficile, et lui faisait préférer le repos, surtout celui du lit. Telle est l'analyse du mémoire à consulter qui fut rédigé par le malade, auquel j'adressai une consultation, dont j'ignore le résultat.

Dans l'observation précédente, nous avons vu une disposition vermineuse accidentelle; dans la suivante, nous verrons la complication du tænia et de l'hypocondrie.

Un homme âgé de trente-huit ans, doué d'une bonne constitution, éprouvait depuis deux ans des coliques, du malaise, un appétit bizarre, et autres symptômes dont il ne pouvait connaître la cause. Sur ces entrefaites, il aperçoit dans ses garde-robes des portions du vers solitaire. Différens traitemens furent dirigés avec peu de succès contre cette maladie, puisqu'il ne fut pas entièrement guéri ; cependant il rendit de nombreuses portions de ce vers, et même une tête. L'abus des médicamens, et un pronostic mortel prononcé inconsidérément devant le malade, lui occasionnèrent les inquiétudes les plus vives, et par suite une hypocondrie des mieux caractérisées. Les digestions devinrent dès-lors plus difficiles ; des vents, des borborygmes le tourmen-

taient continuellement; il s'y joignit des maux de tête irréguliers, une pesanteur habituelle; des étourdissemens, des tintemens d'oreille, des palpitations, parfois de la toux et de l'oppression, enfin des engourdissemens dans les membres; du reste, la physionomie était peu altérée, l'embonpoint très-bien conservé, mais le malade, singulièrement effrayé de son état, craignait tantôt de tomber en consomption, tantôt d'être attaqué de la poitrine; d'autres fois il prenait pour les indices d'un squirrhe au pylore les symptômes produits par le dérangement qu'éprouvaient ses digestions. A des époques fort éloignées, il rendait encore des portions du vers solitaire, et restait toujours en proie aux inquiétudes les plus variées, et aux symptômes nerveux les plus bizarres. Il était surtout tourmenté par la crainte des ravages que devait produire sur son économie le mercure dont il avait fait usage à plusieurs reprises; parfois il s'imaginait le sentir circulant dans ses veines, et l'accusait de tous ses maux.

Nous bornons ici l'examen des complications les plus notables de l'hypocondrie, que nous eussions pu étendre bien davantage, si seulement nous avions voulu passer en revue les maladies qui se joignent accidentellement à cette névrose. Mais nous avons pensé qu'il était plus convenable d'examiner particulièrement les complica-

tions qui ont avec elle des rapports bien directs, soit par l'analogie de leur nature, comme l'hystérie et la mélancolie, soit par l'identité apparente de leurs siéges, comme les phlegmasies et les lésions organiques des viscères abdominaux; soit enfin par la fréquence de leur réunion, ou une influence, soit spéciale, soit réciproque.

Nous avons cru surtout devoir exposer ces diverses complications, et les différentes circonstances qui pourraient induire les praticiens en erreur dans le diagnostic de cette névrose, afin de faire sentir combien il importe de considérer les maladies d'une manière analytique, seul moyen d'éviter de nombreuses méprises.

« L'analyse, dit Condillac, est l'unique méthode » et doit être la même dans toutes nos études ; » car étudier des sciences différentes n'est pas » changer de méthode, mais appliquer la même » méthode à des objets différens ».

Il en est de l'étude des maladies comme de celle des plantes ; leurs fréquentes analogies sont loin d'en prouver l'identité, et n'empêchent point l'observateur exact et profond de leur assigner des caractères distinctifs qui facilitent le diagnostic, et assurent la marche du praticien dans l'application des moyens curatifs.

Les symptômes sont aux maladies ce que les feuilles et les fruits sont aux plantes : *Symptomata se habent ad morbum ut folia et fœtura ad plan-*

tam. Linnée. Et c'est l'analyse qui nous apprend à apprécier les différens symptômes suivant leur valeur réelle, à rattacher à une affection ceux qui lui appartiennent, et à en séparer ceux qui lui sont étrangers. Voyons maintenant la marche à suivre pour distinguer une maladie de celles qui s'en rapprochent, et pour reconnaître son état de simplicité ou de complication, enfin pour établir le diagnostic.

CHAPITRE VIII.

Diagnostic de l'Hypocondrie.

Le jugement que le médecin doit prononcer sur la nature et le caractère d'une maladie est souvent une des opérations les plus épineuses et les plus importantes de la science médicale; en effet, c'est de la justesse de son opinion à cet égard que dépend presque toujours le succès de son entreprise, la guérison du malade, ou au moins le choix du traitement le plus convenable. Cherchons donc à établir les règles qui sont propres à guider le médecin, lorsqu'il juge la nature d'une affection soumise à son observation; mais d'abord félicitons-nous de l'immense avantage qui résulte pour la connaissance des maladies, de leur étude et de leur division d'après l'analogie qu'elles présentent dans leurs phénomènes sensibles et leur marche, et suivant qu'elles appartiennent à tel système ou à tel organe; combien

cette manière de procéder à leur diagnostic, qui repose sur des bases fixes et invariables, l'emporte sur le vague et l'arbitraire, qui autrefois ne présidaient que trop souvent à leur classification, ou plutôt à leur dénomination.

Deux méthodes peuvent être appliquées avec un égal succès au diagnostic des maladies : la première, c'est l'analyse, l'appréciation des symptômes que présente un malade; la seconde, c'est la méthode d'exclusion par laquelle on s'efforce de distinguer une maladie au milieu des diverses affections avec lesquelles on pourrait la confondre par suite d'analogies ou de similitudes spécieuses, mais non réelles.

Ainsi donc, le médecin soigneux de recueillir tous les renseignemens s'informe de ce qui a précédé le désordre morbifique, examine l'âge du malade, sa profession ou ses habitudes, son sexe, son tempérament, recherche la cause de la maladie, en remarque la date, les premiers accidens, les progrès, la marche, les symptômes caractéristiques, son état de simplicité, ou ses complications, enfin les moyens qui ont été mis en usage, et leurs résultats. Il devra toujours aussi se tenir en garde contre une précipitation ou une prévention inconvenantes.

Un autre point capital pour bien asseoir un jugement, c'est l'art d'attacher à chaque symptôme la valeur qu'il mérite; ce précepte est

surtout applicable au diagnostic de l'affection qui nous occupe, dont les phénomènes les moins saillans réclament quelquefois toute notre attention; tandis que d'autres, prédominans, ou en apparence très-importans, ne méritent cependant pas d'être pris en aussi grande considération. Or, pour bien apprécier un symptôme, il y a deux manières de l'examiner : on le considère d'abord isolément, puis on le réunit mentalement avec tous les autres symptômes qui se présentent, ou même avec d'autres qui n'existent pas, mais qui pourraient se rencontrer dans un cas analogue.

Faisons maintenant l'application de ce procédé au sujet qui nous occupe.

Quand un malade nous offrira un ensemble de phénomènes qui semblera démontrer une névrose des fonctions digestives, nous joindrons aux renseignemens recueillis, comme nous l'avons indiqué précédemment, un examen plus approfondi. Si le développement de la maladie s'est opéré lentement, si elle a succédé à l'une des causes spéciales de l'hypocondrie, les chagrins, les travaux du cabinet, la vie sédentaire, le dérangement des hémorrhagies, etc. etc.; s'il existe un trouble habituel dans le système digestif ou dans la digestion; si la sensibilité générale est exaltée; si le moral est inquiet, etc., nous serons très-disposés à reconnaître une vésanie hypocondriaque, surtout si le malade est dans l'âge favo-

rable au développement de ces affections. Il faut en outre se rappeler que les personnes qui sont atteintes de cette névrose ont, sinon une voix particulière, du moins un ton, un *modus dicendi* qui leur est propre ; souvent elles parlent de leur état avec l'accent de la crainte, de la terreur ou du désespoir ; d'autres fois avec une chaleur, une exaltation remarquables ; fréquemment encore, elles s'appesantissent gravement sur les moindres détails, et abondent en remarques, en observations, en commentaires ; elles assignent fréquemment aux accidens qu'elles éprouvent un grand nombre de causes, de siéges et de combinaisons inextricables ; de plus, elles sont en proie à des souffrances si variées et si multipliées, qu'elles craignent successivement ou simultanément un grand nombre de maladies. Enfin, quand l'affection nerveuse s'est ainsi propagée, lorsqu'elle exerce sur l'imagination un tel empire, les symptômes locaux, comme nous l'avons précédemment annoncé, peuvent être masqués ou très-affaiblis.

Pour ne pas se méprendre sur cette affection, il faut encore se bien représenter l'ensemble des phénomènes qui lui sont propres, et surtout les signes primordiaux ; car, nous le répétons, il n'est aucun de ses accidens ou symptômes pris isolément qui ne puisse quelquefois manquer, tant cette vésanie présente de différences et de

variétés. Qu'on se persuade bien que chaque hypocondrie a ses nuances particulières ; elles varient comme les physionomies individuelles ; toutes ont à peu près les mêmes traits : mais les nuances, les variétés sont si nombreuses, qu'aucune ne ressemble parfaitement à une autre ; les signes pathognomoniques forment les vrais caractères distinctifs ; ils sont en quelque sorte à la maladie ce que les traits sont à la figure. On doit les puiser, en général, dans l'altération des propriétés vitales de l'organe affecté ou des parties compromises, ou enfin dans la lésion du tissu organique, pour certains cas de complication ; de même on découvrira les symptômes accessoires dans les résultats de l'accord qui lie tous les points de l'organisation ; en un mot, dans les phénomènes sympathiques.

Telles sont les principales considérations que nous fournit la méthode de l'analyse ; voyons maintenant la méthode d'exclusion.

Après avoir procédé à la connaissance d'une maladie avec l'esprit d'ordre et d'observation que nous venons d'exposer, il convient que le médecin examine avec une égale attention si l'ensemble des phénomènes n'appartient pas plutôt à une autre affection : souvent cette recherche ultérieure confirme le premier jugement qu'il a porté, ou, dans d'autres cas, l'en fait revenir en l'éclairant sur la nature véritable de la maladie qu'il avait étudiée.

Le tableau comparatif des points de contact qui rapprochent cette maladie d'une autre qui lui est analogue, et l'étude des traits qui l'en font différer, peut donc encore fournir au médecin des renseignemens précieux; c'est cette méthode d'exclusion que *Dreyssig* a exposée dans son ouvrage sur le diagnostic médical, dont la traduction et les commentaires honorent notre collègue le docteur *Renauldin* (1). Long-temps avant que cet ouvrage parût en France, nous avions adopté la même marche dans une dissertation sur l'hypocondrie, que nous avions soigneusement isolée des diverses maladies avec lesquelles on l'a confondue le plus souvent.

Mais il ne faut pas, comme *Dreyssig*, se borner au seul parallèle de deux maladies; pour tirer tout le parti possible de cette opération comparative, il faut l'étendre aux diverses affections qui peuvent, par un ensemble spécieux de symptômes analogues, donner lieu à des méprises dans le diagnostic. Nous exposerons cette manière de

(1) Toutefois on regrette, en lisant ce Traité, de n'y trouver aucune vue générale, et d'y apercevoir des omissions importantes; c'est ainsi que le médecin allemand garde un silence absolu sur le diagnostic des maladies nerveuses, des affections cutanées, siphilitiques, etc. etc. Malgré ces lacunes, qui rendent l'ouvrage incomplet, on ne peut disconvenir qu'il ne contienne des considérations importantes, et que sa publication ne soit susceptible d'une grande utilité.

procéder à la confrontation des maladies avec beaucoup de développement, en comparant l'hypocondrie avec l'hystérie, parce que plusieurs médecins les ont considérées comme une seule et même névrose, et parce qu'on peut alléguer à l'appui de cette opinion, d'ailleurs erronée, des raisons plus ou moins spécieuses et des autorités imposantes. Nous suivrons la même route pour séparer de la mélancolie l'affection hypocondriaque, et nous apporterons également tous nos soins à bien distinguer celle-ci des phlegmasies chroniques abdominales, avec lesquelles on a pu quelquefois la confondre, et qu'on a bien plus souvent encore méconnues, en ne les distinguant pas de cette névrose, lorsqu'elles venaient la compliquer. Le tableau comparatif des autres maladies sera d'autant moins détaillé, que la méprise sera plus rare, ou plus difficile à commettre.

En demontrant les rapports qui existent entre ces diverses affections, leurs analogies et leurs traits distinctifs, nous ferons connaître les circonstances qui ont favorisé ces méprises, et les moyens d'éviter l'erreur résulteront de ces divers parallèles (1). Sur de telles bases, on peut

(1) Ces divers parallèles nous exposeront à des répétitions obligées; mais nous espérons qu'on nous les pardonnera, si cet inconvénient tourne au profit de la science.

espérer d'établir le plus souvent un bon jugement, un diagnostic non erroné.

PREMIÈRE SECTION.

Différences de l'Hypocondrie et de l'Hystérie.

Pour mieux parvenir à la connaissance précise de ces deux maladies, nous suivrons les différences qu'elles présentent dans leurs causes, leur marche, leurs complications, leurs terminaisons, et dans les moyens curatifs qu'on y oppose le plus généralement; enfin, dans les résultats que ceux-ci obtiennent.

En général, les dispositions sont les mêmes: dans les deux cas, sensibilité vive au physique comme au moral : toutefois certaines circonstances sont propres à l'hystérie, telles que l'époque de la puberté, l'âge critique, et surtout le développement précoce d'une imagination ardente, une continence absolue, volontaire ou forcée. Les causes déterminantes diffèrent davantage : le plus souvent l'hypocondrie succède à la vie sédentaire, aux travaux forcés et continus du cabinet, et aux affections pénibles de l'âme. Les deux premières causes sont avec raison citées par le médecin de Lausanne, comme les deux sources principales de cette vésanie; et c'est aussi pour cela qu'*Hoffmann* l'appelait la maladie des gens de lettres; tandis que l'hystérie tient le plus souvent

au trouble des lois impérieuses de la reproduction, et surtout aux chagrins que produit la passion de l'amour. Mais voyons plus en détail l'influence des autres agens, et d'abord annonçons que les causes de l'hypocondrie sont beaucoup plus nombreuses et plus variées que celles des névroses utérines, et qu'elle sévit contre un bien plus grand nombre d'individus; nous n'hésitons même pas à affirmer qu'on rencontrera dix personnes hypocondriaques contre une hystérique.

Pressavin, dans son judicieux Traité, rapporte avoir souvent observé des femmes de la campagne d'une très-forte constitution, et sans aucune disposition à l'hypocondrie, qui étaient cruellement tourmentées par des accès hystériques. Toutefois les jeunes paysannes qui sont habituées depuis long-temps à une vie très-active et pénible y échappent le plus ordinairement.

Celles au contraire dont la vie est plus douce, qui habitent les environs d'une grande ville, dont l'imagination est familiarisée avec des idées lascives ou des spectacles voluptueux, dont le tempérament est ardent et impérieux, sont parfois exposées aux vapeurs hystériques, soit par le développement du système utérin, les affections morales ou les aberrations menstruelles.

La névrose des organes digestifs est extrêmement rare parmi les habitans de la campagne; cependant elle ne leur est pas absolument étran-

gère, quand, par une circonstance quelconque, leur genre de vie les rapproche de celui des citadins : je suis même porté à croire que les affections tristes de l'âme, qui déterminent plus fréquemment chez eux des lésions organiques, peuvent aussi leur occasionner cette vésanie.

Celle-ci attaque particulièrement les adultes, tandis que l'hystérie survient spécialement à deux époques éloignées. Un relevé des observations que renferment les consultations d'*Hoffmann* nous donne le résultat suivant : sur onze affections hystériques, cinq se rapportent aux approches de la puberté, et cinq à l'âge critique; une seule se déclara vers l'âge de vingt-un ans. En examinant l'invasion des maladies hypocondriaques rapportées par ce même auteur, nous trouvons que, sur seize observations d'hypocondrie, une seule se manifesta dès l'âge de vingt-deux ans, les quinze autres roulent depuis trente jusqu'à quarante et cinquante ans. L'hypocondrie, comparée à l'hystérie, sous le rapport de l'influence qu'exercent à leur égard les différens âges, nous fournit encore une autre considération : ainsi elle ne se rencontre que très-rarement chez les jeunes vierges, qui sont si susceptibles des affections hystériques, ou chez les jeunes femmes, presque toujours exemptes des névroses utérines; on l'observe principalement chez les personnes du sexe qui avancent vers l'âge du re-

tour, et à ce sujet, celles qui restent demoiselles ou veuves y seront plus exposées, par suite du vide moral et des regrets dont le célibat est souvent la source; tandis que l'hystérie, abstraction faite des effets du mariage ou des jouissances anticipées de l'hymen, semble en quelque sorte limiter ses atteintes à l'époque où commence la plus grande fréquence des affections hypocondriaques. Toutefois les personnes du sexe, considérées en général, y sont bien moins sujettes que les hommes.

La femme, dont l'imagination active reçoit tant d'impressions légères et fugaces, est, par son caractère compatissant, appelée à remplir dans la société les devoirs les plus doux : elle ne connaît point en général ces passions orageuses, la colère, la haine, la passion du jeu, l'ambition, d'où dérivent si fréquemment les névroses des organes de la digestion.

« Les passions douces, dit *Roussel*, sont les plus » familières à la femme, parce qu'elles sont les » plus analogues à sa constitution physique; » l'attendrissement, la compassion, la bienveil- » lance, l'amour, sont les sentimens qu'elle » éprouve et qu'elle excite le plus souvent. Cha- » cun sent qu'une bouche faite pour sourire, que » des yeux tendres ou animés par la gaîté, que » des bras plus jolis que redoutables, et un son de » voix qui ne porte à l'âme que des impressions

» touchantes, ne sont pas faits pour s'allier avec » les passions haineuses et violentes ».

On observe une différence morale également remarquable chez les enfans dont les goûts varient suivant le sexe. *Achille*, caché à la cour de *Lycomède*, sous les habits de *Pyrrha*, trahit son déguisement, par le choix qu'il fait d'une épée entre tous les présens apportés par *Ulysse*.

Sensibilité, faiblesse, inconstance, tels sont les attributs qui caractérisent la femme : ces vers :

Malo me Galatea petit, lasciva puella,
Et fugit ad salices, et se cupit antè videri.
VIRG. *Eglog.* III.

nous donne la mesure de l'ambition naturelle à la femme, et de l'empire qu'elle veut exercer sur nous. Une fermeté inébranlable, une force bien supérieure, en rapport avec une sensibilité moins vive, sont en général le propre de l'homme :

Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinæ.
HOR. *Od.* III, *lib.* 3.

Celui-ci est en effet doué d'une sensibilité moins vive, et par conséquent moins disposé aux affections nerveuses; mais s'il ne prend pour guide que les écarts de son imagination, ou si, par la vie sédentaire et des contentions d'esprit trop prolongées il seconde les mauvais effets d'une éducation efféminée, il se rapproche bientôt de la constitution physique de la femme ; le tempéra-

ment nerveux prédomine ; et c'est ainsi que l'homme devient très-souvent passible des maladies hypocondriaques dont semblerait devoir l'éloigner sa constitution.

L'influence des températures n'est pas la même : les pays méridionaux et les saisons les plus chaudes influent, ainsi qu'un froid excessif, sur le développement de l'hypocondrie plus que sur l'invasion de l'hystérie, et ajoutent à l'intensité des symptômes hypocondriaques plus qu'aux phénomènes hystériques, qui peuvent cependant quelquefois être exaspérés par l'intensité de la chaleur, ou d'autres états de l'atmosphère.

La vie sédentaire produit très-souvent les névroses des organes digestifs ; elle peut concourir à prolonger la durée de l'hystérie; mais seule elle n'a peut-être jamais déterminé cette dernière maladie, au moins d'une manière directe. Toutes les professions qui obligent à un repos trop prolongé, ou qui nécessitent une situation pénible pour les organes digestifs, comme le métier de tailleur, de cordonnier, de chapelier, l'état de portier, sont autant de dispositions aux névroses de ces viscères, et n'influent que très-peu et très-indirectement sur la production des accidens hystériques.

Les névroses hypocondriaques sont l'apanage le plus ordinaire des professions où l'homme contracte l'habitude des contentions d'esprit trop

soutenues, et de celles où l'imagination est dans une sorte d'exaltation habituelle, circonstances également étrangères à l'hystérie, excepté chez un petit nombre de femmes artistes.

L'hypocondrie est une suite assez fréquente de l'excès de fatigues, des saignées trop réitérées, de l'abus des médicamens, des débilitans, des spiritueux, des irritans, des purgatifs, des préparations mercurielles, de tous les agens qui troublent, par une action directe ou immédiate, l'estomac et les intestins; tels sont encore les alimens grossiers ou les mets trop recherchés, leur trop grande variété ou quantité, l'abus des liqueurs alkooliques, du café, etc.; la privation absolue ou prolongée des boissons excitantes, enfin l'ivresse réitérée ou habituelle : de toutes ces causes, aucune ne nous semble avoir d'action sur le développement de l'hystérie. Si l'onanisme occasionne quelquefois cette dernière affection, il donne bien plus souvent naissance à l'hypocondrie; tel est du moins le résultat de notre observation particulière.

Les dérangemens de la transpiration, des sueurs habituelles aux pieds, etc.; la cessation d'une diarrhée, d'une leucorrhée, troublent beaucoup plus les organes de la digestion que le système utérin.

Les obstacles apportés dans les hémorrhagies habituelles n'ont pas une part égale à la produc-

tion de ces deux névroses; les approches, la rétention, la suppression ou la diminution des règles, et leur cessation naturelle, sont souvent l'origine de l'hystérie, et ne favorisent pas autant l'invasion de l'autre maladie; tandis que la suppression des hémorrhoïdes, qui est une source féconde d'affections hypocondriaques, n'a presque aucune influence sur le développement des névroses utérines. Enfin celles-ci se contractent quelquefois par une sorte d'imitation; les autres se communiquent par une espèce de contagion morale.

Résumé comparatif. Les causes physiques de l'hypocondrie sont, pour la plupart, des causes débilitantes, l'abus des médicamens, des délayans, des purgatifs, etc.; les déperditions excessives, les leucorrhées, l'onanisme, les diarrhées, mais surtout le dérangement des hémorrhagies et la vie sédentaire. L'hystérie dérive presque toujours de la continence, cause d'excitation. Les causes morales de l'hypocondrie sont, les travaux trop assidus du cabinet, les chagrins, la lecture des livres de médecine; tandis que celles de la névrose utérine sont presque toujours les peines du cœur, résultat d'un amour contrarié; mais la différence de ces deux maladies ressortira encore mieux du tableau de leurs divers phénomènes.

Dans l'hystérie, très-souvent, l'invasion est

subite, et la maladie marche brusquement : *Insultus paroxysmi frequenter subitaneus est in hystericâ passione.* (HYGMORE.) Quelquefois, au début, les fonctions de l'entendement sont suspendues, et à l'agitation convulsive se joint un léger délire. Le trouble commence ordinairement vers l'organe utérin, où il existe un mouvement obscur, une sorte de frémissement; de l'abdomen, un globe se porte vers l'épigastre, la poitrine et le col, et semble suivre tous les plexus nerveux de ces parties. Les parois abdominales se portent en arrière en se contractant. Le diaphragme est refoulé, les muscles de la poitrine entrent en convulsion, le thorax se resserre à son tour ; ce trouble se communique à l'organe central de la circulation ; dès-lors palpitations tumultueuses, resserrement spasmodique, ou constriction douloureuse vers la gorge; sentiment de strangulation avec craintes de suffocation, gonflement extraordinaire du cou, battemens tumultueux des artères carotides, mouvemens convulsifs des extrémités, et de tous les muscles de la vie extérieure, resserrement tétanique de la mâchoire inférieure : altération plus ou moins continue et prononcée des facultés intellectuelles; à la fin des accès, envies fréquentes d'uriner; urine abondante, claire et limpide, écoulemens muqueux ou spermatiques fournis par le vagin ou l'utérus, et accompagnés quelquefois d'une sensation vo-

luptueuse. Tous ces accidens sont, dans certains cas, portés dès le premier jour, dès la première heure, au *summum*, au plus haut degré de leur développement.

L'hypocondrie nous présente une autre série de faits non moins distincts : dans celle-ci, ordinairement, l'invasion est lente ; de nombreux phénomènes annoncent le désordre du système digestif ; la lenteur, le trouble des digestions préludent long-temps aux symptômes nerveux ; dès-lors contractions plutôt *tensives* que *convulsives* vers les hypocondres, tension et gonflement, par intervalles, de l'estomac, flatuosités intestinales, dégagement de gaz, crachotement de mucosités. Après un laps de temps plus ou moins variable, de nouveaux progrès se manifestent, et par suite la maladie n'est plus bornée à l'abdomen : dès-lors anxiétés précordiales, palpitations nerveuses, douleurs vagues, et engourdissemens dans les membres, terreurs paniques, presque toujours relatives à la santé, maux imaginaires, ou plutôt exagérés. Les symptômes, en général beaucoup plus nombreux, et surtout plus variables, se succèdent lentement, et ne parviennent ordinairement à leur plus haut période qu'après plusieurs années. Rarement observe-t-on le resserrement de la gorge ; encore cet étranglement diffère de celui des hystériques, parce qu'il est accidentel, et ne s'élève presque jamais

de l'hypogastre. Cet état se soutient plus ou moins long-temps au même degré, s'aggrave par les variations de l'atmosphère, par les affections morales, et offre des espèces de paroxysmes, quelquefois aussi une légère rémission; tandis que dans l'hystérie nous voyons une marche rapide, des accès très-violens, portés même quelquefois jusqu'à l'état de mort apparente, courts dans leur durée, se terminant si rapidement, que d'une heure à l'autre les malades passent le plus souvent d'un état qui paraissait très-effrayant à une santé plus ou moins parfaite, comme on peut s'en assurer par les deux observations rapportées ci-après.

La froide immobilité des traits, même durant les paroxysmes de l'hypocondrie, contraste avec la physionomie convulsive que présentent les femmes pendant leurs accès hystériques : ceux-ci sont souvent exaspérés par les affections morales, par l'approche et le cours des règles, et surtout par leur dérangement.

On ne peut, dans l'hypocondrie, diminuer les attaques nerveuses comme par enchantement, tandis que les accès d'hystérie cèdent parfois de suite à la sensation produite par la musique vocale, à la compression des carotides, à l'inspiration des odeurs fétides, et surtout à cette pratique honteuse dont *Sauvages* a fait mention.

Chez quelques femmes très-nerveuses, les accès sont assez rapprochés; mais ils sont ordinaire-

ment séparés par des intervalles plus ou moins longs, pendant lesquels il y a cessation des phénomènes de la maladie; de sorte que l'on pourrait, jusqu'à un certain point, comparer l'hypocondrie à une maladie rémittente, c'est-à-dire, continue avec des redoublemens modérés, et l'hystérie à une affection intermittente, distincte par un calme plus ou moins long, et des retours irréguliers et plus ou moins violens.

S'il est vrai que l'on remarque, chez quelques femmes hystériques, un malaise peu prononcé dans les fonctions digestives, c'est un phénomène accessoire, sauf les cas de complication ou d'hystérie hypocondriaque; et il est également conforme à l'observation d'affirmer que le trouble des digestions, ou l'affection des organes abdominaux et de la sensibilité générale sont constans, et beaucoup plus intenses dans l'hypocondrie.

Les sensations erronées ou exagérées, plutôt que les maux imaginaires; les terreurs paniques, les gonflemens irréguliers de l'épigastre et des hypocondres, les engorgemens et les douleurs de l'hypocondre gauche, n'appartiennent qu'aux affections hypocondriaques : *In sinistro præcipuè magis familiariter quàm dextro latere solitum.* (Michael. Alberti Diss.) *Tales dolores sinistro imprimis lateri hypocondriorum insidentes.* Dans celles-ci les accidens sont mobiles, peu stables :

Sed vagis magis quàm stabilibus pathematibus molestum. (MICHAEL. Alberti.) De même le clou et le globe hystériques, la perte de la parole, la suspension presque totale des fonctions de l'entendement, les mouvemens convulsifs, le sentiment de strangulation avec crainte de suffocation, la *rétraction* de l'abdomen, le gonflement du cou, le resserrement tétanique de la bouche, sont les symptômes spéciaux de l'hystérie. Dans celle-ci le sommeil est bien moins troublé, ou seulement agité par des rêves voluptueux. Si quelquefois, lorsque l'hypocondrie est ancienne et a amené le malade à un état voisin du marasme, il survient des syncopes, ce qui est on ne peut plus rare, la respiration alors est suspendue; dans l'hystérie, elle est seulement insensible; quelquefois, au contraire, elle ne s'opère qu'à de longs intervalles et par soupirs. La syncope, dans le premier cas, est marquée par la suspension de la circulation, et n'est point accompagnée ni suivie de cette vive excitation nerveuse, de ces palpitations, de ces mouvemens convulsifs, de ce trismus, qui se remarquent ordinairement dans l'hystérie. On objectera peut-être que la syncope de certaines femmes hystériques a été portée jusqu'à l'état de mort apparente; mais cette circonstance est tellement rare, qu'elle forme plutôt une exception qu'un des symptômes caractéristiques de la maladie.

L'auteur de l'article Hystérie, dans l'*Encyclopédie méthodique*, nous indique un moyen qui peut aider à faire distinguer ces deux maladies. Dans l'hystérie, dit-il, une légère compression sur la région épigastrique apporte un soulagement marqué; tandis que, dans l'hypocondrie, elle augmente l'état pénible du malade, et notre propre expérience nous a fait reconnaître la justesse de cette observation, du moins dans quelques cas. Enfin, si l'hypocondrie et les névroses utérines reçoivent tour à tour une influence contraire ou avantageuse du dérangement, des anomalies et du cours régulier des menstrues, l'hystérie a cela de particulier, qu'elle n'est presque jamais modifiée, et en aucune manière, par le flux hémorrhoïdal. Celle-ci, offrant une marche rapide, étant plus accessible aux moyens de curation, se prolonge ordinairement beaucoup moins que l'affection hypocondriaque, dont les causes, plus durables en général, éloignent l'époque de la guérison, et doivent aggraver le pronostic.

L'hypocondrie, quoique très-susceptible de guérison, est cependant, d'après l'opinion presque unanime des auteurs, plus rebelle aux efforts de l'art que l'affection hystérique, et le traitement de ces deux maladies consiste principalement dans les moyens d'hygiène; mais il est susceptible de diverses modifications relatives

aux causes qui les ont produites. Ainsi l'hystérie cède presque toujours à l'union des sexes, surtout quand ce lien est conforme au vœu de la malade; tandis que ce moyen n'a communément aucune influence sur la marche de cette vésanie. De même un choix convenable de médicamens, l'exercice, une vie active et occupée, les moyens de diversion sont bien plus indispensables pour la guérison des personnes affectées d'hypocondrie que pour celle des femmes hystériques, qui toutefois, dans quelques cas, peuvent aussi en retirer de grands avantages.

Le traitement des deux maladies varie en outre quant au choix des moyens et quant à leurs résultats; ainsi, par exemple, les sangsues, si efficaces pour faire reparaître l'écoulement hémorrhoïdal chez un hypocondriaque, ne seront presque jamais conseillées dans les cas d'hystérie; ici on prescrit les saignées au pied, les sangsues aux jambes ou à la vulve pour rappeler les règles; car autant le flux hémorrhoïdal est utile aux hypocondriaques, autant le cours régulier des mois affaiblit le mal hystérique : *Sicut hæmorrhoïdum fluxus hypocondriacos insigniter sublevat, ità mensium fluxus ordinatus ad hystericum malum imminuendum multùm contribuit.* (Junker.) Il faut encore ajouter que la régularité des menstrues est souvent aussi d'un grand avantage chez les femmes hypocondriaques. Mais, de

plus, nous verrons qu'en général les médicamens intérieurs qui, administrés avec discernement et une confiance limitée, sont applicables à ces deux névroses, obtiennent plus souvent des effets avantageux dans l'hypocondrie, quoiqu'elle soit, considérée d'une manière absolue, d'un accès plus difficile que l'hystérie.

Les terminaisons et conversions de ces deux maladies sont différentes. L'une et l'autre se terminent ordinairement par le retour à la santé; mais, dans l'hypocondrie, la solution favorable est cependant plus rare et presque toujours plus lente : lorsqu'au contraire le mal persiste, soit par l'intensité ou la continuité des causes, soit par suite de soins mal dirigés, on doit craindre les phlegmasies aiguës et chroniques, et les lésions organiques des viscères abdominaux, le mélœna ou maladie noire, la mélancolie, les aliénations, le scorbut, la fièvre hectique, la phthisie pulmonaire, etc. L'hystérie change rarement de caractère : toutefois elle peut dégénérer en épilepsie, en manie érotique, en nymphomanie, en syncopes mortelles; la phthisie pulmonaire en est aussi, quoique plus rarement, le résultat.

L'affection hystérique ne fait périr qu'un très-petit nombre de malades, et plutôt par sa violence que par sa durée; tandis que les hypocondriaques sont plus souvent victimes de la

continuité de leur maladie, de ses mutations ou complications, que de son intensité.

Interrogeons l'anatomie sur les désordres qu'offrent les cadavres, et nous apprendrons que, même dans les lésions organiques consécutives aux deux maladies, la différence n'est pas moins tranchée; qu'ainsi, chez les hypocondriaques, on trouve des désorganisations dans le tissu des viscères abdominaux; tandis que, sur les personnes hystériques, les altérations ont été observées communément vers l'utérus ou ses annexes. Tout nous démontre donc que, dans l'hystérie, la matrice est l'organe affecté, et celui qui joue le principal rôle; tandis que, dans l'hypocondrie, l'estomac et le système digestif sont le siége spécial de cette vésanie, dont le principe réside dans une affection des propriétés vitales de ces organes, mais qui peut être aggravée par d'autres maladies du système abdominal, susceptibles d'entraîner la perte des malades.

Enfin l'analyse exacte des points d'analogie que présentent ces deux névroses n'offre rien qui puisse balancer les caractères distinctifs bien prononcés que met en évidence leur tableau comparatif.

Pour achever de faire connaître leurs différences, nous citerons quatre histoires particulières également simples : deux d'hystérie, et les

deux autres d'hypocondrie, joignant ainsi à l'appui du précepte l'autorité des faits.

Observation d'Hystérie simple.

Une jeune personne, élevée avec tous les soins et tous les égards que lui assuraient le physique et le moral le plus accompli, contracta, par suite d'une éducation bien dirigée, des mœurs douces et une vive sensibilité.

A douze ans, l'écoulement menstruel s'établit, se régularise avec abondance, et dix-huit mois se passent sans phénomènes remarquables.

Bientôt, séjour à la campagne, vie plus active, et, pendant les six mois de ce nouveau régime, rétention du tribut périodique, et cependant nulle altération dans son état de santé parfaite.

A quinze ans, amour concentré qu'elle n'ose s'avouer à elle-même, trouble intérieur, combats inutiles pour écarter une première impression : empire absolu de ce sentiment sur tout son être et sur tous ses sens ; mais courage vraiment héroïque, et ferme résolution de n'en faire l'aveu ni à celui qui en est l'objet, ni à ses parens, par la crainte d'affliger ceux dont elle était si justement chérie. Ce fut dans ces circonstances qu'elle reçut un coup violent à la tête : dans l'instant, suppression du flux menstruel, céphalalgie violente, face colorée, fréquence et force du pouls, malaise général.

Son âge, sa bonne santé habituelle, malgré ce trouble moral, et la crainte d'accidens cérébraux, me déterminèrent à faire pratiquer une saignée au pied, qui, dès le jour même, fut suivie du retour de la menstruation; mais, à la vue de l'objet aimé, perte de connaissance, sons plaintifs, pleurs involontaires; de temps à autre retour incomplet des fonctions des sens et de l'entendement : bientôt extinction totale, mais momentanée, des facultés intellectuelles; contractions désordonnées dans les membres supérieurs, élévation convulsive de la poitrine, palpitations violentes, resserrement spasmodique au cou, et sentiment de strangulation, précédé ou accompagné du globe hystérique; roideur comme tétanique de la mâchoire inférieure, ou convulsions des muscles qui l'environnent.

L'évacuation sexuelle parcourait ses périodes sans aucun trouble; mais, à chaque époque, exaltation manifeste de la sensibilité physique et morale.

Retours irréguliers des accès; vers leur déclin, diminution progressive des symptômes, légère stupeur ou apparence de sommeil, retour du visage à son coloris naturel, qui conservait toujours l'empreinte d'une douce mélancolie, et une blancheur plus prononcée que dans l'état ordinaire. Au moral, douceur naturelle, apparence de calme, décence, discrétion, heureux

voile de la nature la plus troublée. Du reste, dans l'intervalle des accès, la santé était bonne.

Je reconnus la maladie, et j'osai même en soupçonner la cause; mais les parens éloignèrent mon soupçon, et je ne fus pas plus heureux auprès de ma jeune malade, qui me protesta qu'aucune affection morale ne déterminait les accidens qu'elle éprouvait.

Pour éviter l'erreur dans un cas semblable, il eût fallu le discernement du médecin *Érasistrate;* aussi je crus m'être trompé. L'emploi des anti-spasmodiques légers, la promenade, l'air de la campagne, ne diminuèrent que faiblement les phénomènes de la maladie; mais un incident vient changer la scène, et l'espérance d'obtenir le consentement de sa famille, et de voir ses vœux accomplis, la détermine à faire à ses parens et à ce jeune homme l'aveu de son amour. Les événemens politiques retardèrent le moment désiré et l'entière convalescence; mais enfin la condescendance des parens et le vœu de la nature rempli rendirent à la société une jeune personne qui en fit dès-lors le charme et l'ornement (1).

---

(1) Cette histoire particulière n'a d'autre mérite que celui d'une grande exactitude : elle a été reproduite mot à mot dans une thèse publiée sur l'hystérie, en 1808, par un jeune médecin, dont je tais ici le nom, et qui, sans indiquer les sources où il avait puisé, a fait de nombreux emprunts à l'excellente dissertation de M. *Duvernoy*, sur la même ma-

Cette observation est conforme à la marche que suit le plus souvent la névrose utérine; dans le fait suivant, nous reconnaîtrons également, malgré les anomalies qu'il présente, l'hystérie plutôt que la vésanie hypocondriaque.

Une jeune personne, à peine nubile, et dont les menstrues coulaient irrégulièrement, éprouva, par suite de ce dérangement, des convulsions; celles-ci revenaient chaque jour à des intervalles très-rapprochés, avec douleur des lombes, rétraction du ventre et de l'ombilic, constipation, tremblement, distension des membres, gêne de la respiration, mouvemens convulsifs des yeux, qui étaient portés en tous sens, avec une telle vitesse et véhémence, qu'on avait peine à les distinguer. La tête était entraînée en bas et vers les côtés, et les artères battaient avec force. Elle ne tombait pas à terre, mais elle s'asseyait, puis se levait, et pirouettait avec une célérité incroyable lorsqu'on voulait la retenir. Pendant la durée de son accès, dont elle avait le pressentiment, elle portait la parole dans la perfection, et ne ressentait aucune douleur de tête. Celui-ci fini, elle était gaie, et se portait fort bien. Les lavemens émolliens, les linimens nervins, la soula-

---

ladie, et à celle que je fis paraître en l'an XI sur l'hypocondrie. Je ne me plains pas de ce plagiat, mais je le signale, afin de prévenir l'erreur qu'il pourrait occasionner.

gèrent; mais les voyages, le changement de climat, un autre genre de vie, l'usage de l'eau substituée à la bière, dissipèrent peu à peu et complètement tout ce désordre aussi violent qu'extraordinaire.

Comparons maintenant des observations d'hypocondrie simple aux faits d'hystérie que nous venons d'exposer.

M. **, âgé de quarante-quatre ans, naquit de parens sains, et reçut en partage un tempérament sec et robuste, et une santé qui n'éprouva aucune altération sensible jusqu'en 1788. Forcé à cette époque de prendre une part très-active dans des assemblées fort orageuses, et souvent témoin d'événemens qui l'affectèrent vivement, il ne tarda pas à devenir malade sans en connaître la cause.

Premiers phénomènes de la maladie. Lenteur marquée dans les fonctions de l'estomac, digestions pénibles et laborieuses, éruption de vents, borborygmes, débilité presque générale dans tout le corps, embarras dans tous les mouvemens; bientôt nouveaux progrès, anxiétés précordiales, tensions spasmodiques, démarche incertaine, chute fréquente sur les genoux : son sommeil était tous les jours précédé d'une détente dans la tête, qui se répétait successivement, et dont le bruit produisait intérieurement le même effet qu'un coup de pistolet; le jour, il ne pouvait passer sur

un parquet ou devant une glace sans éprouver des inquiétudes et des frémissemens; à la promenade, la moindre descente lui présentait un précipice qu'il n'osait franchir.

Telle fut sa situation pendant plus de six mois : des médecins de Paris qu'il consulta lui firent quitter tous les médicamens, et abandonner tous les purgatifs qui n'avaient fait qu'irriter le mal, lui prescrivirent les bains, l'exercice, la distraction, et un régime tempéré.

Dès-lors cessation progressive des symptômes énoncés, retour successif à son état naturel, et bientôt guérison solide et confirmée par le séjour à la campagne, et l'exercice soutenu du jardinage pendant trois ans.

Appelé, sur la fin de l'an VIII, à une place sédentaire et très-importante, il se livra pendant onze mois à un travail excessif, et souvent pénible, de douze, quinze, seize heures par jour. Né avec une sensibilité extrême, jaloux d'être utile à son pays, et de lui procurer une tranquillité parfaite, il voulut tout voir par lui-même, et combattit avec courage tous les obstacles qui pouvaient contrarier ses intentions. Le zèle l'emporta sur la prudence, et malgré le retour des préludes de sa première maladie, il continua ses fonctions avec la même assiduité. Mais bientôt pesanteur de tête après le travail, bourdonnement insupportable, troubles variés dans les

fonctions digestives, instabilité dans la progression, gêne dans tous les mouvemens analogue à un état d'ivresse; bruit de détente au moment du sommeil, contractions spasmodiques vers la tête, le cœur et l'estomac; terreurs paniques souvent renouvelées; simulacre d'un manteau rhumatismal, qui occupait le dos, le bras et l'épaule; légère amélioration par la suspension de ses travaux, débilité générale, et surtout dans le côté gauche; station et quelquefois locomotion presque impossibles, tremblemens, frémissemens, vertiges considérables au moindre mouvement. Les viandes bouillies ou rôties étaient les seuls alimens qu'il pouvait souffrir. Après deux ou trois détentes avec éclat dans la tête, lorsqu'il était dans son lit, il recouvrait ses forces, et n'éprouvait aucun malaise; tous les accidens revenaient une demi-heure après son lever, se suspendaient en partie pendant la digestion de son dîner, pour reparaître de nouveau peu de temps après; mais constamment un jour meilleur que l'autre. Les temps froids et humides, les variations atmosphériques, de même que tous les événemens propres à exciter la sensibilité, exerçaient sur lui une influence remarquable, et augmentaient les accidens.

Les moyens employés furent l'usage des bains et cinq purgations, dont les deux premières semblèrent l'avoir un peu soulagé, mais dont les

trois autres l'affaiblirent beaucoup, lui firent perdre de son embonpoint, et aggravèrent les symptômes.

Encore une fois rebuté des remèdes, il les quitte entièrement, et partage son temps entre l'exercice et les travaux administratifs. Un soulagement marqué ne tarda pas à suivre ce changement de régime. C'est alors qu'il consulte à Paris un médecin distingué, dont les sages conseils sont malheureusement écartés. Le docteur ordinaire du malade, aveuglé par un fantôme d'humeur goutteuse, qu'il voulait combattre, ne lui laisse entrevoir de guérison solide que dans un nouveau traitement, lui prescrit, dans l'espace d'un mois, cinq ou six purgatifs, et lui fait même appliquer des sinapismes. *Plures sunt medici*, s'écrie le célèbre *Morgagni*, *qui ob id ægros interimunt quià nesciunt ipsi quiescere;* mais les symptômes d'hypocondrie acquirent alors une telle intensité, que le malade n'offrait plus que l'image d'un squelette ambulant, et ne pouvait soutenir sa tête dans une direction verticale.

Fatigué, excédé, harassé, il abandonne son médecin et ses médecines, pour suivre les avis sages du médecin de la capitale, quitte le séjour de la ville pour celui de la campagne, les travaux du cabinet pour ceux du jardinage, et à l'aide d'un bon régime, d'une société choisie, etc. il revient insensiblement à sa première santé.

Telle était la situation de ce malade à l'époque où l'observation fut rédigée.

Renforçons la teinte qui distingue ces deux névroses par la citation d'une affection hypocondriaque, observée chez une femme, et exempte de tout phénomène hystérique.

Mademoiselle M**, âgée de trente-quatre ans, reçut le jour de parens sains, et joignit à beaucoup de sensibilité un tempérament bilieux. Son caractère était tantôt très-mélancolique, tantôt extrêmement gai, selon que ses impressions participaient de la peine ou du plaisir.

A quatorze ans elle fut réglée, et devint mère à dix-neuf; jusqu'à cette époque elle avait joui d'une bonne santé. Quatre mois après sa couche, érysipèle dartreux qui se propage sur toute la figure, ensuite sur les yeux, et prive la malade de la vue, qu'elle recouvre à la suite de soins multipliés, et au bout de deux ans. Depuis lors elle contracte la gale, ce qui lui cause un violent chagrin, et en guérit à la suite d'un assez long traitement. Lors de sa dernière couche elle entreprend de nourrir son enfant, et est forcée d'y renoncer, parce qu'il survient une douleur au sein droit, mais sans augmentation de volume; mademoiselle M** s'en affecte beaucoup, et croit avoir un cancer; cependant des médicamens très-simples dissipent bientôt la cause de ses inquiétudes. Ici commence l'hypocondrie.

Depuis six mois elle était bien portante, lorsqu'une vive affection morale vint la troubler. Dès-lors éloignement pour toute société; isolement qui aggrave ses peines; sommeil interrompu par des rêves pénibles, perte de l'appétit, tension des hypocondres, flatuosités, sensation d'un poids considérable dans la région de l'estomac; constipation.

Elle ne consulte aucun médecin; mais dans l'espoir de soulager ses maux, elle lit avec avidité des ouvrages sur la médecine, et suivant qu'elle a lu la description de telle ou telle maladie, il lui semble en éprouver les différens symptômes dans les diverses régions de l'abdomen. Un jour elle prend un purgatif drastique, qui lui fait évacuer une grande quantité de matières muqueuses; aussitôt elle en conclut que son ventre est tapissé d'obstructions; le désespoir s'empare de son âme, et les règles qui jusque-là avaient bien coulé, s'arrêtent entièrement. Pendant six mois elle rêve aux moyens de se détruire : cependant elle craint la mort; et si elle s'arrête à un mode de destruction, aussitôt elle s'efforce d'en rendre l'exécution impossible.

Il y avait dix-huit mois que mademoiselle M**, abandonnée à elle-même, était en proie à ces accidens, qu'elle regardait comme au-dessus des ressources de l'art. Cependant un médecin, le docteur *Rey*, est appelé; cherchant à gagner sa

confiance, il feint d'adopter toutes ses idées, et parvient, non sans beaucoup de peine, à lui faire espérer que ses maux auront un terme : il l'engage à le seconder, en suivant avec exactitude ses conseils.

Des sangsues sont appliquées à la vulve pour rappeler les règles ; il établit un cautère à la cuisse ; il a recours en même temps aux antispasmodiques et à de doux laxatifs, et recommande surtout la confiance, le courage, toute espèce de distractions, et des promenades fréquentes, ou un séjour prolongé à la campagne. A l'aide de ce régime, mademoiselle M** obtient une très-grande amélioration.

Nous avons probablement rendu palpable ou au moins saillante la ligne de démarcation qui sépare ces deux névroses si généralement confondues dans ces temps modernes, et surtout dans le siècle précédent ; examinons maintenant les différences qui existent entre deux autres maladies, l'hypocondrie et la mélancolie ; il n'est pas moins important d'établir une distinction entre ces deux vésanies, car l'erreur dont leur diagnostic a été l'occasion, remonte en quelque sorte aux premiers âges de la science.

DEUXIÈME SECTION.

Caractères distinctifs de l'Hypocondrie et de la Mélancolie (1).

La mélancolie a été souvent confondue avec l'hypocondrie, malgré les définitions qu'en ont données *Arétée*, *Sennert*, *Boerhaave* et *Cullen*. Toutefois ces deux maladies diffèrent réellement l'une de l'autre. Ainsi leurs causes qui, au premier coup-d'œil, paraissent les mêmes, sont néanmoins distinctes sous bien des rapports.

La mélancolie, par exemple, est plus souvent héréditaire ; elle dépend plus fréquemment encore d'une disposition physique remarquable, soit une taille très-élevée ou l'excès contraire, soit un trait trop saillant, ou une difformité qui sont souvent l'occasion d'un délire mélancolique. Une éducation vicieuse, et surtout l'habitude de remplir la tête des enfans de contes, d'histoires de sorciers, de revenans, de diables, etc. les préparent de loin aux maladies de l'imagination. Les pays méridionaux, les chaleurs de l'été, les alimens trop excitans, l'habitude, même modé-

(1) Nous ne comprenons pas la mélancolie dans les maladies nerveuses, parce qu'elle fait partie, suivant nous, des aliénations mentales ; en effet, elle dépend d'une lésion partielle de l'imagination, et par conséquent se rattache beaucoup plus aux maladies de l'entendement qu'aux affections nerveuses proprement dites. *Voyez* au reste la préface.

rée, des liqueurs alkooliques, certaines professions, comme celles de poète, de musicien, de comédien; en un mot, tous les agens, toutes les circonstances propres à exalter l'imagination, sont principalement favorables aux lésions de cette faculté intellectuelle. Une sensibilité nerveuse très-prononcée favorise beaucoup moins l'invasion de la mélancolie que celle des affections hypocondriaques, mais aussi une extrême susceptibilité morale exerce une influence toute contraire.

L'hypocondrie provient fort ordinairement de la vie sédentaire et du dérangement de nos fonctions, de nos sécrétions, de l'onanisme, de nos hémorrhagies, qui n'ont pas une part aussi active au développement des affections mélancoliques. L'excès d'étude, et surtout les peines de l'âme, donnent souvent lieu à ces névroses digestives qui caractérisent l'hypocondrie, comme l'indiqueraient les corrélations sympathiques, si l'observation ne l'avait démontré. Cependant il est vrai de dire que les causes de la mélancolie sont encore plus morales : celle-ci tient parfois à une vanité prétendue philosophique, exemple, *J. J. Rousseau;* à un amour-propre démesuré, ou à quelques circonstances où ce grand mobile a été compromis. Elle est due, bien plus souvent que l'hypocondrie, à des craintes exagérées, ou même à des terreurs paniques; *Pascal,* les poètes

satiriques *Juvénal*, *Gilbert*, etc., à une ambition immodérée; témoins la plupart des grands conquérans; les remords sont une source féconde d'affections mélancoliques, et ne coopèrent presque jamais à l'hypocondrie. Exemple : *Théodoric*, *Caligula*, le misérable *Santerre*, qui voyait partout des gendarmes envoyés pour l'arrêter.

Les grands chagrins peuvent amener la mélancolie, mais ils déterminent bien plus souvent les névroses des organes de la digestion. Nous noterons encore les deux extrêmes dans la culture des facultés intellectuelles; ainsi des méditations trop continues, ou l'inaction mentale la plus absolue; de là vient que les plus beaux génies sont souvent mélancoliques sur la fin de leur carrière, et qu'on rencontre aussi beaucoup de ces malades parmi les paysans, les artisans, en un mot, parmi les hommes les plus bornés.

Tous les grands événemens politiques d'un siècle, les découvertes importantes, ou plutôt toutes les innovations les plus remarquables, qui forment autant de circonstances propres à exalter l'imagination, favorisent encore d'une manière spéciale et plus directe la naissance de la mélancolie, et même indépendamment des peines de l'âme ou des revers de la fortune.

Enfin l'influence des opinions religieuses, qui est presque nulle et très-indirecte sur la production de l'hypocondrie, contribue singulièrement

à l'invasion de cette maladie intellectuelle; aussi voit-on beaucoup de mélancolies ascétiques, et très-peu d'hypocondries, par cause religieuse: *Charles-Quint*, le *duc de Mazarin*, *Swedemborg*, etc. etc., sont des mélancoliques par religion.

En résumé, nous disons que si quelquefois les mêmes causes déterminent l'une et l'autre maladie, il est également vrai que l'hypocondrie est le plus souvent la conséquence des causes qui agissent particulièrement ou spécialement sur les nerfs qui vivifient les organes de la digestion, tandis que les affections mélancoliques sont ordinairement le résultat des mobiles, dont l'action tend à troubler l'intégrité de nos facultés intellectuelles, et surtout de l'imagination.

En poursuivant la recherche des différences qui existent entre ces deux maladies, nous en trouverons de plus tranchées encore dans leurs phénomènes respectifs. Ainsi nous avons vu dans l'hypocondrie un trouble manifeste, mais lent, des fonctions digestives, l'exaltation de la sensibilité générale, des aberrations légères et fugaces, des terreurs paniques relatives surtout à la santé, etc. etc. L'invasion de la mélancolie a lieu très-souvent d'une manière rapide ; il y a délire exclusif et permanent sur un objet particulier et sur une série d'idées qui s'y rattachent, une passion dominante, souvent une propension à la

jalousie sur les motifs les plus frivoles, etc. etc. Ajoutons à ces traits distinctifs propres à cette vésanie, l'intégrité des fonctions digestives qui, hors les cas de complication, ne sont jamais lésées, ou seulement par accident. L'imagination du mélancolique est comme l'aiguille aimantée; on veut en vain le détourner de sa passion dominante, c'est son point d'attraction auquel il revient toujours; tandis que l'imagination de l'hypocondriaque est obsédée par une foule d'idées disparates qui se succèdent souvent avec une rapidité étonnante.

On observe fréquemment chez les mélancoliques deux formes opposées que revêt leur maladie; c'est tantôt une bouffissure, un orgueil gigantesque, comme on le voit chez la plupart des prétendus prophètes, empereurs, rois, généraux, etc.; tantôt une timidité démesurée ou une habitude de craintes et de terreurs sans cesse renaissantes; telle était cette femme qui s'imaginait constamment être entourée de serpens: d'autres fois une tristesse constante, une morosité désespérante ou une gaîté folle, une joie aussi permanente qu'exagérée. Le fou d'Athènes, qui regardait comme sa propriété tous les vaisseaux du Pirée, était toujours dans l'ivresse du bonheur.

Il existe en outre une espèce distincte de mélancolie, caractérisée par un penchant très-pro-

noncé au suicide, que la raison ne surmonte que difficilement; chez les mélancoliques cette propension au meurtre de soi-même est souvent suivie de tentatives homicides, ou même d'entière exécution; tandis que, chez les hypocondriaques, on n'observe ordinairement que des velléités de mort ou de suicide (*Voyez* l'observation page 499, etc.); dans celle-ci surtout, que nous appelons *mélancolie morale*, les digestions continuent à s'exécuter régulièrement. En un mot, les diverses mélancolies sont une sorte de désorganisation intellectuelle ou morale, à laquelle nos fonctions vitales restent étrangères, ou ne participent qu'accidentellement.

Les terminaisons de l'hypocondrie diffèrent aussi de celles propres aux affections mélancoliques; la première se termine plus fréquemment par la réhabilitation des fonctions affectées; mais si la guérison de la mélancolie est plus rare, elle est quelquefois aussi plus rapide. Cette vésanie se complique rarement avec les phlegmasies de l'abdomen et avec les lésions des viscères qu'il renferme; elle s'associe plus souvent avec le penchant au suicide et avec la manie; aussi se termine-t-elle très-rarement d'une manière funeste. Qui ne conçoit qu'une altération partielle de l'entendement doit conduire facilement, et en quelque sorte naturellement, à une altération plus générale des facultés morales et intellectuelles;

tandis qu'un état habituel d'irritation nerveuse doit être, pour les viscères abdominaux, une disposition à leurs altérations organiques.

Le traitement de ces deux maladies présente aussi quelques différences générales : dans les affections hypocondriaques, le mode de curation peut être indiqué ou déterminé d'une manière précise; celui de la mélancolie est, en général, plus incertain. Aux premières on oppose quelquefois exclusivement les moyens d'hygiène, et les médicamens qui ne sont qu'accessoires dans le délire mélancolique : contre celui-ci on dirige souvent avec succès les facultés morales et intellectuelles, une sorte d'argumentation, qui ont aussi une application utile, mais moins fréquente, contre l'hypocondrie. Il faut souvent, afin de ramener à la raison le mélancolique, déraisonner avec lui, employer des subterfuges, etc. Enfin, pour mieux faire ressortir les oppositions qu'offrent ces deux maladies, nous allons en rapporter quelques observations (1).

---

(1) Nous avons cru ne pas devoir comprendre la mélancolie dans ce travail, mais nous espérons présenter plus tard un Essai sur les aliénations mentales, dont, selon nous, cette vésanie fait partie : en attendant, nous renvoyons au Mémoire sur la Mélancolie qu'a publié le docteur *Andry*, et qui fait également honneur à sa plume, à son érudition et à son cœur.

Mélancolie par frayeur.

Blaise Pascal naquit en 1623 d'une famille qui possédait, en Auvergne, des places distinguées, qu'elle honorait par ses vertus. Il annonça presque dès le berceau la célébrité précoce que justifia, dans la suite, une foule d'ouvrages qui attestent encore la supériorité de son génie. Une éducation soignée et des études prématurées développèrent en lui le goût exclusif des sciences les plus abstraites, et un travail opiniâtre altéra bientôt sa constitution physique, déjà faible et chancelante : dès-lors la santé de Pascal alla toujours en dépérissant, et cependant rien ne pouvait ralentir son ardeur pour l'étude. Après une longue absence, de retour au sein de sa famille, il partagea son temps entre la société et les méditations ; mais bientôt isolement pénible qui lui fait tout sacrifier aux travaux du cabinet, et par suite dépérissement sensible. Pour en arrêter les progrès, son médecin lui conseilla de se livrer à l'exercice de la promenade, et d'éviter toute contention d'esprit.

Pascal reparaît dans le monde; il y apporte de grands talens, de grandes vertus, et une célébrité bien acquise, mais en même temps un caractère mélancolique, une fierté naturelle, et le désir d'y être reçu avec l'indulgence qu'il accordait aux autres; il préférait déjà la société qu'il

s'était formée, à la solitude, et songeait même à s'y attacher par le lien conjugal; mais un événement mémorable dans l'histoire de sa vie vint donner à ses idées une tout autre direction.

Tous les jours Pascal se promenait dans les environs de Neuilly. Un soir, deux des chevaux de sa voiture prennent le mors aux dents, et s'élancent de l'emplacement du pont de Neuilly dans la Seine. La secousse, heureusement violente, rompit les traits qui joignaient le premier attelage au train de derrière, et la voiture resta sur le bord du précipice. Le malade ne fut point blessé, mais vivement effrayé, et une syncope qui dura très-long-temps fut le premier résultat de cette frayeur. On se représente facilement la commotion physique et morale que dut ressentir un homme faible et languissant.

Vers la même époque il éprouve, dans l'ombre de la nuit, une espèce de vision ou d'extase dont il conserva la mémoire dans un papier qu'il portait constamment sur lui (1), et que les uns ont regardé comme un amulette, et d'autres comme un modèle de vertus chrétiennes. La sensation du malheureux événement de Neuilly, sans cesse retracée dans son imagination, le troublait partout, surtout la nuit, au milieu de ses insomnies et de son dépérissement. *Il croyait toujours voir*

(1) Voyez la *Vie de Pascal*, par *Condorcet*.

un abîme à son côté gauche, et y faisait placer un siége pour se rassurer.

Je n'insisterai pas sur les caractères accessoires de sa mélancolie, sur *ses craintes, sa défiance*, ses scrupules, *sa passion dominante*, ou *sa dévotion minutieuse.*

Les propos consolans de l'amitié calmaient pour un moment ses alarmes, mais l'instant d'après Pascal revoyait le précipice ; toujours effrayé par ce même fantôme ou cet égarement de son imagination, et huit ans après ce fâcheux accident, Pascal mourut à l'âge de trente-neuf ans.

Observation de Mélancolie simple.

Un jeune homme âgé de vingt-cinq ans, d'un tempérament sanguin, de forte stature, et d'une santé robuste, vint en l'an VII à Paris pour continuer ses études. Peu avant son départ de la province, il eut une rixe particulière, et convint de se battre au pistolet. D'après l'événement du combat, ce jeune homme crut son honneur compromis, et ne quitta le champ de bataille qu'avec un ressentiment d'humiliation vif et concentré. Dans les premiers temps de son séjour à Paris, aucun trait ne lui échappa, aucune action, dis-je, propre à faire soupçonner la mélancolie, dont il ne tarda pas cependant à être atteint, et dont voici les caractères principaux : air sombre et

rêveur, regard farouche, taciturnité, recherche de la solitude, attention à éviter ses amis, propension à la défiance sur les motifs les plus frivoles, susceptibilité morale la plus exaltée, et délire exclusif sur un objet; tout ce qu'il voyait était fait à dessein de lui rappeler son prétendu affront, et tout individu qu'il rencontrait lui semblait un agresseur, un homme qui avait l'intention de l'outrager. L'éternuement, l'action de moucher, de tousser, le seul regard indélibéré d'un passant était un signal contre lui, une injure qu'il s'efforçait quelquefois de dévorer, et dont il concentrait l'impression ; l'abord prévenant d'un ami, et les témoignages de sa bienveillance, étaient souvent à ses yeux le sarcasme le plus amer, et le replongeaient dans la sphère circonscrite de son idée dominante.

Forcé de se trouver dans de nombreuses réunions de jeunes gens, c'est au milieu d'eux surtout qu'il renouvelait ses brusqueries, qu'il suscitait les scènes les plus désagréables, et qu'il s'abandonnait à l'impulsion irrésistible que lui imprimait son imagination effarouchée. Personne n'était à l'abri de ses reproches, pas même ses amis, assez occupés d'ailleurs à étouffer les querelles journalières qu'il élevait sans raison.

Un d'entre eux crut faire une heureuse diversion à ses idées mélancoliques en le conduisant au Théâtre français, où l'on donnait un des chefs-

d'œuvre de la scène. Au milieu de la pièce une actrice, fidèle à son rôle, éclate de rire, avec ce naturel qui caractérise le vrai talent; il en prend ombrage : Vois donc, dit-il à son ami, comme mademoiselle C** se moque de moi; et de suite il se lève, et sort brusquement de la salle.

Cet ami, dans lequel il avait beaucoup de confiance, espéra qu'en déraisonnant avec lui il le ramenerait à la raison, et lui fit l'aveu que réellement tout le monde se moquait de lui; mais ce stratagème, inventé dans de bons motifs, eut le plus mauvais succès, et ne servit qu'à le confirmer dans l'égarement de son imagination. Peu de temps après, à la suite d'une rixe, il se battit, et fut blessé. Son adversaire le félicita sur son courage, et lui dit qu'il l'avait pris pour un mouchard qui, la veille, avait arrêté un de ses amis. Cette indiscrétion le fortifia dans l'idée qu'il portait sur son visage des traits sinistres et particuliers, qui le rendaient l'objet de la dérision publique. Dès-lors exaltation orageuse de sa mélancolie, trouble et émotion involontaires à la vue de ses amis, penchant au suicide, empoisonnement avec l'opium, suivi de convulsions violentes, mais qui fut arrêté par le suc de citron, etc. J'observerai qu'il raisonnait avec sagacité sur tout objet étranger à ce qui concernait son amour-propre, qu'il n'éprouvait aucun trouble dans les fonctions de la vie intérieure, ni

enfin les anomalies nerveuses qui se remarquent dans l'hypocondrie.

Ne pouvant plus résister aux tourmens qu'il se créait tous les jours, il partit pour la campagne; là, entouré d'hommes qui ne le connaissaient pas, d'enfans dont il partageait les jeux, variant ses occupations, vivant dans une sphère d'activité continuelle, et se livrant avec passion à l'exercice de la chasse, *pluribus intentus, minor est in singulâ sensus*, il perdit de vue le sujet de sa mélancolie, et recouvra bientôt un jugement sain et son urbanité première.

Je termine ces citations en rapportant un fait de mélancolie, extrait des consultations d'*Hoffmann*, et où la maladie me paraît assez bien présentée.

Un homme distingué, âgé de trente ans, d'un tempérament bilieux et mélancolique, d'un caractère sensible et ambitieux, etc., était issu d'une famille très-sujette aux affections mélancoliques. Il jouissait d'un assez bon appétit, avait le ventre libre, et n'éprouvait ni flatuosités, ni vents, ni rots, ni coliques. Soumis à un régime sévère, il ne commettait aucun excès, mais se livrait parfois à la colère. L'eau rougie formait sa boisson ordinaire. Bientôt il perd en grande partie le sommeil, surtout quand il ressent du chagrin; il devint triste, méticuleux, son esprit est fortement frappé et troublé; il fuit la société

des hommes, surtout de ceux dont les habits sont rouges ou bleus, couleurs qu'il avait prises en aversion. Le moindre bruit l'épouvantait, surtout la nuit; aussi, pour goûter le repos, il résolut de se retirer à la campagne. Les mêmes accidens s'y reproduisaient de temps à autre, et alors il était inhabile à remplir aucun de ses devoirs, dont avant il s'acquittait fort bien. Du reste, il n'éprouvait aucun symptôme morbifique. Après avoir suivi différens avis, voyagé, pris des eaux minérales, et après s'être fait saigner trois fois par an, il consulte *Hoffmann*; celui-ci lui conseille une société agréable, d'interrompre ses occupations, de vivre à la campagne dans une température un peu chaude; il lui prescrit un régime convenable, l'usage des eaux minérales; pour le soir, une espèce d'émulsion, des pédiluves excitans et aromatiques, des bains tièdes, et d'avoir, de temps en temps, recours à la saignée ou aux sangsues.

Comparons maintenant, à ces exemples de mélancolie, quelques observations de névrose hypocondriaque.

Observation d'Hypocondrie.

M. A. D** est né de parens bien constitués, et qui ont prolongé leur carrière au-delà de quatre-vingts ans; il reçut aussi en partage une fort bonne constitution; mais l'habitude d'une vie

très-sédentaire et des travaux du cabinet développa chez lui, vers l'âge de trente ans, une névrose des organes de la digestion qui subsiste depuis vingt ans, et se maintient depuis dix dans un état de modération tout-à-fait remarquable. Un de ses frères a été également hypocondriaque.

Dans le principe, M. D** se plaignait du dérangement de son estomac; ses digestions étaient pénibles; il rendait une grande quantité de vents dont l'issue diminuait sensiblement le malaise qui succédait à ses repas. Plus tard il lui survint des vomissemens muqueux. Il éprouvait en outre des bâillemens complets ou incomplets, et des maux de tête qui correspondaient surtout à l'occiput.

Ses membres étaient exempts de douleurs; mais quand il voulait se lever, après être resté quelque temps assis, il lui survenait dans les genoux une faiblesse analogue à celle d'un homme ivre; sa tête et ses jambes lui paraissaient tellement affaiblies, qu'il craignait souvent de tomber, et qu'il ne retrouvait sa force habituelle qu'après avoir marché durant un quart d'heure. Pendant tout une saison il fut fatigué par des bourdonnemens d'oreille qui simulaient les sons filés d'un cor très-éloigné. A une autre époque il se réveillait tous les matins avec un mal de gorge qui se dissipait aussitôt après son déjeûner.

Des troubles plus ou moins prononcés dans ses diverses fonctions organiques, lui ont fréquemment donné des inquiétudes relatives à sa santé : de-là des craintes exagérées ou des maux imaginaires, un état morose, et une disposition extraordinaire aux emportemens. Souvent ses cheveux étaient hérissés, et lui causaient des douleurs vives ; ils semblaient tenir à une chair meurtrie par des coups. D'autres fois il éprouvait à la tête un froid tel que, si la raison ne fût venue à son secours, il eût pensé qu'on y répandait un souffle glacial.

Tous les cinq à six jours il ressentait, au moment où l'occiput touchait l'oreiller, une douleur, avec trouble de la vue, qui le forçait à se tourner sur le côté. A l'instant où il s'endormait, ses sens étant engourdis par le sommeil, il s'opérait dans sa tête un mouvement comparable au bruit que produit, en se détendant, le ressort d'une pendule ; ce bruit augmentant lui causait un tel effroi, qu'il faisait un effort pour se relever. Une nuit, entre autres, le désordre fut tel, que M. D** ne put appeler à son secours ; il lui semblait qu'une main étrangère lui serrait la gorge pour l'étrangler : il se crut sur le point de mourir.

Pendant la nuit, le craquement d'un meuble, l'aboiement d'un chien le faisaient tressaillir, et lui causaient de fortes palpitations.

Dans les rues, la vue d'un homme, d'un che-

val, qu'il ne croyait pas près de lui, le faisaient trembler. Cependant si le hasard l'eût forcé à défendre sa vie, s'il eût vu son ennemi, enfin si sa raison eût calculé le genre du combat, il s'y serait exposé sans terreur.

Mais depuis dix ans, tous ces phénomènes, indices certains d'une exaltation de la sensibilité générale, sont ou diminués ou entièrement dissipés. M. D** éprouve bien encore quelques symptômes d'une hypocondrie très-affaiblie, tels que des vents, des engourdissemens légers, des bruits singuliers dans la tête, et des craintes relatives à ses différentes fonctions; mais ceux-ci en général se manifestent rarement, et sont très-supportables. Du reste, il jouit habituellement d'une bonne santé, dort long-temps et se réveille dispos. Il a un bon appétit, mange beaucoup, et digère lentement, mais fort bien; enfin il partage son temps, suivant son goût, entre l'exercice, de fréquentes promenades, ou un séjour prolongé à la campagne, entre la société de ses amis, l'étude et les spectacles.

Sa raison est même bien raffermie contre les craintes qui l'ont si souvent et si long-temps tourmenté; c'est-à-dire qu'il suffit, lorsqu'une frayeur vient de nouveau le chagriner, de lui rappeler toutes les terreurs paniques qu'il a déjà eues, pour le rassurer plus ou moins complètement sur ce nouvel effroi.

Joignons encore ici un autre exemple d'hypocondrie bien caractérisée.

Un jeune homme âgé de vingt-six ans, reçut en partage un tempérament nerveux, une imagination très-active, une grande sensibilité morale, et, avec une constitution peu robuste, une assez bonne santé.

A l'âge de douze ans il éprouva un violent accès de somnambulisme, mais qui fut unique. Dans le cours de sa jeunesse il fut souvent pris de cauchemar; une nuit, entre autres, après un assez long voyage.

A dix-huit ans il se livra à l'étude de la médecine, et consacra au travail une grande partie de son temps. Pour faire diversion à une application aussi soutenue, il donnait, de temps à autre, quelques instans à une société où il était reçu avec beaucoup de bienveillance. Bientôt il s'attacha à une jeune personne fort jolie, et qui parut d'abord répondre aux sentimens qu'elle lui avait inspirés; mais peu de temps après il reconnut qu'un de ses amis avait obtenu la préférence.

Dès-lors chagrin violent, concentré, et souvent renouvelé par la vue de cette demoiselle, qui habitait la même maison. Digestions lentes et pénibles; anomalies de l'appétit, qui, très-bon le matin, manquait à l'heure du dîner, pour reparaître d'une manière très-prononcée vers les dix heures du soir. Borborygmes fréquens, parfois

hoquet spasmodique, tensions vers les hypocondres, nausées et vomissemens alimentaires, mais fort éloignés ; constipation peu opiniâtre.

Respiration habituellement gênée, ou plutôt difficulté très-grande et presque continuelle à obtenir des inspirations complètes ; ce qui l'obligeait souvent à s'arrêter au milieu d'une marche à pas ordinaire ; palpitations tumultueuses, plus considérables et plus générales lorsqu'il était dans son lit ; les battemens se faisaient sentir à la tête, à l'épigastre, mais surtout dans la région du cœur. Le malade ne pouvait supporter sur sa poitrine le poids de sa couverture ni celui de son drap ; sa chemise même lui était incommode.

Le sommeil était en général très-pénible et interrompu par des rêves ou un bruit dans la tête, analogue à un coup de pistolet ou au craquement d'un meuble. Le moral participait fortement au trouble physique, les inquiétudes sur son état présent étaient augmentées par le tableau de l'avenir, que son imagination lui présentait ; de là des craintes de diverses maladies, et une habitude d'ennui et de tristesse qui alternaient avec des accès bien courts de gaîté folle.

Divers traitemens mal dirigés et surtout mal suivis, échouèrent successivement. L'affection du cœur, l'inclination persistaient toujours ; un premier voyage suspendit les accidens, qui reparurent peu de temps après le retour, et la reprise

des anciennes habitudes ; mais enfin un second voyage, et un nouvel attachement, qui en fut le résultat, amenèrent une guérison aussi prompte que parfaite, et qui se maintient depuis plus de quinze ans.

Observation (1) *d'Hypocondrie par frayeur.*

Un courtisan distingué, âgé de trente ans, d'un tempérament sanguin, joignait à un embonpoint très-prononcé, un caractère enjoué et sans aucune disposition à la mélancolie ; habitué aux travaux du cabinet, qu'il compensait par beaucoup d'exercice, il avait toujours joui d'une bonne santé. Un jour, étant à la chasse, il fut tout à coup saisi d'une vive frayeur, tomba de cheval, se plaignit de douleurs dans le dos, et se crut grièvement blessé. Bientôt remis de son accident, il reconnaît son erreur, remonte à cheval, et continue sa partie de chasse. De retour chez lui, il éprouve, au bout de quelque temps, les symptômes d'hypocondrie les mieux caractérisés ; malaise général, inquiétudes vagues, trouble des fonctions digestives, vertiges, pesanteur et douleur de tête, flatuosités incommodes,

(1) Obs. II, *Hoffmann.* Si nous avons rapporté jusqu'ici plusieurs histoires particulières empruntées à cet observateur, ce n'est point par prédilection pour sa méthode, mais bien parce qu'il s'est occupé d'une manière spéciale de ces maladies, qu'il a d'ailleurs mieux décrites que beaucoup d'autres.

sommeil troublé par des rêves fatigans, tristesse constante, anxiétés précordiales, constipation opiniâtre ; à son réveil, nausées et vomissemens acides, urines tantôt limpides, tantôt sédimenteuses.

Consultations multipliées : pendant un an, abus des médicamens, et exacerbation manifeste de la maladie. *Hoffmann* est appelé, il ordonne une saignée au pied, des pédiluves fréquens, une infusion théiforme le matin ; avant le repas, l'essence d'écorce d'orange ; le soir, la poudre précipitante ; deux fois par semaine, les pilules balsamiques ; rejet de tous les autres médicamens ; guérison.

La maladie affectait ici un homme sanguin, et ne reconnaissait point pour cause la vie sédentaire, ni les travaux du cabinet, mais une circonstance accidentelle dont l'effet était plus facile à combattre.

Enfin, si nous voulions mettre dans tout leur jour les différences et les rapports que présentent ces trois maladies, nous dirions que l'hypocondrie est une névrose ou une affection du système nerveux abdominal, et par suite du système nerveux général ; l'hystérie, une maladie du système nerveux utérin ; et la mélancolie, une affection du système nerveux cérébral, ou plutôt une altération partielle de l'imagination (1).

(1) On peut encore consulter, sur cette maladie, la dis-

Passons à l'examen comparatif de l'hypocondrie et des inflammations lentes de l'abdomen, qui ne mérite pas moins notre attention.

TROISIÈME SECTION.

Caractères distinctifs de l'Hypocondrie, et des phlegmasies chroniques de l'abdomen.

Si l'on compare l'hypocondrie aux phlegmasies chroniques de l'estomac et des intestins, on conçoit que l'analogie de leur siége et de quelques symptômes a pu, malgré la différence de nature et de leurs principaux phénomènes, occasionner des erreurs dans le diagnostic de ces affections diverses; mais ces méprises ont-elles été aussi fréquentes que le donne à penser un médecin recommandable, le docteur *Broussais*, dans l'ouvrage qu'il a publié sur les phlegmasies chroniques. « N'est-ce pas ainsi, dit-il, que sont entretenues certaines dyspepsies hypocondriaques (1), qui, si elles étaient examinées de bien près, seraient reconnues pour de véritables gastrites chroniques »? Plus loin il ajoute : « Il serait curieux de savoir combien il resterait de squirrhes au pylore, d'hypocondries, d'obstructions et de

---

sertation du docteur *Charpentier*, dans laquelle on trouve plusieurs histoires particulières de mélancolie très-intéressantes.

(1) Tome II, page 290 et 337.

maladies nerveuses ayant leur source dans les organes de l'abdomen, si l'on pouvait distraire toutes les gastrites chroniques des maladies existantes actuellement à Paris sous ces différentes qualifications ». Si des erreurs ont été commises, et je suis porté à le croire, ce praticien laborieux, dont je me plais d'ailleurs à reconnaître le talent d'observation, est-il bien fondé à faire un reproche aussi général; je ne le pense pas, et certainement la plupart des médecins de la capitale distinguent très-bien les phlegmasies aiguës ou chroniques des squirrhes au pylore, ou des affections hypocondriaques, *et vice versâ.* Ne s'est-il pas exposé lui-même au reproche de ne voir que des gastrites chroniques, en les soupçonnant là où peut-être elles n'existent pas, et en paraissant nier en quelque sorte l'existence des squirrhes au pylore, des obstructions, des maladies nerveuses et de l'hypocondrie, dans une infinité de circonstances où ces derniers existent réellement. Quoi qu'il en soit, on devra toujours de grandes et nombreuses obligations au docteur *Broussais*, pour ses différens travaux, et même pour avoir appelé l'attention des médecins sur la possibilité d'une méprise dont l'occasion se présente fréquemment.

Efforçons-nous maintenant de prévenir de semblables erreurs, en remplissant cette lacune qu'il a laissée, en établissant, dis-je, les carac-

tères propres à l'hypocondrie et aux phlegmasies chroniques (1), et c'est dans le Traité de M. *Broussais* lui-même, que je puiserai en partie les signes distinctifs de ces dernières, bien certain de ne pouvoir rencontrer une meilleure source.

Les phlegmasies chroniques attaquent tous les âges ; elles sont très-ordinaires aux enfans, plus fréquentes chez les jeunes gens que dans l'âge viril, où elles sont encore très-communes ; tandis que l'hypocondrie se voit presque exclusivement chez les adultes. On remarque très-souvent ces inflammations lentes chez les hommes qui fatiguent beaucoup, comme les laboureurs, les artisans, et surtout les militaires, à la suite des marches forcées ; elles sont beaucoup plus rares chez les citadins, et parmi les individus livrés à une vie molle et sédentaire.

Les hommes en général sont, par les raisons que nous avons énoncées ci-dessus, et celles que nous exposerons incessamment, plus sujets que les femmes, à ce genre de maladies.

Si la mollesse, les habitudes sédentaires sont une source de névroses des plus fréquentes,

---

(1) Plus loin j'indiquerai les signes distinctifs des squirrhes du pylore : ceux-ci diffèrent des phlegmasies chroniques, et bien qu'ils commencent aussi par une irritation lente, leur siége, leur nature et leur mode de formation ne sont pas les mêmes que dans ces inflammations.

l'excès de fatigue favorise puissamment l'invasion des phlogoses chroniques.

Les vêtemens qui ne garantissent ni du froid, ni de la pluie, ni de l'humidité, qui n'absorbent pas la transpiration ou la sueur, et qu'on garde sur soi lorsqu'ils sont mouillés, offrent, au suprême degré, le même inconvénient. On peut en dire autant du trouble apporté dans nos différentes fonctions, et spécialement du dérangement de la transpiration. Aussi regardai-je cette cause, c'est-à-dire tout mode de refroidissement, comme l'origine du plus grand nombre des phlegmasies chroniques. La grande humidité, jointe à une température élevée, les émanations contagieuses répandues dans l'atmosphère, les exhalaisons par suite du desséchement, ou des substances décomposées et putréfiées, produisent souvent encore ces désordres. Il faut en outre noter, comme agissant à cet égard d'une manière spéciale, l'humidité éprouvée aux pieds, une habitation froide, humide, insalubre, et surtout les bivouacs; tandis que les névroses des organes de la digestion dérivent bien plus rarement de ces différentes sources. Citerons-nous comme causes de ces inflammations les coups, les chutes, les commotions vers l'abdomen? Qui ne sait combien leur influence est étrangère à la production des vésanies hypocondriaques, et combien, au

contraire, elle favorise les phlogoses et les lésions organiques de l'abdomen.

La suppression ou rétention des règles et du flux hémorrhoïdal concourt davantage peut-être à la production des affections nerveuses. L'onanisme, par l'épuisement qui en résulte, et plus encore par la honte qu'entraîne toujours ce funeste penchant, est également une cause bien plus puissante d'hypocondrie que d'inflammations chroniques.

L'habitude de la bonne chère, ou plutôt la surcharge habituelle de l'estomac dispose au contraire beaucoup plus aux gastrites et entérites chroniques qu'aux névroses des organes de la digestion ; l'abus des liqueurs, des vins, qui sont souvent de mauvaise qualité, les boissons stimulantes ou irritantes données, pour faire transpirer, dans un moment d'irritation plus ou moins vive, les médecines de précaution, les vomitifs et purgatifs réitérés ; les préparations mercurielles, et surtout le sublimé, si souvent administrés inconsidérément, et qui agissent immédiatement, ont sur le développement des inflammations lentes une influence beaucoup plus active que sur celui de l'hypocondrie. Remarquons en outre que les premières succèdent très-communément aux inflammations aiguës, terminées sans crises, ou jugées incomplètement, dont la convalescence a été brusquée, ou qui après une guérison parfaite,

récidivent à un degré modéré, par suite d'imprudences ou de refroidissement. Elles sont encore une conséquence plus ordinaire des fièvres intermittentes qui se prolongent indéfiniment, et peut-être des affections rhumatismales, dartreuses, etc., fixées sur les viscères abdominaux.

Les méditations trop soutenues, ou seulement l'habitude d'un travail de tête, sédentaire, sans forte application mentale, plus alors par le défaut d'exercice, de locomotion, que par la fatigue de l'entendement, déterminent, comme nous l'avons dit, bien fréquemment ces névroses, et très-rarement les affections de l'autre genre.

Enfin le chagrin, et tous ses différens modes, exaltent la sensibilité organique des viscères de la digestion, et provoquent l'hypocondrie bien plus souvent qu'ils ne donnent lieu aux phlogoses latentes ou chroniques de l'abdomen; mais ces affections morales amènent aussi très-ordinairement les lésions organiques.

Si nous poursuivons l'examen comparatif dans les phénomènes de ces maladies diverses, nous retrouverons encore des oppositions non moins tranchées : ainsi, dans l'hypocondrie, les digestions sont en général plus ou moins difficiles; cependant la plupart des malades mangent avec assez de plaisir, et digèrent, quoique avec une peine dont le degré varie; de plus, la constipation est ici fort ordinaire. Dans les gastrites ou

entérites chroniques, les digestions sont bien plus pénibles, et souvent même impossibles; quand l'estomac est le siége de l'inflammation, il y a défaut d'appétit, souvent des vomissemens muqueux ou alimentaires, et une douleur plus vive à l'épigastre que dans les cas de névrose. Les phlogoses intestinales ont aussi leurs symptômes particuliers : ici ce sont des coliques plus ou moins intenses; la sensibilité de l'abdomen augmente par instant, surtout quand on le comprime; quelquefois il y a intégrité de l'appétit, surtout chez les enfans et les jeunes gens; on remarque presque toujours une diarrhée plus ou moins fréquente; chaque évacuation est précédée de coliques vagues, et suivie d'un soulagement éphémère; mais la moindre quantité d'alimens, dans l'un et l'autre cas, ranime le désordre, multiplie, rapproche et prolonge les redoublemens; tandis que les hypocondres se trouvent assez souvent soulagés après leurs repas. La soif est aussi fréquente dans les inflammations même chroniques, que rare dans les névroses. Cependant, dans quelques cas, et surtout au début de la maladie, ou quand celle-ci est modérée, la soif est peu intense, ou n'existe pas d'une manière continue; souvent même les enfans refusent alors de boire. Mais en général, et surtout chez les adultes, elle existe spécialement le soir ou la nuit, et souvent à un degré modéré; elle s'ac-

compagne de sécheresse de la bouche, de rougeur de la langue; il y a chaleur générale, plus ou moins vive, suivant l'intensité de la phlogose (1), et ardeur à l'arrière-bouche; le pouls est petit, serré, fréquent; et presque toujours le soir ou la nuit il survient des redoublemens; le sommeil est agité, mais d'une agitation différente de celle qu'on observe dans l'hypocondrie, où l'insomnie est causée par un trouble plus moral que physique. La figure est souvent altérée, allongée ou un peu grippée. La plupart de ces accidens sont non-seulement étrangers à l'hypocondrie, mais ils procèdent avec une lenteur qui, comparée à la marche ordinaire de cette névrose, est un mouvement de progression très-rapide. Les médicamens trop actifs ou irritans, le moindre écart dans le régime, la plus petite quantité d'alimens ou de boissons excitantes, l'impression réfrigérante la plus légère, enfin les contrariétés morales sont suivis, chez les malades en proie aux phlogoses, d'accidens beaucoup plus violens que chez les individus hypocondriaques.

Considérons en outre que ces inflammations

---

(1) Lorsque les forces sont très-diminuées, quand la vie est prête à s'éteindre, il y a sentiment de froid; mais ce symptôme est constant à la fin de toutes les maladies mortelles.

sont exemptes des innombrables phénomènes sympathiques, de ces aberrations mentales que nous avons exposés dans la description de l'hypocondrie. Ici les symptômes sont non-seulement plus nombreux, mais plus variables; là ils sont plus fixes, plus locaux. On peut dire de ce genre de maladies, *stabilibus magis quàm vagis molestum;* c'est l'opposé de ce qu'*Alberti* appliquait à l'hypocondrie.

Tout annonce dans ces phlegmasies chroniques, non une affection plus ou moins générale de la sensibilité organique, mais une affection locale de la sensibilité animale.

Si l'on considère que les phlegmasies chroniques de l'abdomen se terminent quelquefois par la guérison, et plus souvent par une désorganisation mortelle dont le terme s'étend depuis deux à trois mois, à deux ou trois ans au plus, on ne pourra leur assimiler les névroses des organes de la digestion, qui se maintiennent quelquefois au même degré, et sans aucune apparence de lésion organique, d'altération de tissu, pendant des dix, douze, vingt et trente ans (1); qui dans quelques cas se dissipent au bout de peu jours par le seul exercice auquel on avait renoncé, ou par

(1) Bernardin de Saint-Pierre et Grétry furent hypocondriaques durant une grande partie de leur vie, et sont morts octogénaires.

d'autres moyens également simples et prompts dans leurs effets.

Ne sait-on pas en outre que le traitement des phlegmasies diffère singulièrement de celui qui convient aux névroses des organes digestifs ? Les délayans, la diète la plus sévère, le repos du lit sont nécessaires dans le premier cas; tandis que les hypocondriaques se trouvent en général très-bien d'un régime tonique, des boissons un peu amères, de l'usage du vin, des distractions, de l'habitude des spectacles, des voyages, et surtout des différens modes d'exercice. Les terminaisons varient également; la mort est très-souvent le terme des phlegmasies chroniques, tandis qu'elle n'est peut-être jamais le résultat direct de l'hypocondrie. Mais à la longue les affections hypocondriaques se dénaturent, ou plutôt se compliquent, et c'est en se dénaturant ainsi qu'elles peuvent indirectement se terminer de la manière la plus funeste. L'hypocondrie est d'abord simple, elle se complique ensuite avec une inflammation lente ou une lésion organique, dont la terminaison est presque toujours mortelle.

Pour mieux établir la comparaison entre ces deux classes de maladies, et afin de rendre leurs oppositions plus saillantes, nous allons relater ici quelques histoires de phlegmasies chroniques, empruntées pour la plupart au docteur *Broussais*, nous bornant d'ailleurs à renvoyer aux

nombreux exemples d'hypocondrie que nous avons déjà mentionnés.

Je choisis les observations qui nous offrent ces phlegmasies dans l'état le plus simple, parce que M. *Broussais* ayant communément traité des militaires soumis au régime le plus contraire, épuisés par des marches forcées, couchant sur la terre, exposés enfin à toutes les intempéries de l'air, a presque toujours rencontré des complications mortelles. Dans la pratique des villes, la terminaison des phlegmasies n'est pas à beaucoup près aussi souvent funeste.

Inflammation de l'estomac, gagnant les intestins. (Observation analysée) (1).

Un jeune soldat était malade depuis un mois; pendant tout ce temps il éprouva une douleur *fixe* à l'épigastre, avec forte constriction; dégoût invincible pour tout aliment, nausées et même vomissemens. Plus tard la diarrhée survient; le trente-unième jour, air inquiet, teint sombre, livide, terreux; rougeur des conjonctives. *Pour l'estomac,* anorexie, vomissement de tous les *ingesta;* sentiment d'une constriction pénible et même douloureuse à la région épigastrique. *Pour les intestins,* diarrhée peu abondante, mais douloureuse, excrémens d'une odeur insupportable.

(1) Page 53, tome II. Broussais.

Pour la surface du corps, marasme au deuxième degré, peau sale; fétidité stercorale de la transpiration; pouls faible, serré, lent; la chaleur cutanée au-dessous du degré de santé; débilité extrême. Mort le quarante-deuxième jour, sans agonie. L'estomac rétréci, comme un intestin, dans la moitié pylorique; la membrane muqueuse d'un rouge foncé, même dans les intestins; sèche, noire près du pylore; épaissie et coriace surtout en ce lieu, etc.

Gastrite chronique avec diarrhée. (Analyse) (1).

Un jeune homme, âgé de vingt-deux ans, se plaint d'un dégoût très-prononcé pour tous les alimens, et d'envies de vomir continuelles; il se sentait toujours *prêt à rendre ce qu'il avait pris*, quoique la diarrhée ne le quittât pas. Il était très-maigri, et cependant il ne se disait malade que depuis seize jours; sa figure surtout était maigrie, son teint sombre, ses yeux caves, sa langue humide et assez nette, le pouls nullement fébrile. *Traitement.* Solution gommeuse acidulée, julep analogue; bouillie pour nourriture. Amélioration; le malade se procure des alimens; rechute, mort douze jours après. L'estomac étant ouvert, n'offrait aucune cavité; tous les intestins consi-

(1) Page 55.

dérablement resserrés ; la membrane muqueuse d'un rouge foncé, couleur du bois de campêche, etc.

Inflammation des intestins, puis de l'estomac. (Analyse) (1).

Un tambour, âgé de vingt-quatre ans, contracte une fièvre tierce, qu'il conserve plus de deux mois, sans y opposer aucun remède ; la diarrhée s'y joint. Après quatre mois de maladie il était réduit à un demi-marasme ; il allait à la garde-robe cinq à six fois par jour, avec des coliques et beaucoup de malaise ; le pouls nullement fébrile. *Eau de riz, potions gommeuses aromatisées.* Amélioration : bientôt rechute par suite de sa gourmandise ; dès-lors, vomissement des alimens, perte de l'appétit, nausées continuelles, anxiétés, fréquence du pouls, chaleur de la peau. Je reconnus, dit M. *Broussais,* que la phlogose gagnait l'estomac. *Potions acidulées et huileuses;* le mouvement fébrile ne se maintenait que huit à dix heures par jour ; mort le 22 septembre 1806, après six mois de maladie. Tout le canal intestinal tellement contracté, que la membrane muqueuse était presque partout en contact ; celle de l'estomac rouge, épaissie, et couverte d'une exsudation grisâtre près du pylore ; partout ailleurs

(1) Page 60.

sèche, et de la couleur du bois de campêche.

Certes, ces observations ne ressemblent pas à l'hypocondrie; aussi ont-elles été bien reconnues par le docteur *Broussais ;* mais l'avantage d'établir un diagnostic exact est aussi l'apanage de beaucoup d'autres médecins : ainsi les diverses observations rédigées par nos confrères ou par nous-mêmes, et que renferme ce travail, ne sont pas toujours des gastrites chroniques, mais bien ce qu'elles sont intitulées, des affections nerveuses, des hystéries, des hypocondries, des lésions organiques, des squirrhes au pylore, et quelquefois aussi des inflammations chroniques; il nous reste à démontrer qu'à Paris, on sait également bien distinguer ces dernières maladies d'avec les névroses, les vésanies, etc.

Observation d'une phlegmasie chronique intestinale.

Madame G**, âgée de trente-deux ans, a joui d'une bonne santé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Ce fut à la suite d'un traitement par la liqueur de *Van-Swiéten,* et d'un accouchement très-douloureux, qu'elle fut prise de coliques, d'abord assez vives, et d'un dévoiement qui a diminué plusieurs fois, mais pour reparaître ensuite avec une nouvelle force, souvent avec fièvre légère. Elle a été soignée par un grand nombre de médecins; aucun n'a vu dans cette affection une

hypocondrie; tous ont employé les moyens généralement avoués contre ces inflammations lentes, et qui ont échoué, avec cette particularité que chaque nouveau traitement opérait un mieux momentané. Les délayans, les adoucissans, les toniques, les astringens, les opiacés, les vésicatoires volans, ont été mis à contribution sans plus d'avantage. La malade a fait usage du lait d'ânesse, de celui de vache, qui n'ont produit ni bien ni mal soutenus; à une autre époque, elle s'est nourrie exclusivement de viandes noires, buvant de l'eau rougie, sans qu'il en soit résulté d'exacerbation. Un voyage en Angleterre, et le *porter* pour boisson, ont amené une amélioration un peu plus prolongée; mais le désordre s'est de nouveau manifesté. Aujourd'hui cette dame recherche la société de ses amis, tous les motifs de distraction, et fréquente les spectacles. Son teint n'est pas très-altéré; elle paraît encore même à présent, fort jolie, parce qu'elle se met avec beaucoup de soin ou beaucoup d'art; mais elle a maigri sensiblement, et ses forces sont très-diminuées. Elle conserve toujours un peu d'appétit, et préfère les viandes rôties et les légumes herbacés; de temps à autre, et surtout la nuit, elle éprouve une soif légère et des coliques; son sommeil est souvent interrompu par le besoin d'aller à la garde-robe, qui la tourmente moins dans le milieu du jour, où

elle est plus distraite. Ses règles n'ont subi aucun dérangement notable.

Certainement, cette affection n'offre point la multiplicité de symptômes physiques et moraux qui forme un des attributs spéciaux de l'hypocondrie.

Une jeune personne offrait le même spectacle, et a été guérie par le régime féculent et mucoso-sucré, par l'usage exclusif des crêmes et des bouillies; mais elle était également exempte de tout phénomène nerveux.

Un jeune homme, âgé de seize ans, est pris de mal de tête, de frisson, de chaleur, etc. Le mouvement fébrile continue avec soif, langue rouge, redoublement tous les soirs, mais peu prononcé, agitation la nuit. Pendant vingt-cinq jours l'état reste à peu près le même; l'appétit n'était pas entièrement perdu. Les parens n'appellent aucun médecin, et se bornent à la limonade, à l'eau de riz, aux lavemens émolliens; mais le malade mangeait tous les jours une petite quantité d'alimens, qui excédait son véritable appétit, et entretenait ainsi l'irritation intestinale, les coliques, la diarrhée et la fièvre. Appelé à cette époque, je prescrivis les boissons gommeuses et sucrées, les lavemens et demi-lavemens mucilagineux, quelques bains de siége pris le soir, les applications de graine de lin; enfin une légère bouillie pour le matin, et quel-

ques tasses de bouillon pour le reste de la journée.

Une prompte amélioration fut le résultat de ce traitement ; mais au bout de quelques jours les accidens se raniment, la fièvre, la diarrhée et l'agitation pendant la nuit augmentent; j'interroge les parens, et j'apprends qu'on a outrepassé la quantité d'alimens permise. Deux ou trois fois la même imprudence fut suivi du même résultat ; la faiblesse des parens cédait aux désirs ou plutôt aux pleurs du malade, et par tendresse ils l'auraient conduit au tombeau. Pour obtenir plus de déférence, j'employai la peur; je fis lire au père plusieurs observations du véridique *Broussais;* il en fut tellement effrayé, que dès-lors je n'eus plus besoin de prêcher la diète : bientôt les accidens cédèrent insensiblement, et une nourriture graduée, mais légère, concourut au retour des forces, au parfait rétablissement de ce jeune homme. Ce fut aux avis sages et éclairés de notre confrère M. *Bourdois,* l'un des hommes qui honorent le plus la médecine, que je dus de n'avoir pas vacillé dans ce mode de traitement; car plusieurs fois voyant la résistance de cette maladie, en apparence légère, je fus tenté d'avoir recours à une médecine plus active, qui probablement n'aurait pas aussi bien réussi.

De ces différentes observations je crois pouvoir conclure, 1°. que les phlegmasies chroniques,

à fortiori celles qui sont aiguës, diffèrent des affections hypocondriaques; 2°. qu'elles en sont même faciles à distinguer; 3°. que M. Broussais n'est pas fondé à insinuer, et encore moins affirmer, comme il l'a fait dans son estimable Traité, pages 290 et 337, tome II, que la plupart des maladies nerveuses, des dyspepsies hypocondriaques, des squirrhes au pylore traités à Paris, ne sont que des gastrites chroniques; 4°. et qu'enfin il a tiré de quelques faits particuliers, vrais d'ailleurs et bien observés, des conséquences trop générales.

Nous ne connaissons qu'un exemple de péritonite chronique, méconnue et prise pour une hypocondrie; cependant l'analogie de siége et de plusieurs symptômes propres à ces deux maladies peut favoriser l'erreur, bien qu'elles présentent aussi de nombreux traits distinctifs. De plus, l'inflammation du péritoine termine quelquefois l'affection nerveuse, comme nous l'avons vu page 441; mais elle peut en outre coexister long-temps avec la névrose hypocondriaque. Contentons-nous de renvoyer, pour l'histoire de la péritonite, à la Nosographie philosophique de *Pinel*, à la dissertation du docteur *Gasc*, et au Traité de M. *Broussais* (1), et rappelons enfin

(1) Ces trois ouvrages réunis pourraient fournir un traité sur les *maladies puerpérales*, et devraient mettre un terme

le procédé que nous avons déjà suivi dans l'examen des maladies du même genre comparées avec l'hypocondrie.

Mais une remarque bien importante, c'est la complication de l'hypocondrie avec ces phlegmasies chroniques et même latentes, ou si l'on veut, la dégénérescence de cette affection nerveuse, et qui se manifeste d'une manière lente, sourde, et quelquefois imperceptible, par un trouble des fonctions digestives plus prononcé que dans l'hypocondrie simple. Si c'est une gastrite qui s'établit, c'est alors que l'appétit diminue, qu'il survient un dégoût qu'on attribue, et bien à tort, aux caprices du malade, que les alimens sont rejetés par le vomissement, surtout s'ils sont de digestion peu facile ou un peu abondans. En même temps la bouche devient mauvaise, surtout pendant la nuit et le matin; il se manifeste une soif légère, qui varie selon les mets dont on fait usage, ou qui d'abord n'existe que par momens ou le soir et la nuit; quelquefois alors la phlogose se dessine par un sentiment de constriction vers l'épigastre, un sentiment d'ardeur à l'arrière-bouche, la fréquence modérée du pouls qui est petit, faible,

---

au scandale de ces opinions surannées et hypothétiques dont on rebat encore de temps en temps le public éclairé, qui les repousse constamment.

serré, la chaleur et la sécheresse de la peau plus ou moins continues ; les urines sont moins claires, moins abondantes, et se troublent plus facilement. Jusqu'à cette époque, la constipation peut encore exister ; mais quand l'inflammation se propage aux intestins ou affecte tout d'abord ces organes, on observe d'autres phénomènes : le désordre qui, dans l'hypocondrie, est ordinairement plus prononcé vers l'estomac et les hypocondres, devient plus manifeste vers la partie moyenne et inférieure de l'abdomen : le malade se plaint de coliques, dont la vivacité et la fréquence varient; les selles deviennent rapprochées, muqueuses, glaireuses; les symptômes d'irritation co-existent. (*Voyez* les Observations rapportées pages 429, etc.) En même temps, ou plus tard, les phénomènes nerveux, sympathiques de l'hypocondrie s'affaiblissent, comme nous l'avons déjà dit, par la prédominance du désordre local.

Ces accidens (nous l'avons fait pressentir dans notre dissertation sur l'hypocondrie) sont souvent le résultat de l'abus des purgatifs, des irritans, des toniques mêmes, qui sont des irritans quand ils sont donnés mal à propos, en un mot, de la polipharmacie. La gourmandise ou un mauvais régime, d'autres troubles apportés dans nos diverses fonctions, les produisent fréquemment aussi.

Nous n'indiquerons pas ici le traitement qu'il convient d'opposer à ces phlegmasies, ou plutôt à ces complications imminentes ou commençantes; mais nous préviendrons, par anticipation, que les adoucissans qui ont échoué dans bien des cas d'hypocondrie, entretenus par la débilité, réussissent souvent alors; parce que la sensibilité des organes, loin d'être émoussée, a été au contraire trop excitée par les purgatifs et autres médicamens.

Nous croyons inutile d'opposer ici à des faits de phlegmasie, de nouvelles observations d'hypocondrie; leur différence paraîtra sans doute, à tout lecteur impartial, aussi sensible qu'à nous-mêmes; d'ailleurs nous aurons encore par la suite occasion d'en rapporter quelques exemples.

Après avoir cherché à établir le diagnostic de l'hypocondrie et des affections, qui s'en rapprochent par leur nature, telles que l'hystérie et la mélancolie, nous nous sommes également efforcés de fixer l'opinion des médecins sur les différences et les rapports que présente cette névrose comparée aux phlegmasies chroniques, qui occupent à peu près le même siége; nous allons maintenant, afin de les prévenir, signaler quelques erreurs qui ont été commises, ou qui pourraient l'être dans le diagnostic des lésions organiques abdominales, et de certaines maladies

qui n'ont avec ces vésanies que des similitudes, des rapports indirects ou accidentels.

QUATRIÈME SECTION.

Caractères distinctifs de l'Hypocondrie avec les lésions organiques de l'abdomen.

Nous avons indiqué déjà les signes généraux à l'aide desquels on pourra distinguer l'hypocondrie d'avec les lésions organiques de nos différens viscères (1); nous allons exposer les symptômes propres ou particuliers à leurs principales altérations, bornant d'abord notre examen à celles de l'estomac, du pylore (2), du foie et de la rate.

Nous ne parlerons point des squirrhes ou can-

---

(1) Voyez page 448. On consultera aussi avec beaucoup de fruits une dissertation sur les altérations de l'estomac et du pylore, par le docteur *Aussant*. Ce médecin ennoblit par son caractère et son talent l'art qu'il exerce avec beaucoup de succès dans la ville de Rennes, où l'on compte un grand nombre d'habiles praticiens.

(2) Mon attention a été appelée sur ces maladies par une circonstance bien pénible : j'ai perdu mon meilleur ami, celui dont je reçus le jour, victime d'un squirrhe au pylore qui fut démontré par l'autopsie de l'organe lésé. Les frayeurs que mon père éprouva pendant la terreur, lorsqu'il était proscrit, furent la cause de sa mort, et cet événement n'a pas peu contribué à me faire détester les horreurs de la révolution, ou plutôt des révolutions.

cers du rectum et des autres parties, parce que leurs phénomènes sont plus distincts, et qu'ils n'ont presque jamais été l'occasion de semblables erreurs.

Les lésions organiques, squirrhe ou cancer, de l'estomac, du cardia et du pylore, sont annoncées par des souffrances plus ou moins intenses dans la région de l'estomac, augmentées après le repas, et d'autant plus que celui-ci aura été plus copieux, ou que les alimens seront plus indigestes. Les liquides en général, à moins qu'ils ne soient trop excitans, provoquent moins les douleurs; quand ils sont doux et bus par gorgées ils passent facilement.

Si les alimens pénètrent avec peine dans l'estomac, si leur entrée excite au cardia une sensibilité obtuse, qui ensuite devient vive, on doit soupçonner une lésion de cette ouverture; quelquefois, en approchant l'oreille de l'épigastre, on entend les alimens ou les boissons franchir l'obstacle qui existe à l'orifice œsophagien, et le malade sent lui-même une sorte de difficulté vaincue. Les vomissemens sont rares alors, surtout dans le principe, et la constipation est moins prononcée.

Quand les alimens ne peuvent être reçus qu'à petite dose, et lorsqu'ils sont repoussés peu de temps après le repas, on aura plus à redouter alors l'épaississement de la membrane mu-

queuse, le rétrécissement squirrheux de l'estomac.

Quelquefois l'appétit subsiste, les alimens sont pris avec plaisir et abondamment; l'estomac les digère : mais au bout de deux heures, plus tôt ou plus tard, il les repousse, parce qu'ils ne peuvent franchir le pylore qui s'est épaissi, durci, rétréci. Le siége de la douleur est ordinairement entre l'épigastre et l'hypocondre droit. Cependant j'ai rencontré un malade qui, à la suite d'un coup reçu dans l'hypocondre gauche, y ressentit une douleur constante. Il succomba, et à l'ouverture nous trouvâmes un squirrhe au pylore : cette observation nous fournit, à cette époque, le sujet d'un Mémoire. Dans ce dernier genre de lésion le vomissement devient de plus en plus fréquent; les boissons sont même souvent rejetées, à moins que le malade ne se borne, même pour toute nourriture, aux boissons gommo-sucrées, gélatineuses, etc., bues par très-petites fractions. C'est de toutes ces maladies celle où la constipation est la plus prononcée et la plus constante; non-seulement parce qu'une irritation dans la partie supérieure du canal intestinal arrête la sécrétion des sucs gastrique, biliaire et intestinal; mais encore parce qu'elle s'oppose au cours des alimens et à celui des liquides.

Ces lésions organiques, considérées d'une ma-

nière générale, offrent encore d'autres caractères, qui faciliteront et assureront leur diagnostic, ou celui de l'hypocondrie dans les cas de névrose hypocondriaque ou de complication; outre leur siége différent, le trouble qu'elles occasionnent est plus local, plus profond, quoique souvent moins apparent; les rots, les rapports sont plus acides, plus aigres, plus nidoreux, plus corrosifs; la douleur est fixe, permanente, plus vive et souvent lancinante; l'amertume de la bouche et les envies de vomir sont continuelles; aussi la plupart de ces infortunés désirent et appellent à grands cris les vomitifs, parce qu'ils prennent, pour la cause de leur maladie, ses effets. Celle-ci est quelquefois stationnaire, elle peut même reculer; mais le plus souvent elle n'a été que momentanément masquée, et bientôt elle revient ou elle reparaît pour ne plus rétrograder. Sa durée est bien plus limitée que celle de l'hypocondrie, et même que celle de certaines phlegmasies chroniques. Plus tard la nature des vomissemens change; après avoir été muqueux, ils sont composés d'alimens à demi-digérés, et par la suite, de matières ou de bile brunes et noirâtres, ou de lambeaux de tissu désorganisés.

Les plaintes de ces malades sont constamment les mêmes, et ne varient pas comme dans l'hypocondrie; elles sont exprimées sans exaltation,

sans exagération, mais avec un accent calme, grave, et avec un pressentiment concentré, ou avec une sorte de désespoir.

On remarque encore, dans l'expression de leur physionomie, une altération beaucoup plus constante et plus profonde que chez les hypocondriaques. La figure s'allonge; les yeux deviennent ternes et caves; la nutrition ne s'opère qu'avec peine; bientôt l'amaigrissement est considérable. On sent tôt ou tard, du moins le plus souvent, une tumeur squirrheuse, rarement au cardia lui-même, qui est peu accessible au toucher, plus souvent au pylore, à l'estomac, quelquefois enfin à sa partie cardiaque ou grosse extrémité.

Un autre ordre de phénomènes se remarque dans les engorgemens du foie : ceux-ci sont assez souvent précédés par des douleurs vagues, des jaunisses; ils reconnaissent pour leur origine la plus ordinaire les chagrins et les dérangemens de nos hémorrhagies; quelquefois des concrétions biliaires, souvent la longue durée des fièvres intermittentes, moins fréquemment les doses trop fortes de quinquina, ou son administration prématurée; l'abus des vomitifs, des purgatifs, etc., des substances stimulantes, des boissons alkooliques. Ils sont beaucoup plus fréquens chez les adultes qu'à tout autre âge. Au trouble des fonctions digestives se joint presque toujours

une douleur d'abord obtuse, plus tard lancinante, qui occupe l'épigastre, et surtout l'hypocondre droit, s'étend quelquefois jusqu'à la partie postérieure de l'épaule droite, ou s'y produit sympathiquement. Tôt ou tard le gonflement de l'organe hépatique devenant sensible, se fait remarquer, ou en avant, vers la région épigastrique; ou dans l'hypocondre droit, et plus ou moins bas. Les nausées et les vomissemens ne sont pas aussi fréquens que dans les lésions de l'estomac. Le *decubitus*, qui, dans ces dernières, est assez facile à droite et à gauche, ne peut communément avoir lieu dans ce cas-ci que du côté droit. La physionomie du malade s'altère sensiblement, et prend une forte teinte d'un jaune brun. L'œdème des extrémités inférieures, la péritonite chronique et latente; enfin, l'ascite consécutive, sont dans ce cas très-ordinaires, et ne se rencontrent jamais dans l'hypocondrie simple, et rarement dans les altérations du tissu gastrique.

Un désordre très-analogue dans l'hypocondre gauche annonce les lésions organiques de la rate; celles-ci sont assez rares dans les adultes, et très-fréquentes dans la première enfance. Toutefois les symptômes locaux de l'affection hypocondriaque étant beaucoup plus continus et prononcés du côté gauche doivent favoriser les maladies de la rate plus que celles du foie; celles-là sont peut-être encore plus souvent occasionnées par la

suppression des hémorrhoïdes, à cause de la corrélation plus directe qui existe entre les vaisseaux hémorrhoïdaux et ce viscère, mais moins fréquemment déterminées par les peines de l'âme que les lésions du foie, qui tient plus intimément au système digestif. Les altérations de la rate ne gênent pas autant les mouvemens, parce que le volume de ce viscère, considéré isolément de l'augmentation morbifique, est bien moindre que celui du foie; aussi le malade n'éprouve-t-il pas une aussi grande difficulté à se coucher du côté opposé. La rate étant placée plus profondément, ou plutôt étant moins accessible à nos moyens explorateurs, on ne distingue en général que très-tard la tumeur formée par cet organe ainsi engorgé. Celui-ci n'adhérant au diaphragme que dans un espace très-limité, il est, quand il a acquis un volume contre nature, plus facilement entraîné par son propre poids, et occupe souvent le voisinage de la fosse iliaque correspondante. Ces altérations se jugent, plus souvent que les hépatites chroniques, par les hémorrhagies, et sont moins susceptibles d'une terminaison funeste, probablement par suite d'une organisation moins délicate, de fonctions moins importantes, et de rapports plus limités; enfin, elles sont plus facilement guéries, soit par les efforts de la nature, soit par les ressources de l'art, et principalement par l'application des sangsues,

qui, en vidant les vaisseaux hémorrhoïdaux, dégorgent presque immédiatement l'organe malade.

Il suffit de comparer, même par un rapprochement peu approfondi, ces diverses maladies, pour s'assurer qu'elles sont très-distinctes des affections hypocondriaques, et qu'il est facile de les reconnaître; mais il n'est pas moins important de se rappeler que les lésions organiques, et particulièrement celles du foie, s'associent trop fréquemment aux névroses des organes digestifs; aussi ne suffit-il pas de s'assurer qu'un homme est atteint d'hypocondrie, il faut en outre examiner si celle-ci est simple ou compliquée.

Trop souvent l'incertitude que présente le diagnostic d'une affection organique imminente, et l'analogie qui existe entre les accidens qu'elle produit et les symptômes ordinaires de l'hypocondrie, éloignent de la connaissance de la vérité le médecin qui adopte trop facilement l'existence de cette dernière névrose. Plein de son idée, il considère les phénomènes de la maladie naissante comme une de ces anomalies nerveuses si fréquentes; et cette erreur est d'autant plus difficile à détruire, qu'elle est plus vraisemblable, et que souvent tout semble la confirmer jusqu'à l'époque où les progrès de la désorganisation et le dépérissement deviennent trop sensibles, et signalent le désordre véritable. D'autres fois un observa-

teur peu exercé continue à ne voir qu'une hypocondrie simple au milieu des phénomènes d'une complication grave et déjà ancienne. Telle est une des sources les plus fréquentes du diagnostic erroné, ou du faux jugement que l'on porte sur la nature de ces maladies.

Je vais rapporter une observation où cette erreur a été long-temps commise : par d'autres, je démontrerai qu'il est possible de l'éviter.

M. D**, âgé de soixante-deux ans, bien constitué, d'un tempérament bilieux, et d'un caractère fort enjoué, fut très-adonné dans sa jeunesse aux plaisirs de l'amour : les regrets suivent souvent les plaisirs, et notre malade en fit un jour l'apprentissage. Dans le désir d'une prompte guérison, il se livre entre les mains d'un charlatan, qui le fatigue par des doses de médicamens excessives, prescrites sous des formes bizarres, et accompagnées des règles les plus minutieuses. Un calcul approximatif nous a fait présumer qu'il était ordonné par jour, à ce malade, un grain et demi de sublimé, dont heureusement il ne prenait que moitié dose, ce qui était indépendant des frictions. Victime de cet ignorant empirique, il reconnut enfin son erreur. Depuis lors ses fonctions digestives furent dérangées. Un médecin éclairé le mit à l'usage des boissons adoucissantes, à un régime doux, végétal, farineux, sucré, et lui prescrivit le lait d'ânesse :

plus tard il lui conseilla une nourriture un peu plus tonique.

Il résulta de ce traitement un mieux sensible; toutefois les accidens que nous allons indiquer subsistèrent, et ce sont les seuls que nous ayons observés. M. D** avait alors quarante-un ans; son teint était peu altéré, et l'embonpoint était même un peu revenu; mais il se plaignait de digérer avec peine, quoique son régime fût régulier et non échauffant, d'éprouver des borborygmes, des tensions sur toute la surface du ventre, avec chaleur, des douleurs dans les reins, et une constipation opiniâtre qui le tourmentait singulièrement. Il ressentait aussi des picotemens, des inquiétudes et des crampes, surtout dans les extrémités inférieures. Ses urines étaient épaisses, et se décomposaient promptement; la poitrine n'offrait aucun désordre; mais sa tête était souvent embarrassée; il accusait des étourdissemens, un vague qui lui rendait parfois toute application impossible; il s'abandonnait, dans d'autres instans, à des craintes variées, et se tourmentait beaucoup des accidens que devait, selon lui, produire tôt ou tard la trop grande quantité de mercure dont il avait fait usage.

M. D** fut soumis à un régime très-léger : aux boissons délayantes, rafraîchissantes, au petit-lait pendant trois à quatre mois; il prit beaucoup de bains, sans en retirer aucun avantage sou-

tenu. Nous avons souvent varié les moyens, et n'avons obtenu aucun succès dans le traitement de cette maladie, qui, d'abord déterminée probablement par l'abus du mercure, a été entretenue depuis par la vie sédentaire et des chagrins de diverse nature. M. D** partit, il y a environ dix ans, pour une petite ville de la province, où il a toujours été traité comme hypocondriaque; et nous avons appris, par des renseignemens authentiques, qu'il y avait terminé sa carrière à l'âge de soixante-deux ans. L'ouverture de son corps fit découvrir un squirrhe au pylore, qui n'avait pas même été soupçonné.

Observation d'une Hypocondrie compliquée d'engorgement du foie.

Mademoiselle B** est âgée de vingt-huit ans, et douée d'une grande vivacité d'esprit, jointe à une imagination ardente et très-mobile. Ses yeux sont grands, vifs et animés, son teint est brun et coloré, ses cheveux noirs et abondans; elle offre un système musculaire bien prononcé, une taille élégante, et un bassin parfaitement conformé. Depuis l'âge de dix-huit ans sa santé a été dérangée; le tribut périodique, d'abord bien établi à quinze ans, s'est supprimé depuis : l'inaction du système utérin entretient un état d'aménorrhée habituelle et de pléthore sanguine irrégulière; quelquefois cependant les règles ont

paru par suite des bains excitans, mais pour manquer à une époque plus ou moins prochaine.

Les digestions sont habituellement difficiles; des vents, des borborygmes se manifestent fréquemment. Cette demoiselle se plaint de tensions spasmodiques vers les hypocondres, de constipation. Il existe des palpitations, de l'oppression, des céphalalgies fréquentes, des rougeurs et chaleurs au visage et à la tête, qui se terminent quelquefois par une syncope : de plus, la malade est tourmentée par des étourdissemens, des bourdonnemens et des tintemens d'oreille, par un vague dans la tête, et des inquiétudes ou des craintes relatives à sa santé, et qui se succèdent ou se remplacent avec une rapidité étonnante.

Plusieurs fois on a eu recours aux sangsues vers les extrémités inférieures, sans résultat favorable bien évident ou soutenu. L'exercice a affaibli cet ensemble de symptômes : le vin de quinquina, à petite dose, a dissipé les maux d'estomac et un peu facilité les digestions; enfin l'usage des fruits fondans, et surtout du raisin, a été utile. Du reste, mademoiselle B** suit un régime régulier.

Cette hypocondrie est caractérisée; et quoique produite par la continence, elle ne présente aucun signe d'hystérie bien prononcé; mais il existe un autre ordre de symptômes; mademoiselle B**

se plaint constamment d'embarras et d'une légère douleur dans l'hypocondre droit, région qui est un peu élevée, et sensible au toucher. Celui-ci fait découvrir dans le foie un engorgement, que l'on peut présumer n'être ni très-ancien ni irrémédiable. Cette dernière affection surtout me semble susceptible de se dissiper par l'usage longtemps continué des bains, par des voyages à Barèges ou Vichy, par un régime et un traitement appropriés, et spécialement par un mariage convenable, que j'ai déjà conseillé fréquemment. Ce qui me semble confirmer l'affection du foie, c'est que le teint de la malade est parfois extrêmement jaune, et que son père a succombé, à quarante-cinq ans, à une hépatite chronique.

Mariée depuis un an, cette personne n'a éprouvé depuis lors aucun des accidens que nous venons de mentionner.

Observation analogue (abrégée).

« Un officier, âgé de quarante ans, d'une constitution *pituiteuse*, fit d'abord plusieurs campagnes, et fut ensuite employé à l'état-major de l'armée d'Italie. Il travailla pendant plus de deux mois avec une grande assiduité, ne se plaçant pas directement devant son bureau, mais se penchant sur le côté gauche, et se tenant très-courbé, parce qu'il est d'une haute taille, et

qu'il a la vue basse. L'invasion de sa maladie fut causée par des excès avec une femme qui lui fit boire des liqueurs fortes; le jour même il éprouva une si violente résolution de ses forces, qu'il en conçut une grande frayeur, et rendit presque aussitôt quelques gouttes de sang par la bouche et par les narines. Il sentit dans tout son corps des tremblemens et des mouvemens, tels qu'en auraient produits des bulles d'air, qui de l'épaule gauche seraient descendues vers les reins, et de là le long de la cuisse du même côté. Après s'être un peu remis, cet officier se rendit à l'état-major, où il but un verre de vin qui lui fit encore venir du sang à la bouche; quelques instans après ses jambes s'engourdirent; il fut pris d'une grande difficulté de respirer, et d'un sentiment de faiblesse entre les septième et huitième côtes, en comptant de haut en bas. On le ramena chez lui; il dormit assez bien la nuit suivante, et se réveilla avec une migraine affreuse, qui se dissipa. Mais pendant trois mois il fut toujours très-souffrant; c'était une faiblesse extrême, une douleur dans l'épaule gauche, des frémissemens dans tous les muscles. Les boissons semblaient tomber de toute leur pesanteur dans l'estomac; les digestions se faisaient mal; et le malade devint très-maigre. Il consulta, à cette époque, un médecin du quartier-général, qui lui dit qu'il était attaqué d'une maladie nerveuse

et compliquée ; on lui fit prendre un purgatif, qui eut mille peines à entrer dans l'estomac, et faillit le faire périr. Au printemps il revint dans sa famille, toujours souffrant, toujours inquiet, mais moins qu'en Italie. A Paris il consulta plusieurs médecins, qui lui confirmèrent que sa maladie était nerveuse. Il prit alors quelques stomachiques spiritueux, et en éprouva plus de mal que de bien. L'hiver lui fut très-contraire. Plus tard il alla aux eaux de bains, puis se mit à l'usage du lait, et se trouva très-bien de ce régime. Il est sensiblement mieux dans ce moment, mais il n'est pas guéri ; ces tremblemens dans les membres, cette douleur dans l'épaule gauche, cette faiblesse, entre les septième et huitième côtes, se font encore sentir par intervalles : en plaçant l'oreille sur la région de l'estomac, tandis que le malade boit, on entend que les boissons n'entrent dans ce viscère qu'après avoir vaincu un obstacle ; le pouls est dans l'état naturel, mais le malade est habituellement resserré, et éprouve la plupart des symptômes de l'hypocondrie ».

Je pense, avec l'auteur de cette observation, M. *Gérard* (1), que l'ordre dans lequel il a rétabli les faits, et décrit les symptômes, permet de croire que c'est une lésion de l'orifice œsopha-

(1) Perforations de l'estomac, par M. *Alex. Gérard*, p. 34.

gien de l'estomac, compliquée d'hypocondrie. La multiplicité, et peut-être la prédominance des phénomènes propres à l'état nerveux, ont à tort fait considérer cette maladie comme une simple névrose.

CINQUIÈME SECTION.

Parallèle de l'Hypocondrie avec les maladies qui s'en rapprochent, mais faiblement.

Les affections dont il me reste à tracer le parallèle avec l'hypocondrie, sont loin sans doute de lui ressembler par leur ensemble; cependant comme quelques-uns des traits qu'elles présentent, soit ordinairement, soit accidentellement, ont pu être rapportés à cette vésanie, pour suivre la marche que j'ai adoptée, j'examinerai rapidement chacune de ces affections.

Les rhumatismes et la goutte occupent des siéges si variés, et sont sujets à un si grand nombre de déplacemens, qu'ils peuvent primitivement ou consécutivement se fixer sur les organes de l'abdomen, et se dérober à la sagacité du médecin en simulant l'hypocondrie. Ils peuvent, et la goutte surtout, par leur présence sur les viscères abdominaux, avant même de s'être manifestés au-dehors, donner lieu à cette névrose, ou à des accidens qui s'en rapprochent beaucoup. Il importe de reconnaître ces différens états, afin de bien établir son diagnostic, et de

diriger le traitement d'une manière convenable.

On reconnaît ordinairement le rhumatisme à ses causes spéciales, qui sont presque toujours l'impression du froid, l'humidité, et surtout les refroidissemens, à sa mobilité, à une intensité extrêmement variable depuis la disparition totale, mais momentanée, jusqu'aux crises les plus violentes, aux exacerbations qu'occasionnent les changemens de température, et plus rarement les affections morales; ce qui est l'inverse pour l'hypocondrie, dont les causes, les phénomènes et la marche sont très-distincts.

On sait que la goutte (1) provient, le plus souvent, d'une disposition héréditaire, de l'abus des liqueurs et de la bonne chère; qu'elle se déclare depuis quarante jusqu'à soixante ans, tandis que l'hypocondrie survient depuis l'âge de vingt et surtout de trente à quarante ans. Leurs phénomènes sont également différens : la goutte attaque spécialement les petites articulations, où elle cause des douleurs aiguës, et forme des nodosités; elle revient par accès irréguliers, avec chaleur, rougeur et gonflement des parties; tandis que l'hypocondrie

(1) Je parle ici de la goutte la plus générale, assez improprement appelée *goutte des riches :* il en est une autre qui a été très-bien décrite dans une dissertation inaugurale par le docteur *Landré Beauvais*, et à laquelle il a donné le nom de *goutte atonique*, et qui réclame l'usage des fortifians, etc.

est continue ; celle-ci est accessible aux efforts de l'art, aux moyens moraux, aux règles hygiéniques qui échouent presque toujours contre la goutte. Leur analogie la plus frappante résulte de leurs terminaisons : l'une et l'autre présentent, après un laps de temps plus ou moins long, des complications ou des résultats très-graves, soit des phlegmasies chroniques, soit des dégénérescences organiques ; mais la goutte offre cette particularité, qu'elle donne lieu plus fréquemment, par suite de son déplacement, à des accidens aigus, qu'à des inflammations qui marchent lentement : on remarque une circonstance inverse dans l'hypocondrie. Ces terminaisons fâcheuses sont, pour la première, une suite commune des traitemens indiscrets, tandis que dans la seconde elles sont une conséquence plus naturelle et plus immédiate de la marche de l'affection.

L'estomac et les intestins sont, de tous nos organes, ceux que la goutte anomale consécutive affecte le plus souvent, et les phénomènes qui résultent de ce déplacement morbifique, ressemblent beaucoup aux symptômes ordinaires de l'hypocondrie : on reconnaîtra cette cause aux attaques régulières de goutte qui auront précédé, à l'emploi inconsidéré, sur les articulations malades, des émolliens ou narcotiques et des répercussifs, qui auront déplacé le principe de

la goutte; enfin, à la nature des accidens plus circonscrits dans l'abdomen, à l'absence de l'exaltation mentale, si familière aux hypocondriaques. Il se peut aussi que la sensibilité exaltée des organes abdominaux dans les affections nerveuses, appelle en quelque sorte sur ces parties la maladie arthritique.

On favoriserait cette métastase en se conformant au conseil donné par *Barthez* (*Traité des Maladies goutteuses*), qui engage à appliquer les calmans, dans le rhumatisme goutteux, sur les articulations malades : cette pratique serait contraire aux vrais principes de médecine, et, quoique étayée d'un nom célèbre, n'en serait pas moins très-préjudiciable au plus grand nombre des malades chez qui on en ferait l'application. C'est du moins ce que des faits multipliés m'ont démontré, ainsi qu'à beaucoup d'autres médecins. En résumé, on peut affirmer que les causes, les accidens, les signes, le siége, la nature, et les terminaisons de l'hypocondrie, et des affections goutteuses ou rhumatismales, diffèrent essentiellement.

Qui ne s'étonnerait qu'on ait pu confondre le scorbut avec les affections hypocondriaques; cependant des auteurs ont pensé qu'il devait être considéré comme le dernier degré de ces maladies, et d'autres ont même avancé que le scorbut et l'hypocondrie n'étaient qu'une seule et même

affection : cette opinion a compté pour partisans *Eugalenus, Sennert, Etmuller, Willis*, et *Barbet*, qui appelait cette névrose *la mère du scorbut : Mater scorbuti à Barbetto salutatur*, dit *Etmuller*. Mais l'auteur qui a donné le meilleur traité sur le scorbut, a rallié, de nos jours, tous les praticiens à une observation plus exacte. L'hypocondrie, dit *Lind*, n'a aucune connexion avec le scorbut ; le siége, la cause, et surtout les symptômes de cette maladie, en sont entièrement distincts ; de sorte qu'il est très-difficile de trouver un symptôme constant qui leur soit propre ; seulement il regarde l'hypocondrie comme cause disposante du scorbut.

Nous allons indiquer, afin de rendre le tableau d'opposition plus frappant, les principaux symptômes de l'affection scorbutique, qu'il sera facile de rapprocher des phénomènes propres à l'hypocondrie, et pour lesquels nous renvoyons aux pages 331 et suivantes.

Les causes spéciales du scorbut sont le mauvais air, l'humidité, la malpropreté, une nourriture insuffisante, les affections morales, l'abus des plaisirs, l'excès de fatigue, peut-être l'influence de la mer ; les symptômes qu'il détermine le plus souvent, sont une débilité générale, des douleurs locales, l'altération des gencives, des ecchymoses, la roideur des articulations, l'inertie pour le mouvement, la constipation,

plus souvent la diarrhée, des hémorrhagies passives, et parfois des ulcères; enfin, un désordre plus ou moins varié, auquel le moral de l'individu participe beaucoup moins que dans l'hypocondrie.

C'est en ne distinguant pas les complications de l'hypocondrie et du scorbut, que certains auteurs ont admis l'identité de ces deux maladies. Le fait suivant, dont nous traçons une analyse exacte, nous présente encore cette névrose compliquée avec une affection scorbutique, et considérée cependant comme une hypocondrie simple (1).

Un homme, d'un tempérament très-bilieux, se nourrissait, par préférence, d'alimens solides et secs. A l'âge de quarante ans, vie sédentaire, et régime émollient observé avec une exactitude minutieuse: peu à peu l'hypocondrie se déclare; plusieurs médecins l'attribuent à la pléthore des vaisseaux hémorrhoïdaux, et conseillent l'usage des eaux minérales, les saignées, l'application des sang-sues, et de fréquens purgatifs. Une amélioration éphémère parut résulter de ce traitement; mais le désordre fit des progrès. Le malade fut mis au régime des femmes en couches, aux alimens doux, aux bouillons légers, gélatineux, etc. Bientôt il survient une fièvre inter-

(1) Dissert. Koch. *Strasbourg*, 1752.

mittente à laquelle on oppose les purgatifs, et ensuite les incrassans. L'appétit était entièrement tombé, le ventre de plus en plus tendu, les flatuosités augmentaient, les facultés intellectuelles étaient même affaiblies. Pour les uns, la maladie venait de l'imagination; pour les autres, elle était incurable.

Un médecin persuada au malade de prendre, pour nourriture, des mets simples et solides, conformes à son goût, mais en petite quantité; il lui prescrivit des médicamens analogues à ces alimens (ils ne sont pas indiqués). Bientôt l'appétit et les forces se rétablirent, et *les symptômes les plus graves et les plus alarmans de l'affection scorbutique, furent chassés de la bouche et de la surface du corps.*

Il manque sans doute à cette observation la description de ces accidens scorbutiques, qui ne sont pas dépeints par l'auteur; mais telle que nous la voyons, ne nous offre-t-elle pas, non l'hypocondrie simple, mais bien cette vésanie compliquée de scorbut?

Parmi les maladies qui offrent moins de rapports avec cette névrose des organes digestifs, on peut citer l'apoplexie, et cependant il est quelques cas où des symptômes nerveux graves, survenant accidentellement chez une personne hypocondre, peuvent simuler l'affection cérébrale, bien que celle-ci n'ait point de rapports di-

rects avec l'hypocondrie. *Exemple :* Une dame hypocondriaque fut prise au milieu de la nuit de symptômes nerveux très-violens; on craignit une apoplexie, et on vint précipitamment réclamer mes soins ; je m'y rendis, et j'appris que cette dame était depuis long-temps en proie à des maux de nerfs, à des digestions pénibles, à des étourdissemens et à des craintes continuelles relatives à sa santé. Elle avait éprouvé ce soir même des maux de tête violens, des étourdissemens. Enfin la crainte d'une apoplexie avait gagné la malade et ensuite les parens. Mais ne trouvant point dans son état les phénomènes qui caractérisent l'affection cérébrale, je les rassurai, et prescrivis une potion calmante. Le désordre dépendait spécialement d'un genre de vie beaucoup trop sédentaire, et fut promptement guéri par un régime convenable et de fréquentes promenades.

Cette observation nous démontre que les symptômes accidentels de l'hypocondrie peuvent simuler ou une attaque d'apoplexie ou ses phénomènes précurseurs : en effet, nous trouvons presque également dans l'une et l'autre maladie, le chancèlement, *vacillatio*, le tremblement, le vertige, les éblouissemens, la stupeur, l'engourdissement, l'insensibilité des sens, l'assoupissement, l'affaiblissement ou la perte de mémoire, les tintemens d'oreilles l'incube, etc.

On évitera l'erreur, en se rappelant que cette

névrose a une marche lente, et qu'elle présente une telle foule de symptômes ou d'accidens qu'il n'est presque aucune maladie qu'elle ne puisse simuler. On sait en outre qu'elle atteint surtout les adultes, tandis que l'apoplexie se voit plus souvent chez les vieillards. Il existe fréquemment une disposition physique à cette affection cérébrale ; un embonpoint très-prononcé, une tête volumineuse et le cou court. Dans cette dernière, la respiration est plus profonde, ronflante, avec resserrement des narines ; le grincement des dents pendant le sommeil, ou plutôt pendant la somnolence, est bien plus fort ; il y a paralysie subite et plus ou moins prononcée de la langue; souvent le malade est saisi brusquement d'une douleur de tête très-vive, et marche plus difficilement, ou tombe de suite à terre. Quand malgré ces données il reste de l'incertitude, le médecin doit parer au plus pressant, et employer les moyens préservatifs ou curatifs de l'apoplexie les moins susceptibles de nuire à l'état nerveux, si toutefois il existe. Il ne peut résulter de cette conduite qu'un mal très-léger, en comparaison des inconvéniens qui proviendraient de l'inaction ou d'un traitement simplement anti-spasmodique dans le cas d'une affection cérébrale. Il sera plus difficile de se méprendre lorsqu'il surviendra une attaque véritable chez un homme qui aura joui jusqu'alors d'une bonne santé ; mais un

hypocondriaque peut être frappé d'apoplexie au milieu de sa maladie nerveuse : l'observation suivante nous en fournira la preuve. M. D**, d'un tempérament sanguin, était sujet depuis plusieurs années à l'hypocondrie morale la plus prononcée. Il avait éprouvé en province une véritable affection cérébrale. Trois ou quatre ans après, toujours en proie à ses maux de nerfs, il est pris un soir de malaise, d'étourdissemens, de maux de tête, de rougeur au visage, de trouble dans les idées, et d'embarras vers la langue. L'apoplexie était imminente; on la prévint par une forte saignée et des boissons laxatives.

Un traitement convenable, des promenades fréquentes, l'habitude des diversions les plus agréables, ont rendu ce malade, après dix mois de soins assidus, à une santé parfaite.

La présence des vers dans l'estomac ou les intestins trouble les fonctions digestives, et occasionne une foule d'accidens qui peuvent donner lieu à des méprises : toutefois, en examinant avec soin l'état du malade, on distinguera d'une hypocondrie la disposition vermineuse aux symptômes suivans : appétit variable, ou plutôt alternatives d'appétit vorace et d'inappétence; salivation, haleine acide, état pâteux de la bouche, coliques vagues, chaleurs, élancemens et douleurs dans les reins, en différens points de l'abdomen, et surtout dans le trajet du rectum,

prurit au sphincter, selles d'une nature particulière, souvent blanchâtres ou verdâtres, dilatation des pupilles, resserrement vers la gorge, décubitus sur le ventre. Dans les affections vermineuses simples le moral est rarement affecté d'une manière sensible ou continue.

Quelques malades éprouvent des symptômes moins constans, et qui se remarquent surtout chez les individus tourmentés par le ver solitaire. Dans ces cas distincts, l'indice le plus certain, c'est la sortie des vers et la diminution concomitante des accidens. Si les phénomènes résultans d'une disposition vermineuse peuvent induire en erreur après un examen superficiel, ils n'échapperont pas à l'œil attentif d'un observateur qui saura les distinguer des phénomènes propres de la vésanie, à moins que celle-ci ne soit produite par cette cause, ce qui est non-seulement rare, mais encore peu probable. Des vers peuvent se former consécutivement chez un hypocondriaque, mais ce cas est différent.

Parlerai-je en outre des accidens de la grossesse, tels que les nausées, les vomissemens, les coliques, le malaise général, les pesanteurs, les douleurs de reins, d'estomac, de poitrine, le trouble des digestions, l'exaltation de la sensibilité générale, les antipathies ou les aversions singulières, les écarts de l'imagination, l'irascibilité, et parfois la bizarrerie ou l'humeur aca-

riâtre de certaines femmes, et qui présentent beaucoup d'analogie avec les phénomènes de cette névrose ; sans doute ils pourraient être considérés dans certains cas de grossesse ignorée, comme une sorte d'hypocondrie. Mais après le quatrième mois, les mouvemens de l'enfant et les autres signes qui dénotent cet événement feront cesser l'incertitude ou l'erreur.

Un petit nombre de symptômes nerveux, sans doute prédominans, ont suffi pour tromper quelques médecins : ainsi l'urine sédimenteuse, et les douleurs lombaires plus ou moins vives qu'éprouvent certains malades, ont engagé des auteurs à voir dans l'hypocondrie une néphrite ; cependant ces deux maladies sont tellement distinctes, qu'il nous semble inutile de nous arrêter sur cette méprise ou sur les moyens de l'éviter ; ce qui sera toujours facile, en donnant aux accidens morbifiques une attention suffisante : mais elles peuvent se compliquer, et c'est ce qu'il est également important de reconnaître.

La chlorose que l'on observe si souvent chez les jeunes personnes faibles et délicates, peut être confondue avec l'affection hypocondriaque. En effet, l'état des jeunes filles chlorotiques présente beaucoup d'analogie avec l'hypocondrie ; toutefois ces deux affections diffèrent essentiellement : dans la première, il y a bien un trouble des fonctions digestives, quelques symptômes

nerveux ; mais il existe de plus la décoloration de la peau, la bouffissure, une sorte d'œdématie des extrémités, d'inertie physique et morale, un appétit déréglé, des goûts bizarres, l'état muqueux de la langue. L'hypocondrie, qui d'abord est fort rare chez les jeunes personnes, nous présente un plus grand nombre de symptômes nerveux, un état d'exaltation mentale, de sollicitude sur la santé, qui lui donnent une physionomie distincte de celle de l'affection chlorotique. Celle-ci affecte exclusivement les jeunes personnes dont la constitution est très-affaiblie : on rencontre au contraire la seconde à des âges différens, dans l'un et l'autre sexe, chez les individus débiles, parfois aussi chez des personnes douées d'une forte constitution, et d'un tempérament sanguin. La chlorose reconnaît pour causes spéciales, la langueur du principe vital, une indolence générale, jamais, peut-être, l'excès d'activité physique et morale. Leur traitement diffère sous plusieurs rapports : une nourriture fortifiante, et tous les moyens excitans ne conviennent constamment que dans la chlorose; les saignées locales ou générales, les laxatifs, les délayans, les bains tièdes, etc., qui réussissent dans beaucoup d'hypocondries, ne sont nullement applicables au traitement des autres affections éminemment atoniques. Celles-ci, du reste, se guérissent en général plus facilement que

l'hypocondrie; remarquons en outre que les terminaisons et complications de cette dernière sont plus variées que celles de l'autre affection : ici on doit craindre spécialement la phthisie pulmonaire, affection propre à cet âge, et conséquence trop ordinaire de la débilité générale. Toutefois, comme nous l'avons dit, la chlorose peut donner naissance à l'hypocondrie, ou cette névrose s'adjoindre à la maladie chlorotique : dans l'un et l'autre cas, celle-ci aura précédé la vésanie hypocondriaque, et le commémoratif éclairera le diagnostic du médecin. Mais cette réunion est rare, vu qu'en général la chlorose est une maladie de l'âge pubère, et propre au sexe; tandis que l'hypocondrie est une affection de l'âge mûr.

Souvent dans cette dernière il existe des palpitations nerveuses qui simulent les anévrismes du cœur; mais les maladies de l'organe central de la circulation se reconnaissent aux phénomènes suivans : couleur rouge, violette de la figure, et surtout des lèvres, du nez et des paupières, battemens du cœur constans et tumultueux, souvent très-étendus, quelquefois avec bruissement, augmentés par l'exercice; gêne plus grande de la respiration, syncopes, irrégularité, froid des extrémités; parfois intermittence du pouls, et impossibilité de la situation horizontale.

Quand cette série d'accidens n'existera pas,

on sera autorisé à considérer les palpitations comme dépendant d'une sensibilité exaltée, ou symptômes de cette névrose. Dans certaines circonstances, tout le désordre que nous venons d'indiquer existe, sans qu'il y ait altération organique du cœur : ces cas sont rares; mais comme ils ne sont pas sans exemple, il convient de les rappeler, afin de prévenir ces diagnostics, qui tourneraient à la honte du médecin.

La phthisie pulmonaire est un fléau qui cause tant de ravages, qu'elle peut marquer ses victimes parmi les sujets affectés d'hypocondrie, soit par suite du désordre résultant de cette dernière affection, soit par le fait seul de l'extrême fréquence des maladies de poitrine. Lorsque la sensibilité des organes contenus dans cette cavité se trouve exaltée, on peut méconnaître une vésanie véritable, et admettre une lésion du tissu pulmonaire qui n'existerait pas réellement; dans d'autres cas, comme nous l'avons vu dernièrement, les symptômes d'une phthisie imminente sont méconnus, et considérés comme des accidens nerveux, ou les résultats de craintes paniques ou au moins exagérées.

Baumes a également cherché à prévenir les médecins contre une sécurité perfide. « L'hypocondrie, dit-il, peut masquer une phthisie; et si l'on se persuade que les plaintes des malades sont sans fondement, on néglige de la combattre; le

malade succombe, tandis qu'il eût été possible d'en prévenir l'invasion ou d'en arrêter les progrès. »

Nous indiquerons succinctement les symptômes et les caractères généraux et spécifiques de la phthisie, qui du reste sont assez généralement connus. Ce tableau, comparé avec les symptômes propres à cette vésanie, suffira pour enlever jusqu'au moindre doute.

Disposition héréditaire ou constitutionnelle, taille élancée et grêle, poitrine étroite, épaules ailées, maigreur générale, douleurs sympathiques, yeux caves, dents d'un blanc mat, teint pâle et pommettes rouges, couleurs fouettées, voix rauque ou cave, fréquence des catarrhes, dyspnée habituelle, grande susceptibilité au froid et aux variations de l'atmosphère; toux petite, presque continuelle, sèche, ou avec expectoration variée et plus ou moins abondante, malaise et oppression après le repas, surtout quand il a été copieux, ou lorsqu'on a bu des liqueurs alcooliques; chaleurs passagères avec soif, et qui acquièrent bientôt une durée continue; dès-lors soif intense, mouvement fébrile avec sueurs nocturnes locales ou générales, et très-copieuses, nausées, vomissemens, suffocation, hémoptysie, diarrhée colliquative, amaigrissement rapide, œdème qui précède l'anéantissement des forces vitales. Tous ces phénomènes suivent ordinaire-

ment, dans leur développement, un ordre très-irrégulier, et alternent souvent entre eux.

Baillou rapporte avoir vu traiter, pour un catarrhe, une hypocondrie avec douleurs dans la poitrine; d'autres fois on s'est mépris jusqu'à voir des inflammations aiguës dans des accès d'hypocondrie, *et vice versâ*. Aussi *Huxham* assure-t-il, dans son *Essai sur les Fièvres*, que plusieurs fois on a confondu la péripneumonie avec des attaques de cette névrose.

Si l'on voulait rapporter tous les exemples de méprises sembables, la tâche serait effrayante, et ces citations deviendraient inutiles; il nous a paru plus avantageux, pour assurer le diagnostic dans les affections hypocondriaques simples ou compliquées, de bien établir les phénomènes caractéristiques de cette vésanie, d'indiquer les traits distinctifs particuliers à chacune de ces affections qui sont susceptibles de simuler ou de compliquer la névrose des organes digestifs.

Mais voyons à présent l'opinion que le médecin doit se former de l'issue probable de l'hypocondrie, puisque, outre la nécessité de reconnaître la maladie, et une application soutenue pour la guérir, ce qu'on exige le plus ordinairement de lui, c'est d'en exposer les dangers, ou d'annoncer les espérances qu'il est permis de concevoir.

CHAPITRE IX.

Pronostic de l'Hypocondrie.

On peut, en général, considérer l'hypocondrie comme une affection dont le traitement est parfois difficile à déterminer, mais qu'on peut presque toujours espérer de guérir quand on fait choix des moyens curatifs indiqués par la cause, les circonstances dans lesquelles le malade se trouve placé, et par les divers accidens qu'il éprouve. C'est parce que beaucoup de médecins ont négligé de rechercher l'origine de la maladie, et ont méconnu les bases véritables du traitement, que le prognostic de cette vésanie a tant varié, et qu'il a été souvent trop sévère; tandis que, prononcé d'une manière générale, il doit être au contraire beaucoup plus favorable et consolant, que propre à décourager.

Mais ce pronostic diffère suivant une foule de circonstances que nous allons exposer.

Lorsque la maladie est récente, que les symptômes sont en petit nombre et peu prononcés, quand le sujet est jeune et vigoureux, la cause bien connue et amovible, on peut conserver l'espoir d'une prompte et parfaite guérison. Si les circonstances sont opposées, si des affections morales irrémédiables viennent assaillir le malade, s'il a déjà éprouvé plusieurs atteintes d'hy-

pocondrie, la guérison en sera moins certaine : plus on aura opposé de moyens sans succès, et mieux ils auront été indiqués, plus on devra craindre une névrose longue et rebelle, à moins que les efforts de l'art n'aient été dirigés contre un symptôme, ou un effet de la maladie plutôt que contre la cause qui l'a produite, ou contre l'affection elle-même. Qu'un homme sujet à un flux hémorrhoïdal, le supprime, et contracte, par suite, une hypocondrie plus ou moins grave : dès-lors le système digestif ne fait plus ses fonctions, le malade ressent de la faiblesse et dépérit; on lui prescrit l'usage des toniques, un régime fortifiant, et autres moyens indiqués par les symptômes que présente son état; mais le mal persiste : on se détermine à rechercher la cause, et à l'application des sangsues; le flux hémorrhoïdal reparaît, les digestions se rétablissent, et tout rentre dans l'ordre.

Le pronostic est encore modifié par les symptômes de cette vésanie.

Quand le malade est privé du sommeil, et ne peut se le procurer à l'aide des narcotiques, il est dans une disposition défavorable; de même, lorsque l'imagination est fortement frappée, les phénomènes physiques étant même peu prononcés, ou si, à la moindre douleur, au plus léger désordre, l'hypocondriaque s'affecte et se tourmente d'une manière démesurée. En outre,

le pronostic varie suivant le degré auquel est parvenue la maladie; on reconnaît généralement qu'aux premier et deuxième degrés elle est peu dangereuse, et très-susceptible de guérison; souvent même au troisième degré, on parvient à la dissiper par un traitement convenable. Les peines de l'âme et l'excès du travail sont deux des causes les plus puissantes de cette névrose : si le malade ne peut se soustraire à l'empire de ces affections morales, ou si son existence, celle même de sa famille, sont liées à cette contention d'esprit habituelle, il est à craindre qu'il ne reste long-temps en proie au désordre qu'il éprouve.

J'ai déjà cité l'exemple d'un de mes clients qui vit, depuis quinze ans, dans un état d'hypocondrie très-peu grave. Obligé de consacrer tout son temps, matin et soir, aux travaux du cabinet, il ne peut guérir radicalement; mais s'il quitte pendant quinze jours seulement un genre de vie aussi sédentaire, il retrouve de suite et momentanément une parfaite santé : est-il tourmenté par des inquiétudes un peu vives, il ressent aussitôt un paroxysme de plusieurs jours. Cette affection n'a fait jusqu'ici aucun progrès sensible, parce que la somme des consolations que lui offre un intérieur doux et agréable, l'a toujours emporté sur les inconvéniens permanens d'une profession aussi contraire.

Un prompt amaigrissement et une altération profonde de la physionomie, sont d'un fâcheux augure, et font appréhender l'imminence et les ravages sourds d'une maladie plus grave, d'une affection organique.

Le jugement qu'on peut porter sur l'issue de ces maladies varie encore suivant quelques circonstances particulières. Ainsi, chez un individu, le défaut de fortune sera l'obstacle à la guérison, qui dépendra de l'exercice de la voiture qu'il ne pourra se procurer : tel autre, véritable *Crésus*, faute d'un état, d'une occupation mécanique, reste plongé dans une hypocondrie stationnaire, malgré tous les efforts de la médecine; c'est à ces malades qu'il ne manque, pour être promptement rétablis, que l'obligation du travail, comme il ne manquait à un jeune prince, doué d'un beau talent pour la peinture, *qu'un peu de nécessité* pour devenir un grand peintre. En général, parmi les ouvriers, le changement d'état plus facile favorise, dans bien des cas, le succès du traitement. J'ai guéri plusieurs artisans atteints d'hypocondrie, par l'échange seul d'une profession sédentaire pour une plus active, secondé de quelques moyens hygiéniques et moraux.

Nous avons déjà remarqué combien les auteurs ont varié sur le pronostic à établir dans cette maladie : *Tissot*, par exemple, porte un juge-

ment beaucoup trop sévère : *At verò morbus profectò rebellis est et vix curationis capax;* ce qu'on peut attribuer au choix des moyens qu'il employait, et au peu de succès qu'il en obtenait; tandis que *Baglivi*, plaçant principalement sa confiance dans les nombreux avantages qu'offre l'hygiène, présente un pronostic bien plus satisfaisant, et plus conforme à l'observation : *Et licet talium hominum morbi primo aspectu perniciosi et incurabiles videantur; sanari tamen solent facilè non quidem per nimiam remediorum copiam, sed aut per grata amicorum colloquia, aut per honesta ruris oblectamenta et equitationes frequentes, aut tandem per vivendi normam à sagaci medico institutam.*

« Bien que ces maladies paraissent, au premier coup-d'œil, pernicieuses et incurables, elles guérissent ordinairement avec facilité, non par une trop grande quantité de médicamens, mais par la société et la conversation agréable de nos amis, par l'exercice et les amusemens de la campagne, par de fréquentes promenades à cheval, ou enfin à l'aide d'un bon régime prescrit par un médecin prudent et expérimenté (1) ».

---

(1) Le nom de *Tissot* est plus connu des gens du monde, mais le suffrage de *Baglivi* est confirmé par l'expérience, et doit être pour nous une autorité du plus grand poids. Le médecin de Lausanne n'a pu d'ailleurs observer cette maladie

Ce n'est pas là le conseil que donne *Montanus : Fuge medicos et medicamina, et sanaberis.*

Mais combien d'hypocondres ont fui les médecins et leurs avis, sans avoir retrouvé la santé, et chez qui la continuité des accidens a fini par entraîner des désordres bien plus graves, et que des conseils sages, sans abus de médicamens, auraient pu prévenir.

Baglivi défend l'abus des remèdes, *nimiam remediorum copiam ;* mais il recommande un genre de vie prescrit par un médecin éclairé, parce que celui-là seul pourra reconnaître la cause et la nature de l'affection ; enfin fixer les bases véritables du traitement.

Quant à cette névrose il se joint des complications, le pronostic est relatif à la gravité de ces dernières maladies.

Si la complication ne présente qu'une hypocondrie récente ou peu prononcée, et une autre affection d'une nature bénigne, le jugement du médecin sera basé sur la difficulté qu'offre le traitement de deux maladies marchant simultanément, et qui réclament quelquefois des médicamens de nature opposée : nous en voyons un exemple, lorsqu'à cette vésanie il se joint une

---

comme le célèbre praticien de Rome, placé dans un cercle immense, dans une ville où se trouvent réunies toutes les causes productrices de la maladie.

disposition dartreuse ; souvent alors la constitution est affaiblie, les toniques sont, par cette raison, indiqués; et en même temps, la plupart sont contre-indiqués par l'affection de la peau.

Mais quand avec la névrose des organes digestifs il co-existe une altération profonde, soit de l'estomac, du foie ou de la rate, etc., soit des poumons ou du cœur, la vie de l'individu est gravement compromise, et le prognostic du médecin doit exprimer toutes les craintes qu'il éprouve, et qu'on doit dissimuler au malade, et quelquefois à des parens ou à des amis trop susceptibles; mais alors ce n'est pas l'hypocondrie qui peut devenir cause de mort, mais bien la maladie qui forme complication.

CHAPITRE X.

Anatomie pathologique.

L'HYPOCONDRIE étant une maladie chronique, dont la cause immédiate réside principalement dans une affection des propriétés vitales imperceptible à nos sens, et dont le siége spécial occupe très-probablement les différens systèmes nerveux, ganglionaires, et spécialement ceux qui se distribuent aux viscères abdominaux, on doit s'attendre à ne trouver, le plus souvent, aucune altération dans le tissu de ces organes, ni dans celui des nerfs qui s'y distribuent.

On connaît le résultat différent que présente l'inspection anatomique des nerfs dans les névroses et les névralgies : dans les premières, nulle trace d'une lésion quelconque : dans les névralgies, au contraire, il existe presque constamment un désordre, un changement plus ou moins sensible dans le tissu des nerfs (1).

Il en est de cette affection comme de l'hystérie, de la mélancolie et des aliénations mentales; elle ne fait presque jamais périr l'individu qui en est affecté; et quand cet événement arriverait dans une hypocondrie bien simple, il est encore probable que les recherches les plus exactes, faites après la mort, ne nous procureraient aucun renseignement positif; en un mot, aucune lumière sur la cause organique, sur la nature et les phénomènes de la maladie, parce qu'il n'existe dans ces vésanies aucune altération de tissu. Celles qu'on a rencontrées dépendaient presque toujours d'une complication, et non de l'affection nerveuse.

Ne sait-on pas que la même lacune existe, et existera probablement long-temps dans une foule d'autres cas : c'est ainsi que nous ne pouvons

---

(1) C'est au professeur *Chaussier* que la médecine doit les premières notions exactes sur les névralgies : ces notions sont le fruit d'une observation ingénieuse, et ont accru le domaine de la science.

nous rendre raison, par l'examen des cadavres, de la mort qui termine presque toujours le tétanos traumatique, de celle qui survient dans certaines fièvres malignes ou ataxiques; car les épanchemens séreux que présente alors l'autopsie, sont aussi souvent les effets que les causes de l'affection. Pour qu'on pût procéder avec certitude à la connaissance de la cause intérieure du désordre organique qui produit les phénomènes de l'hypocondrie, il faudrait examiner les différens symptômes, et surtout les viscères abdominaux chez un homme atteint de cette névrose bien simple, et qui aurait succombé accidentellement à une maladie non susceptible de modifier l'état des organes digestifs, telle serait une blessure suivie d'une hémorrhagie mortelle, et, jusqu'à un certain point, une inflammation étrangère aux parties contenues dans l'abdomen. Mais remarquons encore qu'il résulterait même de ces perquisitions faites avec soin, une grande incertitude, puisqu'on trouve très-souvent, chez l'homme atteint d'un plomb meurtrier, au milieu de la santé la plus florissante, des désordres plus ou moins sensibles, des phlogoses partielles, des épanchemens séreux, et surtout des vers ascarides et lombricoïdes; circonstances diverses qu'on pourrait accuser d'avoir entraîné la mort, si on n'en connaissait la cause véritable, étrangère à ces dispositions physiques, qui existaient

sur le vivant et étaient compatibles avec l'intégrité des phénomènes vitaux.

C'est ainsi que dans les inflammations de la plèvre et du poumon, dont l'issue est funeste, on observe sur la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins des traces de phlogose : il n'en est pas moins certain que le malade a été enlevé par une pneumonie, une pleurésie, ou une phthisie pulmonaire, et non par une phlegmasie aiguë ou chronique de la membrane muqueuse des intestins.

Il faut cependant tenir compte des altérations que l'autopsie démontre sur les malades qui ont succombé (dans un état d'hypocondrie) à une autre maladie formant complication : la connaissance de ces terminaisons n'est pas un objet purement spéculatif; elle est au contraire susceptible d'un grand nombre d'applications utiles dans le traitement de ces névroses, dont elle contribuera souvent à prévenir les complications par l'écart des causes capables de les déterminer.

Nous allons parcourir les résultats de l'autopsie ou ces altérations organiques, d'après l'ordre des différens systèmes anatomiques, les examinant d'abord dans les organes de l'abdomen.

On a trouvé l'estomac et les intestins réduits à l'état squirrheux : presque toujours cette dégénérescence commence par la membrane muqueuse

et s'étend par la suite aux autres tissus. C'est surtout vers le pylore que les auteurs ont observé cette désorganisation.

Morgagni a consigné dans ses œuvres l'histoire d'un évêque de Lombardie, dont l'affection hypocondriaque fut aggravée après plusieurs années par des douleurs vives entre l'ombilic et l'épigastre. L'autopsie offrit une végétation squirrheuse à l'entrée du pylore, qui en était obstrué, quoiqu'il conservât son diamètre ordinaire.

Nous avons communiqué, p. 436, l'observation d'un artiste que des contrariétés rendirent hypocondre. Sa maladie changea de nature, et le fit périr. On trouva les traces d'une vive inflammation dans l'estomac. Au rapport de *Rhodius* (1), le colon d'un de ces malades était squirrheux; sur un autre, *Welschius* (2) a rencontré une dilatation énorme de cet intestin par des vents, et le rétrécissement du rectum. D'autres ont offert à *Bonnet* et à *Hæchstetterus* l'engorgement et l'endurcissement des glandes du mésentère, et même des foyers purulens entre ses deux lames. *Wurthon* cite l'histoire d'un hypocondriaque chez lequel on découvrit un vice organique de l'épiploon. Nous ne mentionnerons point les ouvertures qui ont offert une grande quantité de gaz

---

(1) *Rhodius cent. II*, obs. 76.

(2) *Welschius, Disput. de malo hyp.*

ou même de vers dans le canal intestinal, puisqu'on en trouve autant sur presque tous les cadavres, quelqu'ait été d'ailleurs le genre de mort.

Blasius (1) nous a transmis l'observation d'un de ces malades dont la rate endurcie pesait quatre livres. Plusieurs médecins, *Horstius* (2), *Petrus Borellus* (P. Borel), ont également observé l'engorgement de la rate, que *Glisson* (3) affirme avoir souvent rencontré intacte chez des hypocondriaques : il en conclut avec raison que l'on doit ne point considérer cet organe comme le siége de la maladie, et se trouve ainsi d'accord avec *Franc. Sylvius* et *Nath. Hygmore.*

On ne peut adopter l'opinion de *Laurentius* (Laurent), qui rapporte avoir connu une famille distinguée sujette à la mélancolie hypocondriaque, dont plusieurs individus n'ont offert d'autre cause probable que la petitesse de la rate. On doit plutôt conclure de cette assertion, que la cause immédiate de ces vésanies est inconnue, et sera peut-être toujours inaccessible aux recherches les plus suivies. Nous trouvons encore dans le recueil de *Bonnet* l'exemple d'un malade qui avait été long-temps sujet à une hypocondrie très-grave : on examina après sa

---

(1) *Blasius*, obs. anat., p. 127.

(2) Obs. anat. 8e.

(3) *Anatom. hepat., cap.* 45.

mort l'état de l'abdomen ; le rein droit offrait un cyste d'un volume considérable, et rempli d'une sérosité jaunâtre.

Hoffmann découvrit chez un de ces malades l'engorgement du pancréas, que d'autres médecins, tels que *Hygmore* et *Harderus* ont aussi trouvé dans un état de squirrhe et même de cancer. *Riollan* a vu cet organe égaler le volume du foie.

On a observé sur plusieurs hypocondriaques, le sang du système veineux abdominal noir, et distendant les veines. *Guarinonius* (1) a trouvé sur un autre les veines du mésentère tellement dilatées, qu'elles ressemblaient à des intestins. *Mercatus* et *Brunner* ont fait la même remarque. Suivant *With*, les veines mésaraïques et les autres vaisseaux veineux qui aboutissent au foie sont souvent gorgés de sang. Fort de cette observation, il regarde l'hypocondrie comme dépendant d'un engorgement du foie, qui produit l'arrêt du sang dans le système veineux hépatique ; mais n'est-il pas plus raisonnable de ne voir dans ce phénomène pathologique qu'un effet ordinaire de l'agonie, et non une cause de mort.

Rivière (2) cite l'exemple d'une hypocondrie

---

(1) *Guarinonius cons.* 484 ; *Lud. mercatus*, t. III, lib. 1, cap. 17 ; *Brunner, consil.* 7.

(2) *Rivière*, cent. 4, obs. 34.

observée sur un malade qui portait un anévrisme de l'artère sous-clavière, et qui périt avant la rupture de la tumeur. On doit à *Morgagni* (1) l'observation d'un hypocondriaque dont le ventricule gauche avait un volume triple de son état naturel, et communiquait avec le péricarde par trois ouvertures; mais on rencontrera à peine un pareil exemple sur mille individus atteints de cette névrose : ce désordre n'est donc, ainsi que la plupart de ceux dont nous venons d'esquisser le tableau, qu'une complication accidentelle.

D'où vient, dira-t-on, qu'une maladie qui présente tant de phénomènes variés pendant la vie, ne laisse après la mort aucune trace sensible de ses effets dans l'organisation? Le moyen de ne pas se perdre en hypothèses, consiste à ne pas courir après les explications, et à imiter la sage retenue de Cicéron : *Sufficit, si quid fiat intelligamus, etiam si quomodò quidque fiat ignoremus.*

Ces divers résultats de l'autopsie nous prouvent que souvent des lésions organiques viennent compliquer cette affection, et qu'alors la mort du malade doit en être tôt ou tard le résultat. C'est dans ces cas désespérés que l'on sent la vérité de cette sentence : *La témerité des char-*

---

(1) *Morgagni*, lett. 74, art. 15.

latans et leurs tristes succès, qui en sont les suites, font valoir la médecine et les médecins : si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent. (La Bruyère.)

L'expérience journalière confirme la judicieuse observation de ce philosophe : l'aveugle crédulité des gens du monde enhardit l'impudence des médicastres, et l'excessive indulgence du public excuse leurs bévues, parce qu'il n'exige pas d'eux, comme des médecins, qu'ils guérissent toutes les maladies.

Voyons maintenant les ressources qu'offre la médecine dans le traitement de cette névrose, et prévenons d'abord, que si la nature a fixé des limites, établi des barrières que le médecin le plus instruit ou le plus zélé ne saurait franchir, les secours de l'art sont aussi, dans un nombre de cas infini, d'une très-grande efficacité.

CHAPITRE XI.

TRAITEMENT DE L'HYPOCONDRIE.

Considérations préliminaires.

Si nous jetons un coup-d'œil rapide sur la médecine des anciens dans le traitement de cette maladie, nous verrons ce traitement varier comme les idées qu'ils s'étaient faites de la maladie elle-même, recevoir l'impulsion des doctrines régnantes, et manquer en général de ses bases premières ; une exposition claire des symptômes

de l'hypocondrie, de ses causes, des différences qui l'isolent des maladies avec lesquelles elle a des points de contact; et à travers ces modifications si diverses, nous signalerons d'une part la confiance aveugle dans la méthode pharmaceutique; et de l'autre, un traitement plus rapproché de la nature même du mal.

Les caractères principaux de cette névrose ont été notés avec exactitude par *Hippocrate*, mais une carrière immense ouverte devant lui l'empêcha peut-être de donner une attention spéciale au traitement de cette maladie, sans doute moins fréquente à cette époque reculée. Il conseille cependant les purgatifs, un régime humectant, l'abstinence des huileux, des substances grasses, la tempérance, enfin un exercice modéré (1). Il nous a de plus transmis une observation qui, trop généralisée, a induit quelquefois en erreur ceux qui lui ont succédé; il avait remarqué que le flux hémorrhoïdal guérissait des mélancoliques, et dissipait les engorgemens de la rate, d'où l'on a conclu, par la suite, que dans toutes les affections hypocondriaques, cet écoulement devait être avantageux, et que l'art

(1) La gymnastique était si familière aux Grecs, que nous devons entendre par ce conseil d'*Hippocrate* un exercice journalier, continu, mais non porté jusqu'à la fatigue, que presque toujours ils allaient chercher dans les gymnases.

devait suppléer à la nature, lorsque celle-ci ne l'établissait pas. C'est probablement à cette observation très-sage d'*Hippocrate*, répétée par *Galien*, que l'on doit remonter pour trouver la source de la méthode devenue trop générale, ou plutôt de l'emploi abusif de la saignée et des sangsues dans le traitement de cette vésanie. Nous voyons au reste que l'oracle de Cos en conseillant l'exercice, avait pressenti en partie les bases véritables du traitement.

Arétée veut qu'on oublie quelquefois la maladie, ou du moins qu'on suspende le traitement pour s'occuper de restaurer le malade. Quand les forces sont rétablies, dit-il, les traces de la maladie se dissipent. (*Aret., de Melancholiâ.*)

Rien de mieux raisonné que le traitement proposé par *Celse:* il conseillait la lecture à haute voix, la promenade, les exercices du corps, comme les armes, le jeu de la balle, l'usage des bains, les frictions et le bon vin.

Galien réussissait très-souvent par l'usage des bains et un bon régime; mais si le désordre était invétéré, il avait recours à une médecine plus active, aux agens pharmaceutiques.

Entre autres moyens, *Aëtius* conseillait les plaisirs de l'amour. Ce conseil est sans doute fort bon, quand la continence a occasionné ou favorisé la maladie, et surtout dans presque tous les cas d'hystérie; mais donné d'une manière

générale, il offre aussi des inconvéniens, et surtout appliqué à la cure de l'hypocondrie.

Fernel employait souvent une décoction de cerises desséchées. D'autres moyens analogues ou également inertes, ont été préconisés par des auteurs qui leur attribuaient l'honneur d'une guérison, que le temps et l'éloignement des causes, l'exercice, d'autres médicamens, ou un régime approprié, avaient seuls pu déterminer.

Le traitement proposé par *Sennert* porte l'empreinte d'une confiance exclusive dans les médicamens : les évacuans, les sangsues, les saignées, les purgatifs légers, les lavemens, les vomitifs, les amers, les martiaux, constituent la méthode curative adoptée par ce praticien, qui les indique sans établir, pour leur administration, des distinctions assez précises.

Michaëlis nous offre les mêmes principes que *Sennert*, et on retrouve la même déférence pour la doctrine régnante dans les conseils prescrits par *Etmuller*.

Le premier but que se propose *Sydenham*, dans le traitement de cette maladie, c'est de fortifier le sang, source des esprits animaux, et le premier moyen qu'il indique est de saigner et de purger le malade.

Combien la thérapeutique de ce grand homme est loin de répondre au talent qu'il montre pour la description des maladies! Cette différence n'est

jamais plus sensible qu'à l'article de l'hypocondrie, où, pour obéir à une théorie sans fondement, et se ranger à des indications mal déduites, il trace d'abord des règles de conduite dont il est obligé de s'écarter dans la seule observation qu'il cite.

Un prélat d'Angleterre, homme d'un rare mérite, d'un grand sens et d'une érudition profonde, ayant épuisé ses forces par une application excessive à l'étude, tomba dans l'affection hypocondriaque, dont la durée troubla successivement toutes les fonctions, et amena le dépérissement. Le malade prit plusieurs fois des remèdes martiaux ; il essaya toutes sortes d'eaux minérales, auxquelles on joignait de fréquentes purgations ; il eut recours aux anti-scorbutiques de toute espèce, et aux poudres testacées ; mais loin d'en retirer aucun avantage, il tomba dans l'épuisement, et fut pris d'un dévoiement colliquatif.

Tel était l'état fâcheux du malade, lorsque *Sydenham* fut consulté ; il lui conseilla exclusivement l'exercice du cheval, de ne faire au commencement que peu de chemin, et en raison de sa faiblesse ; il l'engagea à n'avoir égard ni à la nourriture, ni à la boisson, ni à la température, enfin à vivre comme un voyageur. (Or on sait que les Anglais font en général bonne chère, et surtout en voyage.)

Notre prélat fut docile ; au bout de quelques

mois il avait fait plus de mille lieues, et il recouvra bientôt une santé parfaite.

Les Stahliens avaient remarqué que le tempérament mélancolique disposait à l'hypocondrie et aux hémorrhoïdes : cette considération venait à l'appui de leur théorie favorite, et confirmait la corrélation qu'ils admettaient entre les affections hypocondriaques et l'écoulement hémorrhoïdal. La cause la plus fréquente de cette maladie était, selon *Stahl*, la suppression du flux menstruel ou hémorrhoïdal ; et le moyen d'y remédier, consistait à rétablir ces évacuations ; mais l'étiologie que nous avons donnée de la maladie est peu favorable à une méthode aussi exclusive. Il est en outre bien probable que l'effusion du sang ne sera d'aucune utilité, toutes les fois que la névrose dépendra d'une cause étrangère à ces hémorrhagies, ou lorsque l'individu sera d'une constitution lymphatique. *Stahl* recommandait l'emploi de la saignée et des sangsues ; il insistait sur le régime et l'exercice, sur l'emploi de ses pilules, et faisait un fréquent usage des médicamens aloétiques.

Fidèle à ses idées systématiques, *Boerhaave* propose d'adoucir l'humeur tenace qui obstrue les viscères abdominaux, par les savonneux, et de la stimuler par tous les moyens possibles, par des boissons, des remèdes hépatiques, anti-hypocondriaques, par les sels neutres, les laxatifs, les

mercuriaux, les vomitifs, les saignées, les bains, les évacuans, les emplâtres; mais il conseille en même temps tous les exercices du corps. *Boerrhaave* est encore un de ces médecins dont on ne peut trop admirer la précision dans les descriptions qu'il nous a transmises, mais dont les méthodes de traitement doivent être employées avec une extrême circonspection.

Si nous analysons les préceptes développés dans les œuvres d'*Hoffmann*, nous serons facilement convaincus qu'avec plus de réserve dans la foi qu'il ajoutait aux médicamens, ainsi qu'à leurs résultats, et avec une confiance moins limitée dans l'emploi des moyens d'hygiène, et l'application de nos facultés mentales, ce praticien eût obtenu les plus brillans succès.

Après avoir énuméré une longue suite de médicamens et d'indications qu'il croit indispensables à remplir, il termine le traitement de l'hypocondrie en conseillant la saignée aux équinoxes du printemps et de l'automne, ou les sangsues lorsqu'il y a tendance aux hémorrhoïdes; ou, lorsque cet écoulement a été supprimé, l'usage des eaux minérales, une température un peu élevée, l'exercice du corps sous un ciel pur, une société agréable, etc. etc.

Rappelons en outre que ce grand praticien adoptait quelquefois comme base principale de sa méthode curative les ressources hygiéniques les

plus efficaces, et ce qu'il dit dans le chapitre où il traite de l'affection hypocondriaque, est une nouvelle preuve de la confiance qu'il leur accordait quelquefois.

Tunc enim optimum præsidium est nullo uti remedio, sed præcipuum sanationis punctum in mutatione ætatis, aëris, vitæ generis, victûsque consistere fidè experientiæ compertissimum est.

Les moyens curatifs indiqués par *With* annoncent aussi un profond observateur; il conseille les amers, la teinture de gentiane quand l'estomac est affaibli, le bon vin, le fer, le bain froid, un air frais; il défend l'usage du thé, et insiste pour l'équitation, l'exercice et les amusemens. Il est à regretter que *With* n'ait pas porté l'esprit d'analyse dans la division des maladies nerveuses.

Ferons-nous entrer dans ce cadre général les hypothèses dont *Pomme* s'est servi pour appuyer le traitement qu'il propose? S'il distingue les symptômes hystériques de ceux qui appartiennent aux affections hypocondriaques, il leur reconnaît la même cause, une lésion particulière du système nerveux, qui détermine le racornissement des nerfs; il lui semble les voir se racornir, selon ses idées, comme une substance végétale desséchée par l'action du feu. Aussi conseille-t-il un mode de curation conforme à cette opinion hypothétique, et recommande-t-il dans tous les cas l'usage des délayans, des humectans et des

bains tièdes. Il est aisé de sentir, malgré les succès que *Pomme* dit en avoir retirés, les inconvéniens d'une méthode aussi banale et invariable, même dans les cas les plus opposés.

Cheyne, auteur anglais très-renommé, veut délayer les humeurs et les adoucir, afin de diminuer leur viscosité, fondre les concrétions salines dont les petits vaisseaux sont incrustés, et rétablir l'élasticité des solides. Les évacuans généraux, les atténuans, comme le mercure, l'antimoine et leurs préparations, surtout celles où ces métaux agissent par leur pesanteur; les sudorifiques et les anti-scorbutiques lui semblent les plus propres à émousser les pointes des sels, à corriger l'âcreté des liquides, et à dissoudre les concrétions salines. Je passe sous silence beaucoup d'autres médicamens dont il fait un étalage pompeux; et j'arrive au traité de *Jo. Odsterdyk Schatz* sur la mélancolie, ou plutôt sur l'hypocondrie. Cet auteur est remarquable par une méthode curative trop générale, mais bien raisonnée, et surtout par son aversion contre les médicamens trop compliqués, et contre les purgatifs. Donnons les mêmes éloges au traitement proposé par *Réveillon;* il conseille de le varier suivant les différens cas, et rapporte avoir vu les plus mauvais effets de l'usage des bains et des délayans chez des malades déjà affaiblis.

Cullen avoue qu'il manque d'observations suf-

fisantes pour établir d'une manière précise les bases du traitement convenable à l'hypocondrie, et les conseils qu'il donne sont bien propres à nous confirmer dans l'aveu qu'il nous fait. Mais comment *Cullen*, praticien très-répandu, exerçant dans une grande capitale, a-t-il pu manquer d'observations suffisantes pour fixer son opinion sur une maladie que les médecins rencontrent chaque jour dans des villes de moyen ordre?

Ce qui nous a le plus frappés dans le chapitre que *Méad* a consacré à cette vésanie, c'est une observation singulière, et propre à faire valoir l'opinion des médecins qui conseillent l'exercice.

Un homme, hypocondriaque très-prononcé, trouvant qu'on sonnait mal les cloches d'une église, s'impatiente contre les sonneurs, et se met en devoir de leur donner une leçon. Après s'être fortement exercé, il revient tout en sueur, et se met au lit. Cet exercice forcé détermina une sueur abondante et la guérison du malade.

Mais il était réservé aux médecins des siècles derniers, et surtout aux médecins de la France et de l'Angleterre, de faire de ces maladies l'objet d'une étude spéciale : animés par une noble émulation, ils ont présenté le résultat de leurs veilles, et ajouté aux connaissances acquises celles que l'expérience et la réflexion leur ont fournies : c'est alors que nous avons vu paraître ces nombreux traités sur les maladies nerveuses, que l'on peut

considérer comme autant d'ouvrages bien écrits, offrant tous quelques faits bien observés, quelques points de doctrine médicale éclaircis, et parfois des principes de thérapeutique conformes à l'observation, et appuyés sur les résultats nombreux d'une pratique judicieuse; toutefois malgré les travaux publiés en grand nombre sur ce genre d'affections, on peut avancer qu'il n'existe encore aucun traité où elles aient été offertes sous leur véritable jour. Tel est le vide que nous avons cherché à remplir.

L'étude que nous avons faite des méthodes proposées jusqu'ici pour le traitement de l'hypocondrie, nous a fourni deux observations importantes; d'une part, elle nous a prouvé que la plupart des principes qui doivent guider le praticien avaient été pressentis, indiqués ou même développés par nos devanciers, et surtout par les praticiens les plus renommés; de l'autre, elle nous a convaincus qu'aucun traité de médecine, aucun ouvrage spécial concernant les maladies nerveuses n'avait présenté l'ensemble ou la réunion désirable des bases principales sur lesquelles doit reposer la meilleure méthode curative.

Les uns ont senti de quel intérêt majeur était la connaissance des causes d'où provenait la maladie, dans le choix des moyens de curation; les autres, évitant l'écueil si général d'une médecine invariable et constamment uniforme, ont pris

en considération les circonstances les plus notables de ces névroses, telles que leurs causes, l'âge, le tempérament, les habitudes du malade, le degré ou l'ancienneté de l'affection, etc. Quelques médecins ont placé une confiance raisonnée dans les ressources de l'hygiène, qu'ils ont considérées comme moyens préservatifs et curatifs. Il a été accordé de plus à un très-petit nombre d'apprécier les avantages qu'on peut tirer pour la guérison de ces maladies d'une bonne direction donnée aux affections du cœur et aux facultés intellectuelles. Enfin, on pourrait également citer des hommes, supérieurs à la multitude, qui forts de l'expérience, ont échappé à l'exemple contagieux, et se sont distingués par une confiance limitée dans les médicamens dont ils secondaient l'action par les matériaux de l'hygiène, et par le traitement moral.

Mais, nous le répétons, tous ces préceptes étaient épars, souvent confondus avec des objets d'un mérite inférieur, ou même étouffés parmi les opinions les plus hasardées : la vérité et l'erreur marchaient sur la même ligne, ou étaient offertes avec une égale assurance. Dans un tel état de choses, la tâche était facile à tracer : il fallait 1°. mettre à profit les idées saines et les vues conformes à l'observation pour en faire les règles de notre conduite ; 2°. signaler toutes les hypothèses et les opinions fautives, afin de les éviter

avec le plus grand soin. C'est, animés de l'esprit de cette méthode, et dégagés de toute prévention, que nous avons établi le plan de thérapeutique qui nous semble le plus convenable et le plus propre à démontrer l'utilité de la médecine dans le traitement des affections hypocondriaques.

Nous divisons le traitement général de l'hypocondrie, 1°. en traitement de la maladie, 2°. en traitement des symptômes, 3°. en traitement des complications. Après avoir placé en tête du traitement de la maladie quelques principes généraux dont nous cherchons à démontrer la justesse, nous examinons les trois bases principales de la méthode curative, qui sont 1°. l'application du régime physique ou alimentaire, et des ressources de l'hygiène; 2°. la direction donnée aux facultés morales et intellectuelles; 3°. un choix convenable de médicamens : cette troisième série de moyens curatifs nous paraît tellement subordonnée aux deux premières, au moins dans beaucoup de circonstances, que nous l'avons considérée comme secondaire.

Dans la médecine des symptômes, nous suivons leur développement selon les différens systèmes ou organes auxquels ils appartiennent, suivant les fonctions ou propriétés vitales qui sont lésées; enfin, suivant que l'affection paraît exister dans les solides ou les liquides de notre organisation.

Nous exposons ensuite quelques considérations

relatives aux modifications que nécessitent dans le traitement de l'hypocondrie les complications qui s'y trouvent associées.

Enfin, nous terminons la partie thérapeutique par l'indication des mesures les plus capables de prévenir le retour de la maladie.

PREMIÈRE SECTION.

Principes généraux.

Rien ne constate mieux la nécessité de varier le traitement de l'hypocondrie que la multiplicité des causes souvent opposées, que les nombreuses variétés de cette affection, que le grand nombre d'individus de tous les tempéramens, de tous les pays, de toutes les classes de la société, qui en sont passibles. *Arétée*, *Forestus*, *Rivière*, *Boerrhaave*, *Réveillon*, etc., donnent le sage conseil de le différencier, et sont du petit nombre de ceux qui peuvent revendiquer cet avantage ; et quelle raison puissante pour modifier le traitement de cette névrose, que les succès avérés obtenus par les moyens les plus contraires. Sans doute ces guérisons n'auraient pu être produites dans des circonstances identiques par des moyens tout à fait différens : or puisque les circonstances de la maladie varient singulièrement, et sont souvent en opposition, la méthode curative ne doit-elle pas changer également. Ce que le raisonne-

ment semble démontrer, l'expérience le confirme : et c'est ainsi qu'on se rend raison de réussites amenées par des modes de curation opposés : on conçoit dès-lors pourquoi *Hoffmann* réussissait avec son élixir viscéral, et autres médicamens analogues, et même l'on n'est plus étonné si les délayans, préconisés exclusivement, ont donné des résultats avantageux.

La connaissance des causes de la maladie n'est pas seulement nécessaire pour assurer la solidité du jugement porté par le médecin sur la nature de l'affection, elle est également importante pour fixer le plan de la meilleure méthode curative : peu de circonstances sont en effet autant susceptibles de modifier le choix des moyens de curation. « Les causes, dit *Fernel*, sont si étroite-
» ment liées avec les maladies, qu'il est impossible
» que celles-ci disparaissent tant que celles-là
» subsistent ». « J'en appelle, dit *Tissot*, à tout
» homme sensé qui voudra bien réfléchir un mo-
» ment sur les différentes causes des maladies, sur
» l'opposition de ces causes, et sur l'absurdité de
» vouloir les combattre toutes avec le même re-
» mède. Quand on sera bien rempli de ce prin-
» cipe, on ne s'en laissera plus imposer par des
» tissus de sophisme destinés à prouver que tou-
» tes les maladies viennent d'une même cause, et
» que cette cause est de nature à céder au remède
» vanté ». (Tissot, *Avis au peuple.*)

C'est dans les affections qui présentent un grand nombre de variétés, que l'on doit surtout multiplier les méthodes curatives, afin de les accommoder à l'extrême diversité des causes et des symptômes ; mais c'est surtout dans le principe de ces maladies qu'on doit baser le traitement d'après la nature des causes, qu'on doit chercher à détruire celles-ci, ou au moins leurs effets : plus tard, lorsque la maladie est ancienne, on se dirige dans l'emploi des moyens curatifs, d'après l'inspection des symptômes, et les diverses circonstances où se trouve placé le malade.

Dans une hypocondrie récente produite par la suppression d'un flux hémorrhoïdal, on arrête le traitement d'après la connaissance de cette cause particulière ; mais si le mal avait fait depuis long-temps de grands progrès, si la faiblesse était très-prononcée, il faudrait d'abord restaurer le malade, relever les forces, enfin oublier la cause, sauf à s'efforcer plus tard de ramener l'hémorrhagie. Ce conseil très-sage nous a été donné par l'illustre *Arétee;* mais dans la plupart des cas il faut rechercher quelle en est l'origine.

Nous avons fait pressentir, en traitant du diagnostic, avec quel soin le médecin devait s'informer des sources de l'hypocondrie, et combien cette connaissance influait sur le choix des moyens curatifs, et en favorisait le succès ; nous allons indiquer maintenant quelques-unes des modifica-

tions apportées dans le choix de la méthode de traitement par la nature des causes.

Les affections hypocondriaques produites par des causes mentales réclament en général les moyens moraux, et une médecine expectante, ou une application très-mesurée des agens pharmaceutiques les plus doux ; si l'habitude des contentions d'esprit trop prolongées a donné naissance à cette névrose, on écarte cette cause en recommandant de fréquentes promenades, etc. Aux vésanies qui dérivent des peines de l'âme on oppose plus particulièrement les ressources morales, les consolations, l'empire de la diversion et l'usage des anti-spasmodiques ou des calmans. On combat le résultat des causes physiques, telles que la suppression d'une hémorrhagie, d'une affection cutanée, par des moyens plus actifs, par les médicamens dont l'expérience a démontré l'efficacité contre cette espèce particulière de vésanie. Lorsque la vie sédentaire a provoqué cette affection, on insiste sur la nécessité d'occupations variées, de courses journalières, ou plutôt, d'un voyage. Si la négligence d'une saignée habituelle, ou la suppression d'une hémorrhagie ont causé le désordre, on s'efforce de le détruire par la saignée ou par l'application des sangsues, etc. On varie encore le traitement suivant que la névrose dérive de l'onanisme, de la suppression d'une diarrhée habi-

tuelle, de l'abus des médicamens, des purgatifs, du mercure, etc., du déplacement d'une affection dartreuse, rhumatismale, goutteuse, etc. Si l'on peut soupçonner la présence d'une goutte vague sur les organes de l'abdomen, et déterminant l'hypocondrie, on doit encore agir différemment. En un mot, on modifie la méthode curative suivant la cause, on combine les différens moyens selon la multiplicité des causes, et leur part plus ou moins active sur le développement de la maladie et sur celui des accidens. Citons quelques faits pour exemples.

Une dame, livrée depuis long-temps à une vie très-sédentaire, éprouvait tous les accidens d'une hypocondrie avérée. Je lui prescrivis une infusion anti-spasmodique, une potion calmante, et un exercice régulier. Au bout de quinze jours la malade s'aperçut d'une amélioration sensible, et au bout de deux mois la santé était parfaite.

Une circonstance particulière peut donner lieu à cette névrose, et c'est ici quelquefois le cas d'appliquer l'adage, *contraria contrariis curantur*. Un homme très-riche, sujet à l'hypocondrie, vivait dans la continence la plus absolue. Son médecin lui conseille le mariage comme premier moyen de guérison, en lui recommandant de sacrifier à son goût et à ses affections particulières plutôt que de trop déférer aux convenances. Ce conseil fut mis à exécution, et, joint aux autres moyens

indiqués dans la consultation, réussit complètement.

A quoi bon donner des médicamens *hépatiques*, *anti-hypocondriaques*, etc., à celui dont une habitude vicieuse a causé la maladie? Tant qu'il n'aura pas renoncé à son funeste penchant, tous les efforts seront vains. Faites cesser l'onanisme par vos conseils; réparez-en les suites par une bonne nourriture, par quelques médicamens toniques, et vous aurez exercé la vraie médecine.

Rapportons ici un fait emprunté à *Hoffmann*, qui nous fournira quelques conséquences applicables à notre objet. Un homme, âgé de trente-six ans, éprouve une fièvre tierce, que l'on supprime bientôt par le quinquina. Au bout de quatorze jours, retour de la fièvre; nouvel emploi du médicament, et toujours retour de la fièvre, après l'usage du fébrifuge. A la cinquième fois, la fièvre ne revient pas; mais bientôt douleur à l'hypocondre droit, s'étendant dans l'hypocondre gauche; palpitations, gêne de la respiration, envies de vomir, surtout après un accès de colère, qui aggravait toujours son état : chaleurs fugaces, vertiges, pesanteur de tête, trouble de la vue, illusions d'optique, saignemens au nez très-modérés, douleur vive et sentiment de froid au dos et aux lombes, flatuosités, douleurs vagues dans les membres, salive visqueuse

et salée, urines sédimenteuses et limpides pendant le paroxysme.

Les toniques et l'exercice du cheval furent les principaux moyens qu'*Hoffmann* employa, et qui réussirent aussi promptement qu'heureusement.

Si une affection hypocondriaque, émanant de cette cause particulière, éludait tous les efforts d'une médecine rationnelle, pourrait-on l'attaquer par un procédé empyrique, en prescrivant au malade un bain froid aux heures et jours où le frisson avait autrefois coutume de se manifester, et en excitant ensuite la chaleur à l'aide des sudorifiques? Quelques tentatives analogues couronnées par le succès, sembleraient autoriser de nouveaux essais. On se rapprocherait en cela de la méthode employée par *Currie*, adoptée par plusieurs médecins anglais et italiens, et préconisée en dernier lieu par *Giannini*.

Une jeune femme perd un enfant, un fils unique qu'elle adorait, et devient hypocondriaque par suite de cet horrible chagrin; la santé dépérissait de jour en jour, et rien ne pouvait arrêter ce dépérissement. Dans la crainte d'en voir les progrès encore accélérés, le médecin ordinaire conseille au mari de faire lit à part. Un autre médecin plus heureux, et mieux inspiré, donne un avis tout opposé; la nature le seconde, et bientôt les annonces d'une grossesse comblent

de joie cette jeune dame, et contribuent à dissiper de jour en jour les accidens de la névrose.

Qui pourrait nier maintenant la nécessité de subordonner le choix des moyens curatifs à la connaissance préalable de la source du désordre? En effet, dans la médecine, comme dans toutes les autres sciences, n'est-il pas plus facile de remédier à un résultat quand sa cause nous est connue? D'ailleurs cette connaissance, quand elle ne pourrait être utile, serait encore exempte de tout inconvénient.

La température apporte de nombreuses modifications dans le choix des moyens curatifs applicables aux divers hypocondriaques. En effet, on sentira facilement que dans les régions septentrionales, telles que la Suède et la Russie, les médicamens toniques spiritueux seront plus admissibles que dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, et surtout l'Amérique. Dans ces contrées, où la diathèse inflammatoire ou même nerveuse sont prédominantes, et parfois simultanément, ces incitans pourraient produire des phlogoses locales, soit vers l'estomac et les intestins, soit vers d'autres organes. Dans le cas de semblable disposition, on les remplacera par les analeptiques, les farineux aromatisés, les anti-spasmodiques et les délayans.

Sous le ciel tempéré de la France et des pays dont la température s'en rapproche, la nature

des médicamens devra participer de la double indication qui résulte de l'influence opposée de ces diverses températures.

Il faut non-seulement tenir compte de la température générale d'un climat, mais encore de la nature particulière de l'air dans tel ou tel point de ce même pays, et de l'exposition des maisons où l'on habite. Je connais deux jeunes dames très-nerveuses, dont la santé est toujours souffrante dans le port de mer où elles demeurent, et qui se rétablissent constamment lorsqu'elles s'en éloignent. Une jolie parisienne ne s'est jamais bien portée dans la capitale, tandis que la ville de Rouen lui a toujours été salutaire. Combien de personnes perdent à la ville une partie de cette belle santé qu'elles retrouvent toujours aux champs, même indépendamment d'aucune cause morale, d'aucune prédilection marquée pour la campagne, ou d'aucune antipathie pour les cités. Les habitations au nord ne sont pas aussi funestes à ces malades qu'aux personnes dont les poumons sont très-susceptibles; mais les uns et les autres sont très-incommodés d'un séjour constant dans un local bas, humide et mal aéré.

Enfin les saisons ont une action analogue à la température habituelle des diverses contrées : ainsi l'hiver, en France, nous rapproche, pendant sa durée, de la constitution atmosphérique

des peuples du nord, surtout quand il est sec et très-rigoureux; tandis que les chaleurs de l'été assimilent plus ou moins notre organisation à celle propre aux habitans des pays chauds.

Outre ces considérations, qui sont déduites des objets qui nous environnent, il en est d'autres qui proviennent des circonstances relatives aux individus. Ainsi on doit presque toujours se régler, dans l'emploi des différens moyens curatifs, d'après le tempérament ou la constitution du malade, et surtout d'après l'état des forces vitales. S'il est d'une forte constitution et riche en vaisseaux sanguins, on pourra recourir à la saignée ou à l'application des sangsues au siége : ces évacuations seraient préjudiciables aux personnes débiles ou lymphatiques, dont elles augmenteraient la faiblesse et la sensibilité, compagnes inséparables et causes disposantes de ces névroses.

Mais quand un individu aurait offert autrefois les attributs du tempérament sanguin, ou aurait été sujet, dans un temps reculé, à des hémorrhagies habituelles, et lors même que leur suppression aurait entraîné l'hypocondrie, on s'abstiendra de la saignée si l'affaiblissement des puissances de la vie contre-indique l'emploi de ce moyen, que semblaient autoriser le tempérament, les habitudes antérieures du malade, et la cause même de la vésanie.

Une constitution délicate réclame l'emploi d'un bon régime, des alimens succulens, un choix raisonné de médicamens toniques, de stomachiques doux, un exercice modéré, et une grande attention à éviter toute espèce de fatigue. Au tempérament nerveux, sec, irritable, sont appropriés les adoucissans, les délayans, quelquefois les anti-spasmodiques et les opiacés à petite dose, une ou deux gouttes de *Rousseau* dans chaque tasse de boisson; les bains tièdes, rarement ceux de rivière, ou les immersions dans la mer.

A la prédominance du système bilieux on oppose les acidules, les délayans, les laxatifs, les fruits aigrelets, le raisin; l'usage d'un régime végétal, des chicoracés. Quelques bains tièdes ajoutent encore aux avantages du traitement précité.

Contre une constitution lymphatique, on dirige ordinairement les martiaux, les viandes rôties, le bon vin à forte dose et pur; les amers, le quinquina, la gentiane, l'élixir amer alkalisé, l'exercice, les frictions sèches, un air vif, une température sèche et une atmosphère salubre.

Ce qu'on nomme tempérament dans le langage familier, est souvent applicable à ces dispositions individuelles, qui sont en quelque sorte autant d'exceptions aux règles générales de l'organisme, et que les médecins connaissent sous

le nom d'*idiosyncrasie*. Nous ne considérerons celle-ci que dans ses rapports avec les effets des médicamens. L'expérience démontre journellement que certaines substances, dont l'effet est général, ne produisent pas le même résultat chez quelques individus, ou qu'il en détermine un différent ou même opposé : ainsi l'opium, qui calme presque toujours lorsqu'il est donné à propos, et surtout dans les apyrexies, n'apporte chez certains malades aucun amendement; bien plus, il existe un grand nombre de personnes que, même à faible dose, il excite d'une manière désagréable, ou irrite avec violence.

Un malade, qui a été dirigé successivement par M. *Larrey* et par nous, était soulagé dans une cardialgie par l'opium; mais cinq à six jours après, il se trouvait comme ivre, éprouvant des vomissemens et une diarrhée qui duraient près d'une semaine. Nous avons dès-lors renoncé pour toujours à lui prescrire ce médicament à l'intérieur, et l'avons remplacé avec quelque avantage par l'extrait de *Belladone* et de ciguë.

J'ai donné des conseils à plusieurs individus d'une même famille, et sur trois, j'ai acquis la certitude que des doses d'émétique assez fortes ne pouvaient provoquer le vomissement, lors même que l'indication de faire vomir semblait évidente.

On rencontre des personnes dont l'estomac

est, qu'on nous pardonne cette expression, *froid*, c'est-à-dire, peu irritable, et dont les intestins sont doués d'une vertu contraire, c'est-à-dire, très-susceptibles : il faut, lorsqu'on gouverne des malades ainsi disposés, faire un choix, une étude particulière des médicamens qui leur conviennent, et ne pas perdre de vue cette disposition qui leur est propre. Ceux-ci supportent en général l'émétique rapproché ou étendu plus facilement que les purgations ordinaires. Un médecin de notre connaissance ne peut porter sur ses yeux une très-petite portion de farine de graine de lin, sans y éprouver une cuisson violente, une inflammation vive; il en résulte aussi le boursoufflement des paupières. Ne négligeons donc pas d'apprécier dans la pratique médicale les observations des malades, pour peu qu'elles paraissent fondées; car il n'est point de précepte, même ceux de l'utilité la plus générale, qui ne puissent être contraires à certains individus, dans telle disposition ou à telle époque, et dont l'application ne soit parfois susceptible d'être ajournée, modifiée ou entièrement rejetée.

Il ne faut pas confondre avec l'idiosyncrasie, qui est un état permanent, certaines dispositions accidentelles des malades qui modifient singulièrement l'action des médicamens. On doit en outre s'assurer de leur état physique et moral, tenir compte des effets d'une heureuse disposi-

tion ou d'une situation contraire, d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Cette même attention n'est-elle pas encore plus nécessaire auprès des femmes, soit à la puberté, à l'époque des règles, ou vers l'âge critique? Nos dispositions organiques doivent également être prises en considération. Quand la force vitale est presque entièrement éteinte dans certaines apoplexies, que feraient trois ou quatre grains d'émétique? Il faut proportionner la force des moyens excitans ou irritans au degré d'atonie ou d'épuisement. Ce conseil est confirmé par la pratique chirurgicale. Lorsqu'une partie menace d'être frappée de mort on a recours aux topiques les plus actifs, et même à la cautérisation. De même, nous avons vu donner avec succès, dans une apoplexie dite *séreuse*, jusqu'à 50 g̃ d'émétique en un seul jour, et progressivement. Le malade, dont on avait d'abord désespéré, fut guéri, et je l'ai revu dix ans plus tard très-bien portant. Mais de plus, notre attention doit être spécialement captivée par la prédominance des divers symptômes, selon que le désordre principal occupe le ventre, la poitrine ou la tête; car si l'exaltation habituelle de la sensibilité des différens organes contenus dans ces cavités les expose aux lésions organiques, la prédominance du désordre moral, et surtout intellectuel, fait appréhender les aliénations, et principalement la manie et la mélancolie. Le

médecin doit donc diriger ses efforts vers le point qui paraît le plus menacé, etc.

Le traitement présente encore d'autres modifications qui sont relatives au sexe : ainsi nous avons conseillé à une dame hypocondriaque, d'ailleurs bien portante, d'allaiter son enfant, persuadés que cette occupation journalière, désirée par la malade, serait très-susceptible de faire diversion à ses idées méticuleuses, à ses craintes relatives à sa santé.

Quand un excès d'allaitement a donné lieu à cette névrose, il faut conseiller un sevrage progressif, parce que les changemens trop brusques dans les mouvemens habituels de l'économie sont toujours à craindre; mais au bout de sept à huit jours la mère doit avoir renoncé entièrement à nourrir son enfant, et l'on s'efforce de restaurer l'organisation par une nourriture succulente, le bon vin, et quelques médicamens toniques; plus tard, par l'usage du lait, et un séjour prolongé à la campagne. Le mariage a souvent contribué à la guérison des jeunes veuves, dont l'hypocondrie est produite plus encore par le chagrin que par la continence. (*Voyez* les observations d'*Hoffmann.*) Quand la suppression ou la cessation prématurée des lochies, d'un catarrhe vaginal, ont occasionné l'hypocondrie, on peut espérer de dissiper cette vésanie en rappelant l'écoulement supprimé, ou en y suppléant

par un large émonctoire établi de préférence à la cuisse. Dans ces cas divers, on joint à l'action des médicamens l'appui des ressources de l'hygiène, dont nous allons nous occuper.

DEUXIÈME SECTION.

Application des lois de l'hygiène au traitement de l'Hypocondrie.

Nous allons maintenant parcourir les bases du régime physique, c'est-à-dire, examiner les avantages qu'on peut espérer de l'application des matériaux hygiéniques au traitement de cette névrose.

On a remarqué qu'autant les pays chauds étaient favorables aux personnes dont la poitrine est délicate, autant les températures opposées agissaient favorablement sur les individus dont l'estomac est faible et languissant. Cette observation porterait à croire que le froid est plus favorable aux hypocondriaques que la chaleur. Si nous considérons isolément l'action du froid comparée à celle de la chaleur, nous penchons vers cette opinion; en effet, par un beau froid notre appétit est plus vif, l'estomac fait mieux ses fonctions, nos forces sont réellement plus développées. La chaleur produit d'autres effets : pendant sa durée nous jouissons d'un appétit moins prononcé, nos digestions sont moins actives, et nous n'éprouvons pas la même puis-

sance physique; mais l'influence de la température doit être examinée sous d'autres rapports. En hiver, du moins dans nos pays, les beaux jours sont rares en général; les hommes en proie aux affections nerveuses ne sortent pas fréquemment: ils préfèrent souvent rester auprès d'un bon feu plutôt que de s'exposer à une atmosphère rigoureuse. Si le froid est moins vif, ils craignent avec raison l'humidité, la pluie ou la neige, et devenant de plus en plus sédentaires, ils aggravent souvent, sans le savoir, leurs infirmités.

Au contraire, dans le printemps, l'été et l'automne des régions tempérées, tout engage à l'exercice ou aux voyages, la nature est vivante, l'activité est générale, et surtout aux champs, la beauté du ciel et de la campagne, le temps plus constamment sec; la longueur des jours, les promenades plus fréquentées, les routes plus sûres et plus belles; toutes ces circonstances, en un mot, éloignent l'isolement et l'oisiveté, empêchent les continuels retours sur soi-même, et présentent les plus puissans motifs de diversion.

Considérons en outre que pendant l'hiver les travaux des villes et même de la campagne sont presque interrompus ou bien moins suivis: beaucoup de bras languissent parmi les gens du peuple, sinon dans l'inaction, du moins dans une sphère d'activité très-circonscrite; beaucoup de personnes aisées participent aussi à cette lan-

gueur, et combattent l'impression du froid par des vêtemens multipliés, par des précautions minutieuses, et par des habitudes casanières, plutôt que par l'exercice et les déplacemens. D'après ces considérations, nous estimons que le climat, la température et la saison sont d'autant plus favorables aux hypocondriaques, que le froid et la chaleur sont plus modérés, que le temps est plus constamment sec, et par conséquent plus propre aux longues promenades : enfin, qu'on doit placer en première ligne, sous ce point de vue, les beaux pays de la France, comme Toulouse, Nice, Montpellier; ceux de l'Espagne, comme la riche et brillante Andalousie, la haute Catalogne, les rians parages de l'Italie, ceux de la Sicile, et les bords jadis fortunés de l'Ausonie. Aussi a-t-on remarqué que presque tous les Anglais en proie aux maladies nerveuses, en guérissaient lorsqu'ils abandonnaient le ciel nébuleux de leur pays pour voyager dans un climat mieux partagé.

Des réflexions sur la pluie, la neige, le vent, les orages, etc., seraient étrangères à notre objet; il nous suffira de prévenir les personnes nerveuses qu'il leur importe de se mettre le plus possible à l'abri de l'humidité et de toutes les variations trop brusques de la température, tandis qu'elles devront rechercher avec empressement un air pur et vivifiant; et c'est là un des

immenses avantages que nous offre le séjour de la campagne.

L'influence physique de l'air que l'on respire dans les champs est plus facile à concevoir qu'à expliquer : aussi ne nous arrêterons-nous pas à des discussions physiologiques ou chimiques pour en démontrer l'utilité, pour rechercher en quelle proportion s'y rencontrent l'oxygène et les autres corps constituans, quels principes délétères il peut recevoir, et jusqu'à quel point l'élaboration pulmonaire fait contracter au sang, sous l'influence d'un air pur, des propriétés favorables à l'exercice des fonctions de l'organisme. Nous observons en effet que nos diverses fonctions s'exécutent loin des villes avec plus de régularité, l'appétit est plus vif, les digestions s'opèrent plus promptement, et souvent la nutrition est plus abondante.

N'oublions pas toutefois que dans cette appréciation des avantages de la campagne, il faut tenir compte de l'impression mentale. Transporté sous un autre ciel, dans un climat nouveau pour lui, où tous ses rapports moraux et physiques sont changés, l'homme varie ses exercices, ses mouvemens ; il exerce tous ses sens, et cette habitude amène presque toujours un sommeil tranquille et réparateur.

L'aspect enchanteur de la campagne produit un enchaînement de sensations variées et agréa-

bles, qui ont le double avantage d'opérer une diversion utile, et d'affaiblir la susceptibilité. Des émotions douces, gaies, et propres à diminuer l'empire des passions haineuses, sont encore le résultat des sentimens qu'inspire le spectacle d'une nature riche et animée :

> Qui fait aimer les champs, fait aimer la vertu.
>
> DELILLE, *l'Homme des Champs, ch. I.*

Et quel homme, au sein des cités les plus florissantes, n'a pas tourné ses regards vers la campagne, asile du repos et du bonheur, et n'a pas dit, comme *Horace*,

> *O rus quandò te aspiciam !*

Le séjour de la campagne doit donc être considéré comme un des moyens les plus propres à seconder les effets d'une bonne méthode curative.

Mais outre une température convenable et un site agréable, il n'est point indifférent de quelle manière l'habitation des malades est exposée. Dans les pays où le froid prédomine, l'exposition au sud doit être préférée : on recherchera au contraire, dans les températures très-élevées, un séjour à l'est, à l'ouest, et même au nord ; mais on évitera avec soin les appartemens humides, ou qui par des crevasses donnent constamment accès à des courans d'air d'autant plus dangereux, que souvent ils ne sont pas même soupçonnés. Nous terminerons cet exposé, en signalant quelques

inconvéniens auxquels s'exposent trop souvent les hommes nerveux. Leur grande susceptibilité les rend très-sensibles aux extrêmes du froid et de la chaleur; pour s'y soustraire en hiver ils se tiennent presque toujours dans des appartemens trop échauffés, d'où ils sortent pour passer aussitôt dans un milieu très-froid. L'été, ils sont également incommodés par la chaleur contre laquelle ils cherchent à s'abriter par tous les moyens propres à les rafraîchir, et fréquemment ils aggravent ainsi les accidens qu'ils éprouvent. Ces malades éviteront donc un long séjour dans des chambres où la chaleur est portée à un trop haut degré, et spécialement tout passage subit d'une température plus élevée dans un air très-concentré.

Ils devront choisir en outre un air qui leur convienne, car celui-ci varie non-seulement dans la même exposition, mais encore dans le même pays, parfois dans la même ville; on sait que l'air de Saint-Germain-en-Laye diffère de celui de Montmorenci, qui est également différent de l'air de Passy, de Boulogne ou d'Auteuil, et quel contraste n'offre pas le faubourg Saint-Germain comparé à certains quartiers du faubourg Saint-Marceau. Il importe encore que les maisons soient situées au-dessus des caves, et qu'elles soient élevées au-dessus du sol, et non placées au-dessous, comme cela n'arrive que trop souvent.

Les vêtemens, considérés comme intermédiaires entre notre corps et l'atmosphère, sont loin d'être indifférens dans l'étude des causes de l'hypocondrie, et doivent également tenir place dans le traitement de cette affection. Ils diffèrent, d'après la nature de leurs tissus, leur volume, leur forme générale, l'influence de l'habitude, etc., et sont rangés dans la classe des moyens hygiéniques; cependant nous ne tracerons, à leur sujet, qu'un petit nombre de règles générales. Nos habillemens doivent être aisés, commodes, et surtout relatifs à la saison. En été, et dans les pays chauds, on porte des vêtemens plus légers, tandis qu'en hiver on préfère ceux qui sont peu conducteurs du calorique. Tous les hommes, en général, et à plus forte raison ceux qui sont nerveux ou très-accessibles aux variations de la température, agiraient prudemment en ayant recours, avant même les premiers froids, aux habillemens d'hiver, et s'ils ne les quittaient qu'à l'approche des grandes chaleurs.

Les tissus de flanelle méritent la préférence sous plusieurs rapports : ils conservent d'abord beaucoup mieux la chaleur intérieure, ils absorbent promptement la transpiration, dont le refroidissement est fort dangereux ; on doit en outre tenir compte de l'excitation qu'ils exercent sur tout le système cutané. Il serait donc très-convenable d'engager les personnes atteintes

d'hypocondrie à porter, et spécialement sur la peau, de la flanelle.

Il convient aussi qu'elles ne sortent point précipitamment l'hiver d'un appartement très-échauffé, ou d'une nombreuse réunion, sans ajouter quelque chose à leur vêtement, ou au moins en fermant bien exactement leurs habits, et en accélérant la marche, afin de n'être pas saisis par le froid. Loin de nous l'intention de leur recommander des précautions multipliées, frivoles ou minutieuses, ou de rendre ces individus douillets ou trop attentifs à ce qui concerne leur santé; tout en leur donnant ces avis salutaires, il faut les engager à ne rien outrer, et à ne pas porter les soins à cet égard jusqu'à l'excès.

On contribue encore au rétablissement de ces malades en excitant leur système cutané par l'habitude des frictions : on les divise en simples et en composées : les premières sont pratiquées avec une brosse de peau, un morceau de flanelle; les autres avec un tissu chargé de vapeurs aromatiques ou de substances médicamenteuses, comme la vapeur d'encens, de benjoin, de baies de genièvre, avec l'éther, l'alcool, les spiritueux, l'eau de mélisse, de Cologne, le laudanum, les alcools de quinquina, de gentiane, l'alkali volatil, les huiles aromatiques, etc. On peut placer après les frictions le massage ou la compression exercée

avec la main sur toute la surface du corps. Ces manœuvres excitantes agissent spécialement sur le système cutané ; mais toute l'économie participe au bien-être qui peut en résulter ; elles ont surtout l'avantage de rendre plus active la circulation capillaire des vaisseaux sanguins et lymphatiques, de répartir d'une manière plus uniforme le principe vital, d'augmenter l'action vers la périphérie, enfin de rendre la transpiration insensible plus abondante, et de fournir peut-être ainsi une sorte d'émonctoire.

Déjà l'exercice ou l'ensemble des mouvemens du corps que l'hygiène comprend sous le nom générique de *gesta*, a été apprécié par nous comme moyen de thérapeutique dans l'hystérie ; mais ce serait ne point sentir l'importance d'un pareil secours, que de ne pas y arrêter de nouveau toute notre attention.

L'exercice peut être étudié sous le double rapport de l'influence qu'il opère d'abord sur le physique et ensuite sur le moral. Suivons rapidement ses différens effets, que nous avons déjà fait pressentir en traitant des causes. L'exercice agit d'une manière favorable sur l'organisation, donne de la force aux agens locomoteurs, facilite le jeu de toutes nos fonctions, excite l'appétit, aide la digestion, la nutrition et le mouvement circulatoire ; son action sur le moral n'est pas moins salutaire ; il provoque l'activité des sens,

des facultés morales et des fonctions intellectuelles, et en leur offrant des sensations ou des rapports nouveaux, il détourne l'attention du malade de ses idées chagrines, de ses craintes continuelles, et le fait sortir du cercle de pensées relatives au dérangement de sa santé.

Le devoir du médecin ne se borne pas au simple conseil de l'exercice, il faut qu'il en indique le genre, qu'il expose la durée du temps que le malade doit y consacrer, les précautions convenables avant, pendant et après; qu'il lui prescrive la compagnie d'une ou deux personnes, ou même une société nombreuse et quelquefois bruyante. C'est au moyen de l'exercice, des voyages, et des réunions les plus agréables, que les prêtres de l'Égypte, s'entourant en outre d'une foule de prestiges, obtinrent dans le traitement de ces maladies les succès les plus brillans; et c'est en partie à l'influence du voyage, des promenades variées et des réunions nombreuses, que sont dus, dans quelques circonstances, les heureux résultats qu'on attribue trop exclusivement aux eaux minérales.

Mais l'exercice nécessaire à un malade n'est pas celui qui convient à un autre : aux personnes très-irritables il ne faut qu'un mouvement doux, modéré, progressif; aux constitutions molles et lymphatiques on doit, au contraire, conseiller un exercice rude, et porté même jusqu'à la fati-

gue; mais en outre il sera toujours proportionné aux forces de l'individu.

Les différens modes généraux d'exercice sont : 1°. la marche, 2°. l'équitation, 3°. l'action d'être porté, 4°. la navigation.

On doit distinguer en outre les voyages, les promenades, les occupations domestiques ou mécaniques, les soins du jardinage, et les jeux comme celui de la danse, de la course, de la paume, du billard, etc.

A certains malades les promenades en voiture ne réussiront pas, parce qu'ils en ont l'habitude; il faut faire de ces hommes casaniers des piétons, des fantassins, et vous les verrez bientôt s'applaudir d'avoir renoncé à leur indolence habituelle. Pour augmenter l'utilité de l'exercice, il faut, autant que possible, qu'il ait un but, un motif qui occupe l'esprit : par cette attention on ajoute beaucoup aux avantages de la promenade. On devra surtout insister sur tous les genres de mouvement, lorsque l'hypocondrie reconnaîtra pour cause le passage subit d'une vie très-active à l'inaction et aux délices d'un repos efféminé, comme on l'observe chez les négocians qui se retirent du commerce, et chez les militaires à la suite des campagnes.

L'exercice à pied ou la marche est à la portée du plus grand nombre, et convient à presque tous les hypocondriaques. Il sera d'autant plus

utile, que les malades se promèneront en bon air, dans la société de quelques amis, et dans un pays ou varié ou nouveau pour eux, afin d'occuper davantage leur esprit, et de le distraire agréablement.

Le moment de s'y livrer varie suivant la saison et les circonstances particulières où se trouve placé l'individu. Pris avant le repas, il excite l'appétit; pris quelque temps après, il facilite la digestion.

Mais quand le mauvais temps empêche de sortir, il faut alors recourir aux moyens supplémentaires, engager ces personnes à s'adonner à des jeux qui nécessitent du mouvement, tels que ceux du volant, de la balle, du billard, etc.

Souvent l'exercice au-dehors n'est même pas suffisant, il faut dans son intérieur une occupation active; c'est pour cette raison qu'on oblige parfois ces malades à frotter leurs appartemens, à puiser de l'eau, à tourner ou à scier du bois; enfin, sous le double rapport du déplacement et de la distraction, nous recommanderons les soins du jardinage.

La chasse est en quelque sorte un amusement dont on doit provoquer le désir chez les hypocondriaques en état d'en supporter les fatigues, qu'il est facile de rendre plus ou moins légères. Dans une infinité de cas, on peut attendre de très-grands avantages de l'emploi de ce moyen.

Un médecin du plus grand mérite fait succéder à une vie active des méditations soutenues; bientôt il devient sujet à une hypocondrie très-caractérisée : outre les symptômes les plus ordinaires de cette maladie qui existaient chez lui, tantôt il se croyait atteint d'une affection organique abdominale, tantôt d'un anévrisme du cœur, d'une phthisie laryngée, ou d'une dessiccation du poumon gauche; il lui semblait qu'il ne respirait que par le poumon droit. Au bout de trois ans de souffrances il veut essayer l'exercice de la chasse, qu'il aimait autrefois beaucoup : pendant les deux premières heures l'oppression augmente; au bout de la troisième et de la quatrième elle diminue. Depuis cette époque il a recouvré une bonne santé, qu'il doit à la continuation de cet exercice.

Cette passion peut d'ailleurs donner une autre direction aux idées. On sait combien elle exerce d'empire sur l'homme : *Venator teneræ conjugis immemor.* (HORACE.)

La pêche n'offre qu'en partie les résultats favorables que promet l'amusement de la chasse. Celle à la ligne tient le pêcheur dans une sorte d'inaction; la pêche au filet exige un mouvement continuel et une attention soutenue : sous ce double rapport elle mérite de beaucoup la préférence.

Ce n'est qu'aux hypocondres encore jeunes

que l'on peut offrir l'exercice de la danse; mais dans certaines circonstances on peut très-bien mettre à profit ce divertissement.

Parmi les exercices du corps, l'équitation est un des plus avantageux, par la surveillance active à laquelle il assujettit le cavalier, par le renouvellement continuel de l'air, par les secousses qu'il communique, et par l'empire de la distraction. On doit en proportionner l'allure à l'état particulier du malade; s'il est très-faible, l'on adoptera de préférence le pas, qui est le train le plus doux; mais en général le trot et le galop sont les deux allures les plus favorables.

Quand la sensibilité des personnes est fort exaltée, et surtout quand on les arrache à un long repos, à une vie trop sédentaire, on doit préférer des voitures très-douces dans le principe. On leur en conseille ensuite dont le mouvement est plus sensible, et on tâche de les habituer progressivement à des voitures très-rudes, ou à la marche. Celles qui sont bien suspendues ont l'inconvénient de ne pas exciter, réveiller les sujets nerveux qui restent en quelque sorte plongés dans leur indolence naturelle et dans leurs idées maladives.

Nous avons connu un hypocondriaque très-prononcé dont la situation était singulièrement améliorée chaque fois qu'il pouvait faire quelques longues courses dans les *carioles* des envi-

rons de Paris. Les voitures qui sont découvertes, comme les calèches, les cabriolets, ont, outre l'avantage du mouvement, celui d'offrir une source féconde en distractions : quand les malades eux-mêmes les dirigent, ils sont obligés à une application continuelle, qui les empêche de s'occuper de leur situation ; et quelque assujettissant que soit le soin de conduire une voiture dans l'intérieur ou dans le voisinage de la capitale, ce moyen est susceptible d'offrir à plusieurs de ces individus de très-grands avantages. Le médecin, familiarisé avec ce genre d'affections, saura distinguer ceux auxquels cette occupation devra être conseillée : on pressent qu'elle est indiquée aux personnes très-affectées de leur état, et chez qui le désordre est plus moral que physique.

Si nous faisons mention des promenades sur l'eau, c'est parce qu'elles sont ordinairement le prétexte d'une réunion agréable, et présentent une diversion utile ; mais le cabotage ou les petits voyages qui se font le long des côtes et de port à port, sont d'une efficacité encore plus incontestable. Quand les sujets nerveux en auront la force, ils devront ramer de temps en temps, ou tenir le gouvernail : *Quand nos mains sont industrieusement occupées, notre esprit suit leurs mouvemens, et ne peut errer sur des idées pénibles.*

Les voyages seront spécialement recommandés dans les cas où une affection morale très-violente aura déterminé l'hypocondrie (1). Ils seront surtout propices quand ils éloigneront le malade de l'objet de ses peines : de même les longues courses maritimes agissent plutôt comme moyen moral que comme agent physique; elles sont également une ressource contre les grands chagrins que le temps, l'exercice, les voyages, et les moyens de diversion parviennent presque toujours à affaiblir ou à dissiper.

La vie sédentaire et les professions qui la nécessitent donnent souvent naissance aux affections hypocondriaques parmi les hommes que des contentions d'esprit très-prolongées, ou même un simple travail de bureau obligent à un long repos, et parmi les artisans qu'une profession sédentaire retient dans une sorte d'inaction, et prive de locomotion. Ces malades, pour guérir de leur hypocondrie, devront faire tous leurs efforts afin de changer d'occupation habituelle.

---

(1) Il faut visiter de préférence les pays dont les sites sont très-variés, et qui, offrant beaucoup de mouvement, sont propres à agir sur les sens et sur l'esprit : la Suisse, l'Italie, la France. Paris mérite une mention particulière; c'est de toutes les capitales de l'Europe celle dont l'air est le plus salubre; aucune n'est aussi avancée sous le rapport de l'édilité, et ne présente autant de sujets de distraction, etc.

Les gens de cabinet, les hommes de lettres et les artistes sont dans ce cas plus à plaindre que les ouvriers : ceux-ci peuvent presque toujours quitter leur profession et en adopter une autre qui leur permette du mouvement, de l'exercice, ou de longues courses, puisque la plupart des métiers n'exigent ni de grands moyens naturels, ni une éducation soignée, ni des études préliminaires très-suivies. Les premiers sont attachés à leurs travaux d'une manière indissoluble; ils sont en outre très-souvent esclaves de leur art, qu'ils affectionnent avec enthousiasme, et parfois même avec une aveugle prédilection, tandis que les artisans changent facilement de métiers, ou ne les continuent que par une sorte d'habitude.

Au reste, quand ces personnes sont dans l'impossibilité de se prêter à ce changement désirable, elles doivent compenser l'influence fâcheuse de leurs professions par des promenades fréquentes. Nous avons connu plusieurs individus qui ont échappé à ces maladies, tant qu'ils ont contrebalancé les inconvéniens d'une application mentale trop prolongée par un exercice journalier et relatif à leur besoin. Mais en outre les hommes qui consacrent une grande partie de leur temps au travail du cabinet, ou à des méditations profondes, ne s'y livreront que long-temps après leurs repas, et se garderont surtout de ces posi-

tions, de ces attitudes vicieuses et fatigantes, où l'estomac et les organes pulmonaires sont très-gênés dans leurs fonctions.

Citons une observation qui démontre les avantages des matériaux de l'hygiène appliqués au traitement de cette maladie.

Un homme âgé de trente-neuf ans, d'un tempérament mélancolique, annonce dès sa jeunesse la constitution morale adaptée à cette disposition physique, et la sensibilité nerveuse la plus susceptible.

Habitué aux prévenances que procurent dans la société la considération publique et les avantages d'une brillante fortune, il était vivement affecté par la moindre contrariété, et en ressentait toujours une forte impression.

A trente-six ans, chagrins violens, trouble de toutes ses facultés morales, et bientôt première atteinte d'hypocondrie. *Phénomènes physiques:* Lenteur dans les digestions, tensions spasmodiques vers l'abdomen, flatuosités intestinales, perversion plutôt que perte de l'appétit, constipation habituelle, anxiétés précordiales, palpitations, chaleurs erratives, instabilité dans la progression. *Désordre non moins intense au moral.* Aversion pour la société, caractère de misanthropie, âpreté repoussante, terreurs paniques, crainte de l'avenir, soupçons non motivés et souvent ridicules, sensibilité exquise de l'organe

de l'ouïe; de là une source féconde d'impatiences et d'importunités.

De fréquens voyages, et le calme qui succéda aux orages qu'il avait essuyés, le ramenèrent insensiblement à son état de santé parfaite; mais bientôt les événemens politiques renouvellent ses affections morales ; toutefois une vie active et bruyante, au milieu des camps et des armées, prévient pour quelque temps le retour de son hypocondrie ; il partage les malheurs qu'éprouvent les habitans d'une ville assiégée, et tombe enfin au pouvoir de l'ennemi.

Après une longue et cruelle détention, il recouvre sa liberté ; mais en rentrant dans sa patrie, nouveaux désastres, revers de fortune, froissemens multipliés par les événemens de la révolution. Une fièvre ataxique fait craindre pour ses jours, et ne lui permet qu'après trois mois d'une convalescence pénible, de revenir dans ses foyers. Dès-lors, vie sédentaire, et par suite retour de sa première maladie : pendant quinze jours constipation opiniâtre, suivie d'une diarrhée qui détermina une grande faiblesse. De nouveaux phénomènes viennent aggraver son état : dégoût général, perversion de l'appétit, sensibilité exquise de l'ouïe portée jusqu'à la douleur par le moindre bruit, crampes nerveuses, lenteur marquée dans les battemens du pouls, trouble constant dans les fonctions de l'estomac,

pessimisme outré, recherche de la solitude, souvenir amer du passé, irascibilité extrême, emportemens journaliers contre ceux qu'il aima le plus tendrement; une épouse chérie, infatigable dans les soins qu'elle lui prodiguait pendant tous ses travers, était spécialement en butte aux accès de son âpre misanthropie; insomnies pénibles qui exaspéraient le caractère le plus inégal, ennui, morosité, impatiences minutieuses, bizarrerie insupportable.

La maladie, souvent méconnue et combattue par des moyens peu convenables, persistait avec beaucoup d'intensité, lorsqu'un médecin prescrivit au malade un bon régime, de légers narcotiques pour procurer du repos pendant la nuit, les toniques; et lui conseilla d'aller vivre à la campagne, et de se mettre en apprentissage chez un menuisier, auquel il paya une somme convenue. Bientôt il devint le compagnon le plus laborieux de l'atelier, et s'estimait le plus heureux des hommes, en voyant les progrès rapides de sa convalescence.

Le séjour de la campagne, un bon régime, l'exercice et le blanchîment des planches, ou le rabotage soutenu pendant un an, rendirent à ce malade l'intégrité de toutes ses fonctions, et amortirent les écarts de son caractère acariâtre et fâcheux.

Cette observation nous prouve d'une manière

évidente les avantages que les moyens d'hygiène nous fournissent, et indique en partie les modifications dont ils sont susceptibles.

Joignons à ces considérations de nouveaux préceptes, ou plutôt voyons, sous le rapport des *ingesta*, les lois de l'hygiène dans la curation de cette vésanie.

Le choix, la qualité et la quantité des alimens appellent l'attention du médecin. Il doit proscrire, du moins dans le plus grand nombre des cas, tous les mets irritans, comme les pâtisseries, les cervelas, les saucissons; les farineux, dont la digestion est difficile, tels que les haricots, les pommes de terre, les navets, les truffes; certains fruits, comme les marrons, etc. : les liqueurs alcooliques doivent être également interdites. Le café est un amer, un stimulant qui convient à beaucoup d'individus : souvent même son usage est indispensable, surtout aux estomacs affaiblis et paresseux qui en ont contracté dès long-temps l'habitude.

On emploie dans la préparation de nos alimens tant de moyens pour exciter notre appétit, que la plupart des personnes entraînées par l'exemple, l'habitude ou les instances auxquelles on résiste peu, prennent ordinairement plus de nourriture que leur besoin n'en réclame : il en résulte une surcharge habituelle de l'estomac, dont les fonctions sont ainsi plus ou moins trou-

blées ; il est pourtant bien important de ne jamais forcer son appétit, ou mieux de ne pas le satisfaire entièrement.

Le régime qui convient au plus grand nombre des hypocondriaques, se composera de bons potages légèrement aromatisés, de viandes douces, fraîches et rôties, mouton, bœuf, volailles, etc. Le poisson peut être permis, mais en petite quantité; frit ou grillé, la digestion en sera plus facile. On leur recommandera l'usage des légumes herbacés, tels que la chicorée, le cresson, les artichauts, les asperges, les haricots verts, l'oseille, les épinards, la laitue, etc.; les fruits bien mûrs, et surtout le raisin, les fruits rouges, comme les fraises avec un peu de sucre et du vin plutôt qu'avec de la crême, ne sauraient nuire. *Zacutus Lusitanus* préconise l'usage du chocolat dans cette affection, et ce conseil est rationnel. Les panades, les potages gras ou maigres, les œufs frais, enfin quelques côtelettes, formeront un déjeuner convenable. Les gelées animales et végétales sont encore une nourriture très-favorable; mais ces différens alimens, quoique tous de facile digestion, pris en trop grande quantité pourraient cependant être préjudiciables.

La boisson la plus salutaire est le bon vin rouge de Bourgogne ou de Bordeaux de deux ou trois ans, et d'une bonne récolte. Après la soupe et au

dessert on peut le boire pur et à dose modérée; ordinairement on y ajoutera de l'eau; mais les individus très-affaiblis pourront se dispenser de cette précaution : la bière et le cidre ne sauraient le remplacer, sinon dans quelques cas particuliers. Les malades éviteront l'excès et la multiplicité des vins; ils se trouveront bien, en général, de faire plusieurs repas, plutôt qu'un seul trop copieux, de vivre d'alimens simples, et de les varier le moins possible.

Le régime doit se concilier avec la nature des médicamens : si le malade a besoin d'être fortifié, on prescrit une nourriture tonique; s'il est, au contraire, d'une constitution robuste, habituellement resserré, on le met à l'usage d'un régime doux et végétal, etc. Toutefois il est un choix d'alimens non moins préférables, c'est celui d'une nourriture appétée par l'estomac du malade; celui-ci doit toujours consulter les dispositions particulières de cet organe. En effet, quand les alimens désirés sont facilement digérés, lorsque *cibi appetiti non nocent*, on se gardera de les interdire, à moins d'un motif puissant.

En général, il convient que ces malades recherchent les mets qui ont la réputation d'être sains et de facile digestion; qu'ils préfèrent, toute chose égale d'ailleurs, ceux qui flattent leur goût, et qu'ils examinent surtout comment leur

estomac s'en accommode : *Quid valeant humeri, quid ferre recusent.*

Les Anciens n'ont pas assez varié les méthodes curatives de l'hypocondrie ; de même ils ont conseillé trop généralement les mêmes nourritures. Celles qui ont été le plus recommandées sont les viandes légères, les poissons d'eau douce, les goujons, la volaille, les écrevisses, les crabes ; la laitue, la chicorée, la mauve, les épinards, l'endive, la bourrache, la buglose, les bettes, le miel, le petit-lait, le suc des fruits rouges.

Il faut en outre attendre, avant de se livrer aux travaux du cabinet, que la digestion soit assez avancée, pour ne recevoir aucun dérangement de cette application mentale.

Le grand point est de suivre un régime régulier, de ne pas s'en écarter, et de ne jamais surcharger son estomac, surtout quand cet organe est affaibli ou sujet à repousser, par le vomissement, les substances qu'on lui présente. L'utilité d'un bon régime est généralement reconnue; mais son importance pour les personnes atteintes d'hypocondrie ne saurait être trop proclamée. *Alex. de Tralles* prévient qu'il a plus guéri de ces malades par le régime que par les médicamens : *Quod plerosque potiùs victu quàm medicamentis sanaverim* (lib. I, cap. XVI).

S'il était besoin de nouveaux témoignages pour constater les avantages d'un bon régime, nous

rappellerions la longévité à laquelle sont parvenus la plupart des hommes dont la tempérance a été la règle constante; mais nous nous bornons à en rapporter deux exemples.

Cornaro voyant sa santé affaiblie à trente-trois ans, par tous les excès de la jeunesse, prit le parti de suivre un régime sévère, et de se livrer à un exercice modéré. Il mourut paisiblement à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Le cardinal *De Belloy,* qui a atteint le même âge, disait qu'il avait toujours traité son estomac comme sa bourse; qu'il en avait constamment usé, et jamais abusé.

Nos alimens, soumis au travail de l'assimilation, fournissent les sécrétions et les excrétions. Les premières sont destinées à servir à quelques nouvelles fonctions; les secondes, ne contenant plus rien d'utile à l'économie, doivent être rejetées au-dehors. Il faut donc s'attacher à favoriser l'issue de ces dernières, telles que les évacuations intestinales, la transpiration, les excrétions nasales, buccales, auriculaires, axillaires, etc., parce qu'un plus long séjour les rend souvent nuisibles; d'autres fois il faut les modérer.

Nous avons préconisé déjà les vêtemens de flanelle portés immédiatement sur la peau, et l'habitude des frictions; nous nous bornons à les recommander de nouveau, renvoyant, pour les développemens que pourraient nécessiter les éva-

cuations intestinales et sanguines, aux paragraphes où il sera traité des saignées et des purgatifs, etc.

Quelques individus sont sujets à des transpirations très-fortes, souvent désagréables, et même fétides, qui ont lieu par les aisselles, les mains, et plus fréquemment par les pieds : ce sont des émonctoires naturels, et qu'on ne pourrait supprimer sans s'exposer à des suites fâcheuses. Bien plus, dans quelques cas, en excitant ces voies de dépuration, on en retire des avantages réels quand leur suppression a contribué au développement de cette névrose; mais l'ordre rétabli dans d'autres sécrétions peut être également utile. Ainsi un mariage assorti terminera la névrose produite par la continence, indépendamment de toute influence morale. De même, en faisant cesser l'onanisme, on pourra affaiblir ou même dissiper cette affection nerveuse. Si celle-ci provient de la suppression d'une diarrhée habituelle, il faut, à l'aide des purgatifs, rappeler cette dernière, puis y opposer un traitement convenable; le plus souvent la diète et les mucilagineux, quelquefois aussi les exutoires.

Un hypocondriaque sujet à une transpiration abondante des pieds, a retiré un très-grand avantage de l'usage des chaussons de taffetas gommé portés pendant la nuit. Un autre individu sujet à des catarrhes du nez très-fréquens, en a été

délivré par l'habitude des chaussons de flanelle.

Telles sont les ressources principales que peut nous fournir une heureuse application de l'hygiène au traitement de cette vésanie. Les bornes que nous avons dû nous prescrire nous empêchent d'exposer plus en détail les nombreuses modifications dont chacun des matériaux hygiéniques est susceptible.

Mais le plus grand nombre des affections hypocondriaques réclame en outre une bonne direction imprimée à nos facultés mentales, et l'application raisonnée des substances médicamenteuses : c'est ce dernier objet dont nous allons nous occuper.

TROISIÈME SECTION.

Application des Médicamens au traitement de l'Hypocondrie.

Avant de considérer en particulier l'action des principaux médicamens que la nature a mis à notre disposition, nous ferons observer qu'il est quelques principes généraux qui doivent présider à leur administration. Ainsi, loin d'en abuser ou de les multiplier à l'infini, le médecin prudent en restreindra l'usage à une application raisonnée, et ne les associera qu'autant que leur union ne pourra être nuisible ou détruire leur propre action.

Comme il est presque toujours possible de

remonter à la source de la maladie, il subordonnera l'emploi des médicamens à cette connaissance préalable : ainsi ils devront être variés suivant la nature même de la cause, suivant la sensibilité individuelle, et suivant les degrés de la maladie ou la prédominance des symptômes. Il faut en outre, dans le plus grand nombre des cas, pour assurer la réussite de l'entreprise, seconder l'action des agens pharmaceutiques ou des opérations de l'art par un bon régime physique et par une sage direction imprimée à nos facultés mentales. Le médecin ne leur accordera donc qu'une confiance limitée, et quand d'autres circonstances auront coopéré à la guérison, il reconnaîtra quelle part chaque moyen peut revendiquer.

Enfin, dans le cas de non succès, on essaiera une méthode curative différente, et on s'efforcera de bien apprécier le résultat des moyens mis en usage, afin d'être conduit au choix du mode de curation le plus convenable. Mais l'application des agens pharmaceutiques doit avoir des bornes dans ces maladies, surtout lorsqu'elles résistent presque indistinctement à l'action de tous les médicamens. C'est faute d'avoir reconnu ces limites, que des médecins ont quelquefois prodigué les remèdes sans mesure et sans raison, et ont excité, contre l'art en général, des reproches qui auraient toujours dû être personnels.

Sans doute la médecine a été long-temps en butte aux sarcasmes et aux plaisanteries des philosophes; mais leurs traits, il faut en convenir, n'ont fait aucune blessure profonde à la science, parce que leur satire, quoique piquante, n'était souvent ni juste, ni fondée, ou parce que leur critique portait avec raison sur les individus plutôt que sur l'art lui-même. Si jamais la médecine n'a été aussi fortement attaquée que dans le dix-septième siècle, jamais son triomphe n'a été plus complet ni plus éclatant qu'à la fin du dix-huitième. C'est à cette époque qu'il faut rapporter les progrès les plus réels de la science médicale, progrès qu'on doit en partie à l'adoption de la méthode analytique dans l'étude de cette belle science. Les médecins ne craindront plus le reproche que fit *Voltaire* à un de leurs devanciers, *de mettre dans un corps qu'il ne connaissait pas des médicamens qu'il connaissait encore moins.* L'anatomie, la physiologie, et la matière médicale reposent maintenant sur des bases solides, et sont cultivées avec un zèle et un succès qui mettent les médecins à l'abri d'une pareille imputation.

Mais que pourront les médicamens contre une affection qui a eu pour principe la vie sédentaire, et dont la cause est toujours la même; qui ne sent que tous les agens pharmaceutiques, que toutes les recettes empiriques échoueront

contre un pareil mal, et que la prudence, dans ce cas, porte conseil au malade de changer son genre de vie, ou au moins de remplacer l'exercice qui lui serait nécessaire, comme les voyages, le séjour au milieu des champs, par tous les moyens propres à y suppléer, et que nous avons déjà exposés.

Lorsque nous publiâmes, il y a quinze ans, notre dissertation sur l'hypocondrie, nous avions observé cette névrose sur un assez grand nombre d'individus ; les uns avaient langui pendant long-temps victimes des purgatifs et des délayans; les autres avaient dû un heureux rétablissement à une vie active, secondée par quelques médicamens toniques; cette circonstance ou ce résultat de l'observation et de nos premières expériences nous avait prévenus peut-être un peu trop généralement en faveur des toniques, et contre les autres moyens dont nous avions jusqu'alors souvent remarqué les abus les plus monstrueux. Éclairés maintenant par une pratique plus étendue, par des résultats plus multipliés, nous avons acquis la conviction qu'il convient de varier les médicamens ainsi que les matériaux de l'hygiène et les ressources morales, suivant une foule de circonstances. Toutefois nous sommes également convaincus que s'il est une classe de remèdes plus généralement indiqués, et par les causes les plus constantes de cette névrose, et par

les résultats même de la maladie, qui ajoute presque toujours à l'action débilitante de ces causes, ce sont les toniques : *Huic morbo sanando prosunt quæ corpus roborant, etc.* (SAUVAGES.)

En effet, si l'on observe que les causes les plus actives et les plus fréquentes de l'hypocondrie agissent en diminuant les forces vitales, on sentira les raisons qui rendent l'usage des fortifians si général, mais non exclusif, dans le traitement de cette affection. Ne sait-on pas que la vie sédentaire, les affections morales, et les travaux trop assidus du cabinet sont les causes les plus puissantes de ces vésanies, et qu'elles entraînent toujours une débilité plus ou moins grande; dès-lors n'est-il pas convenable de détruire leur mauvais effets en relevant l'énergie vitale. De plus, l'exaltation de la sensibilité organique étant presque toujours en rapport avec la débilité, n'indique-t-elle pas également l'emploi des fortifians; mais quand la sensibilité animale est trop vivement excitée, quand il existe des signes d'irritation, comme nous l'exposerons plus loin, il faut recourir à une méthode différente, opposer les adoucissans à une excitation trop vive. Ces principes ont pu être pressentis d'après les observations que nous avons rapportées précédemment, puisque certains malades se sont bien trouvés de l'emploi des toniques, et n'ont retiré aucun avantage des délayans; tandis que ceux-ci ont

été aussi utiles à d'autres individus que les excitans leur avaient été contraires.

Nous ferons en outre remarquer qu'on peut, sans crainte, essayer ce genre de médicamens qui n'offrent pas, lorsqu'ils sont administrés à contre-sens, les inconvéniens majeurs qui résultent quelquefois de l'emploi inconsidéré de l'émétique, de la saignée, etc.; mais ces tentatives doivent être faites avec prudence, et on y renoncera aussitôt que la contre-indication sera bien démontrée. On doit choisir parmi ces médicamens ceux qui exercent une action excitante prompte et durable, de préférence aux moyens analogues qui provoquent une excitation vive et instantanée : ainsi l'on préférera les amers, comme le chocolat, le cachou, les extraits de rhubarbe, de genièvre, de quinquina aux boissons alcooliques et aux teintures amères. Un vin vieux de Bourgogne ou de Bordeaux, dans lequel on fait macérer soit de l'absinthe et des écorces d'orange, soit du quinquina, offrira un tonique convenable; les sirops amers, anti-scorbutique, de quinquina, d'écorce d'orange, pourront être éminemment utiles : ce sont des toniques doux qui fortifient sans exciter d'irritation. Dans bien des occasions les eaux ferrugineuses et acidules gazeuses, dont nous parlerons plus loin, pourront également être employées avec avantage.

Les toniques spiritueux, les différens élixirs,

comme l'élixir de Garus, les teintures de quinquina, d'absinthe, le vin anti-scorbutique, les différentes liqueurs alcooliques, comme l'eau-de-vie, le kirchenwasser, le rhum, le curaçao de Hollande, ne seront pris qu'à petite dose, et sont recommandés principalement aux individus lymphatiques et affaiblis, mais non irrités. Les vins de Madère, de Malaga, de Lunel, et du midi de la France, sont encore de bons toniques lorsqu'on en use avec modération.

La rhubarbe mérite une place particulière parmi les nombreux excitans de l'estomac, parce qu'elle joint à sa vertu stimulante une propriété légèrement purgative ; mais pour obtenir ce double effet, il est quelquefois nécessaire de porter cette substance à une dose un peu forte. Le mode de préparation que nous avons employé avec le plus de bénéfice, c'est une simple infusion à froid dont on fait usage aux repas, en y ajoutant un filet de vin. Quand les malades préfèrent les médicamens sous forme de bols, on prescrit les extraits ou poudres d'aunée, de chicorée, de rhubarbe, de quinquina, de genièvre, de cannelle ; on y joint les martiaux. Ces dernières préparations seraient surtout appropriées aux femmes dont l'hypocondrie reconnaîtrait pour cause la suppression des règles entretenue par un état de faiblesse habituelle. Les toniques seront propres à détruire les mauvais effets de l'onanisme, et

favoriseront puissamment la guérison du malade, si d'ailleurs il devient docile à la voix de la raison.

Enfin, quand ils paraissent produire ou augmenter la constipation, on remédie à cet inconvénient par des lavemens simples ou rendus purgatifs.

On associe souvent à ces médicamens les antispasmodiques, et même les narcotiques; c'est ainsi que nous avons retiré de bons effets du laudanum uni à l'extrait de genièvre. La thériaque remplit le même but, et doit en général être préférée au diascordium, qui est plus astringent. Les potions avec l'opium gommeux, et les eaux de fleurs d'oranger, de menthe, de mélisse, etc., ont également l'avantage de diminuer les douleurs qu'éprouvent quelques malades vers l'estomac, et de donner une certaine énergie à cet organe. D'autres fois on ordonne les toniques le matin, afin que le malade soit en état de faire un peu d'exercice, et de remplir ses autres fonctions, et on réserve les calmans pour le soir, parce que la nuit, où on a besoin de sommeil, on fait peu d'usage de ses forces.

Toutefois il ne suffit pas qu'un malade soit faible pour croire à l'indication de ces moyens; il peut exister un état de sensibilité exaltée ou de diathèse inflammatoire chronique et masquée qui les repousse. Les fortifians ne fortifient pas

toujours donnés ainsi *à priori;* ils peuvent même déterminer une phlogose locale plus ou moins grave. Lors donc qu'il existera de la douleur vers l'épigastre, l'abdomen ou la poitrine, de la soif, de la chaleur, et un mouvement fébrile qui quelquefois est obscur et non continu, on les ajournera jusqu'à la disparition de ces symptômes, auxquels on oppose les délayans et les adoucissans à l'intérieur et à l'extérieur. Quand l'estomac repousse les toniques, et surtout le quinquina, quand celui-ci excite le vomissement ou la diarrhée, de même quand il aggrave les accidens, il faut y renoncer, et n'y revenir, si l'indication se représente, qu'avec beaucoup de prudence. Les toniques excitent particulièrement la contraction insensible; ils sont surtout favorables dans les névroses atoniques, qui paraissent dépendre d'une susceptibilité et d'une mobilité excessives sans phlegmasie locale et sans lésion de texture.

Non-seulement on conseille les somnifères ou narcotiques unis aux médicamens toniques, mais souvent encore on les administre isolément.

Prévenons à ce sujet qu'il existe, parmi les gens du monde, une si forte prévention contre l'opium, qu'elle a parfois détruit le bon effet qu'on pouvait attendre de cette substance; aussi le médecin qui le prescrit doit-il fréquemment, afin d'en assurer le succès, cacher à son malade

qu'il se propose d'en faire usage. Toutefois l'opium partage le sort du plus grand nombre des médicamens héroïques, et n'est dangereux qu'entre les mains du charlatan, ou lorsqu'il est employé inconsidérément.

Son application opportune n'est pas bornée, comme on le croit vulgairement, à faire dormir ou à pallier les symptômes sans pouvoir amener de guérison radicale, c'est, au contraire, un moyen efficace et salutaire. S'il est, dans des cas désespérés, la dernière ressource, *anchora sacra,* du médecin et du malade, souvent aussi, non-seulement il calme la souffrance et procure un sommeil consolateur, mais de plus il constitue le remède de la maladie, ou dissipe complètement des accidens qui auraient peut-être tari les sources de la vie.

Je ne m'arrêterai point à désigner les différentes préparations d'opium : je me borne à indiquer, comme une des plus convenables, la dissolution d'un grain de son extrait gommeux sur une once de sirop de sucre, qu'on fait prendre dans une infusion de fleurs de tilleul, dans une eau émulsionnée, ou dans une potion tonique, suivant les circonstances.

On a reproché aux narcotiques un inconvénient réel, qu'on a cependant exagéré, c'est la constipation; mais il est facile d'y remédier par un régime doux, relâchant, ou par quelques

lavemens mucilagineux, ou même laxatifs. *Sed lene clysma facilè emendavit hoc vitium, si somniferorum medicamentorum usum sequatur.* (VAN-SWIÉTEN, *de Melancholiâ.*)

On ne doit, en général, user de ces médicamens qu'après avoir dissipé les circonstances qui pourraient contremander leur usage, soit un embarras des premières voies ou une surabondance sanguine, soit une phlogose latente ou une irritation locale masquée, soit enfin un mouvement fébrile obscur. Dans les cas d'épuisement ou d'une débilité excessive, on les unit aux toniques.

L'opium occupe le premier rang parmi les médicamens narcotiques : ses succédanés lui sont si inférieurs, surtout dans leur application au traitement de l'hypocondrie, que, lorsqu'il ne réussit pas, nous croyons préférable de recourir aux anti-spasmodiques.

Parmi les substances auxquelles on ne peut refuser une vertu anti-spasmodique ou calmante sans être narcotique, nous placerons en première ligne le musc, le camphre, l'éther, la liqueur d'*Hoffmann*, la poudre tempérante de *Stahl*, celle de *Carignan*, l'extrait de valériane, les oxides de zinc, de bismuth, etc. On ne peut disconvenir que plusieurs guérisons n'aient été obtenues sous l'influence de ces médicamens, et qu'un grand nombre de malades n'en ait retiré un bénéfice sensible.

Le safran est encore un anti-spasmodique puissant; il paraît en outre doué d'une action spéciale sur l'utérus, ce qui le fait recommander particulièrement dans les cas d'aménorrhée ou de névroses par suppression des règles et atonie du système utérin.

Les absorbans sont au nombre des substances assez généralement employées : la magnésie, la poudre d'yeux d'écrevisses, celle de cloportes, d'éponges calcinées, d'ivoire, passent pour les plus efficaces; on les unit parfois, et avec succès, aux toniques, comme la poudre de rhubarbe, de quinquina, le cachou, le safran de mars, etc.; ils absorbent les mucosités gastriques, et provoquent les évacuations intestinales. Associés aux amers, ils sont propres à relever l'action des organes digestifs, et jouissent en outre de leur propriété absorbante.

Zacutus Lusitanus rapporte avoir guéri plusieurs fois cette maladie (*morbum herculeum*) par l'usage de l'ivoire en tablettes avec du sucre, ou tout simplement à la dose de ℊ vj dans une infusion de mélisse, prise le matin à jeun. Il mentionne avec les mêmes éloges ou la même exagération, la pierre de Belzaar : *pro morbo hypocondriaco lapis Belzaar utilissimus*, et nous transmet une observation où son usage a été suivi de succès. (*Prax. med.*, lib. II, obs. X.)

Les sucs d'herbes de chicorée, bourrache,

cerfeuil, pissenlit et laitue, sont très-indiqués dans un grand nombre d'hypocondries. Si la constitution du malade est molle et lymphatique, on y ajoute les sucs de cresson, de fumeterre ; quelquefois les feuilles de cochléaria et de raifort ; on rend ces sucs laxatifs en y ajoutant 8 ou 10 ℊ de terre foliée de tartre (acétite de potasse), ou 3 à 4 ʒ de crême de tartre (tartrite acidule de potasse); le plus souvent alors on les prescrit étendus dans ℔ j de petit-lait ou de bouillon aux herbes. On les recommandera surtout dans ces névroses compliquées ou associées avec une affection dartreuse.

Ne voyant dans toutes les maladies nerveuses qu'une même cause, le raccornissement des nerfs, le médecin *Pomme* conseillait toujours les délayans à l'intérieur, l'eau de veau, de laitue ou de poulet, et les bains tièdes à l'extérieur (1); mais combien de fois n'a-t-il pas attribué aux seuls délayans l'honneur d'une guérison due à

(1) On a inséré dans le Journal de Médecine de 1809, la lettre d'un curé qui déclare qu'il *commence* à éprouver les bons effets de ce traitement, et que le raccornissement de ses nerfs *commence* à se dissiper après plus de *onze cent soixante bains* de cinq heures au moins. Nous avons d'abord cru que c'était une mystification ou une critique de ce fameux système; mais notre erreur était complète, puisque nous avons appris que l'auteur de l'insertion était le docteur *Pomme* lui-même.

l'exercice, à l'empire de la distraction, à un régime plus convenable, ou à d'autres circonstances dont ce médecin ne tenait presque aucun compte. Nous avons sous les yeux l'observation d'une dame tourmentée depuis plusieurs années par une hypocondrie éminemment nerveuse. Sa confiance dans son médecin fut d'abord sans bornes; il lui donnait des apéritifs, des diurétiques, des hydragogues, des fondans, des narcotiques, et lui permettait le régime le plus irrégulier; mais bientôt un autre docteur est appelé : celui-ci rassure la malade, très-inquiète sur son état, lui prescrit l'eau de veau, le petit-lait, des bains tièdes, et un régime humectant; il défend les liqueurs spiritueuses, et conseille en même temps la gaîté, la dissipation, la récréation de l'esprit, un exercice modéré à pied, à cheval, ou en voiture; le renouvellement de l'air, une vie plus occupée; la malade fut bientôt guérie. A coup sûr, les délayans n'ont pas agi dans ce cas exclusivement. Nous sommes loin cependant de leur refuser tout effet salutaire; ils ont souvent l'avantage de reposer les organes fatigués par des remèdes trop actifs, et surtout par les élixirs dont la base est presque toujours l'alcool, ou par un régime non approprié.

Les délayans conviennent en outre dans beaucoup de cas d'éréthisme; quand il y a soif habituelle, chaleur à la peau, maigreur générale,

avec aridité, et chez quelques individus dartreux. Il faut encore y avoir recours lorsque l'hypocondrie reconnaît pour cause l'abus des spiritueux, des excitans, des toniques, des médicamens irritans, tels que le sublimé, l'émétique, les purgatifs, l'exposition trop répétée à la chaleur atmosphérique, une surabondance de sang, les excès de tous les genres, qui produisent une irritation spéciale, désignée sous la dénomination vulgaire d'*échauffement*. Ils ne conviennent pas aux malades dont la fibre est molle et lâche, qui se trouveront mieux des boissons froides, légèrement amères ou toniques, ni à ceux en général qui sont affaiblis, ou doués de beaucoup d'embonpoint.

Mais on se trouvera toujours bien de faire succéder à leur emploi un léger tonique, comme la rhubarbe, l'eau ferrée, celle de Vichi, de Seltz, l'usage du bon vin, la thériaque, les moyens moraux et les ressources de l'hygiène. Ces considérations relatives aux boissons délayantes sont également applicables à l'usage des bains tièdes, sur lesquels nous reviendrons.

Lorsque la méthode humectante échoue, on doit changer le traitement et adopter les moyens qui semblent plus indiqués par la cause, et appropriés à l'état du malade.

Quand un médicament ou un agent quelconque produit un effet contraire au but qu'on se

propose, cette expérience ne doit pas être perdue, et en suivant une route tout opposée, on parvient fréquemment à être utile. L'usage des délayans est encore nécessaire momentanément, lorsqu'on veut prescrire à ses malades un vomitif ou un purgatif.

L'émétique convient rarement dans cette maladie, considérée dans son état de simplicité; cependant lorsqu'elle est récente, et que l'estomac est plutôt paresseux et surchargé de mucosités, que véritablement affaibli, ou très-irritable, son usage est parfois avantageux : néanmoins nous préférons donner, dans ces cas, une infusion d'ipécacuanha de ʒ ß à ʒ j et ij. Mais si l'hypocondrie est invétérée, si le malade est sujet à une cardialgie habituelle, à des aigreurs, des nausées, des envies de vomir, et même à des vomissemens muqueux ou alimentaires, et surtout à l'hématémèse; s'il éprouve de la fièvre ou de la soif, si la figure est altérée, et si l'on appréhende la complication d'une phlogose gastrique ou un vice organique, on s'abstiendra du vomitif qui aggraverait la maladie, et pourrait convertir un simple état nerveux de l'estomac en une affection beaucoup plus grave. Les symptômes propres à l'embarras gastrique, joints aux phénomènes caractéristiques de cette vésanie simple, ou exempte d'une complication très-fâcheuse, pourront encore

motiver l'emploi de ce remède. Mais combien doit-on redouter les méprises? Souvent l'embarras gastrique, surtout chez l'homme adulte et chez les hypocondriaques, masque le premier degré d'une phlegmasie aiguë de l'abdomen, ou cette phlogose devenue chronique; il faut alors y renoncer, et conjurer le danger le plus pressant. L'administration du tartre stibié ou de l'ipécacuanha, demande toujours une très-grande attention; on doit également surveiller leurs effets consécutifs, car quelquefois il reste après leur usage une sensibilité très-vive à l'estomac, qui pourrait avoir les suites les plus funestes, si on ne parvenait à les prévenir. On oppose à cet accident, qui est presque toujours le résultat de l'emploi inconsidéré des vomitifs, le traitement proposé contre le vomissement nerveux.

En général, ces médicamens réussissent mieux dans l'enfance et la jeunesse, et peut-être même dans la vieillesse que dans l'âge adulte, époque de la plus grande fréquence des altérations profondes qui attaquent si souvent le tissu des différens organes de la digestion. Si l'on réfléchit que l'hypocondrie, avec prédominance des symptômes locaux de l'abdomen est souvent une disposition occulte aux phlegmasies latentes, chroniques ou aiguës, et aux lésions organiques de ces viscères, on ne les prescrira, et surtout aux adultes, qu'après s'être bien assuré qu'il n'existe

aucune circonstance propre à contre-indiquer leur emploi.

Passons maintenant à un examen rapide des purgatifs ou des médicamens qui agissent spécialement sur le tube intestinal.

Nil magis nocet quàm repetita evacuantia. (SAUVAGES.) D'accord avec ce nosographe, nous pensons qu'on a singulièrement abusé de ces médicamens par suite de la prédominance du système humoral. Cette habitude effrénée des purgations fut encore inspirée par la médecine du symptôme; ces malades étaient constipés : donc il fallait les évacuer. La constipation reparaissait bientôt; on revenait à des purgations plus fortes, à de nouvelles irritations, qui amenaient de nouveaux désordres; mais on se croyait dans la bonne route, on était persuadé qu'on suivrait les indications véritables, et l'on s'opiniâtrait dans l'erreur, parce que les opinions systématiques, comme les coutumes invétérées, résistent aux leçons de l'expérience.

Nous avons signalé les nombreux inconvéniens qui sont le résultat de leur trop long usage, de leur emploi inconsidéré, ou de doses excessives. Tantôt c'est l'augmentation des symptômes nerveux, et la debilité progressive du malade, tantôt ce sont des diarrhées colliquatives, et souvent même des phlegmasies chroniques ou des lésions organiques; toutefois les purgatifs sont

susceptibles d'avantages très-réels; mais leur application doit être réfléchie et bien motivée. On sait qu'ils sont propres à rappeler un flux hémorrhoïdal supprimé, quand surtout on les choisit parmi les aloétiques.

L'observation 48e d'*Hoffmann* nous offre une hypocondrie produite par la suppression d'un flux hémorrhoïdal, et guérie par l'usage des pilules aloétiques, qui ramenèrent cet écoulement.

C'était sur ces médicamens qu'était basée en partie la pratique de *Stahl* et de ses disciples, qui, bien que trop générale, peut revendiquer néanmoins de nombreux succès, parce qu'ils agissaient en déplaçant l'irritation.

Les purgatifs constitueront le meilleur remède contre une hypocondrie déterminée par la suppression trop subite d'un flux intestinal. Quand cette évacuation aura été rétablie, on tâchera, plus ou moins long-temps après, de la faire cesser par un traitement méthodique. Si après avoir diminué progressivement, et enfin arrêté le dévoiement, on voyait la santé du malade s'altérer de nouveau, on opterait alors entre cet émonctoire naturel ou un artificiel.

Ces remèdes feront encore partie du traitement, et seront indiqués dans le cas où l'affection nerveuse sera le résultat d'une dartre répercutée; on y joindra les médicamens nommés *dépuratifs*, tels que les apozèmes, les tisanes lé-

gèrement amères, les eaux sulfureuses, le soufre sublimé sous la forme de bols ou de pastilles, les bains simples ou sulfureux, les vésicatoires, et un régime approprié; de même, pour diminuer les accidens d'une affection sporique traitée inconsidérément, on associerait ces médicamens aux bains sulfureux, aux vapeurs de même nature, à une boisson adoucissante et aux frictions usitées.

Toutefois l'on peut avancer comme thèse générale, que les purgatifs conviennent plus rarement dans l'hypocondrie que dans la manie et même la mélancolie; sans doute parce que la sensibilité intestinale est exaltée chez les hypocondriaques, et que ces substances, en l'exaspérant, aggravent encore leur état. On s'en abstiendra lorsqu'il y aura soif, fréquence du pouls, ou des symptômes d'irritation locale, ou au moins on ne les donnera qu'à faible dose, afin de les essayer. On diminue encore leurs inconvéniens en les étendant dans un véhicule un peu considérable. On doit choisir alors les purgatifs les plus doux: la manne, la casse, les tamarins, le séné, l'eau de *Sedlitz*, la rhubarbe. Quand on les donne sous forme de médecine, on y ajoute par potion purgative une once d'eau de menthe simple ou d'eau de fleurs d'orange, qui empêche qu'elle ne soit rejetée, sans nuire à son action purgative. Les sels seuls seraient un peu irritans. Le jalap a l'avantage de ne faire éprouver aucun

mauvais goût, mais il est sujet à provoquer de violentes douleurs; cependant il réussit assez souvent quand il est uni à un mucilage sucré, propre à prévenir ou à diminuer les coliques et les aigreurs.

Il existe parfois dans l'hypocondrie une sorte d'engorgement des organes abdominaux affaiblis et surchargés de mucosités variées ; c'est un résultat assez ordinaire de la vie sédentaire et du désœuvrement. L'estomac, le foie, la rate, les intestins, le mésentère, etc., paraissent dans un état d'empâtement, d'engorgement, parfois manifeste au travers des parois de l'abdomen, et distinct d'une altération organique. L'excitation produite par les purgatifs sur les viscères abdominaux, augmentant leurs sécrétions et les évacuations alvines, les dispose parfois à reprendre leur exercice naturel, pour peu qu'à cette excitation momentanée on fasse succéder les toniques, et les plus légers d'abord. Il importe de dissiper cet engouement, qui pourrait à la longue amener une phlegmasie chronique.

Le plus ordinairement cet accident survient chez des malades livrés à des habitudes inactives; en vain on emploierait les purgatifs seuls, l'embarras se reproduirait de rechef aussitôt dissipé; il faut de suite ranimer l'énergie intestinale, et obliger le malade à l'activité et au mouvement, afin de prévenir la récidive.

Les laxatifs ne diffèrent des purgatifs que par une irritation moins vive et des sécrétions moindres : d'après ce double rapport, on voit quand ils sont préférables.

L'habitude des purgatifs ne peut être abandonnée impunément lorsque surtout elle est invétérée, puisque cette interruption a causé quelquefois l'hypocondrie. On a même vu cette névrose céder à l'usage d'un purgatif pris au retour du printemps et de l'automne; toutefois les médecines de précaution nuisent en général plus qu'elles ne sont utiles.

Sauvages n'est pas le seul qui ait reconnu les inconvéniens des purgatifs dans cette affection ; *Michael Alberti* les a également signalés ; mais il pense qu'on peut employer ces médicamens avec de grands avantages sous forme de lavemens ; et cette opinion nous semble rationnelle. Voilà ce qu'il dit en parlant de ces malades : *Imprimis clysterum usu sublevantur ; clysteres, purgantia verò, quàm sæpissimè, purgationes quidem ibì familiarissimè ancipites ; clysteres certissimè utiles.*

En effet, les gros intestins sont beaucoup moins sensibles que les intestins grêles ; en sollicitant leur action on a peu à craindre les irritations, d'abord parce que leur sensibilité est bien moindre, ensuite parce qu'elle n'est pas exaltée comme celle de l'estomac, du jéjunum, etc., par l'état maladif auquel ils ne participent que fai-

blement. Mais en outre, les purgatifs administrés de cette manière, ne troublent pas autant la digestion, et en déplaçant l'irritation qui affecte des organes plus importans, ils sont susceptibles de contribuer à la guérison des malades; enfin, nous observerons qu'ils sollicitent les mouvemens critiques de la nature par la voie du canal intestinal, et peut-être par l'écoulement hémorrhoïdal. Cependant nous conviendrons qu'on peut, sans injustice, retrancher une partie des éloges accordés par *Alberti* à ce mode de purgations, bien qu'il soit peut-être trop négligé dans beaucoup d'affections.

Les lavemens à l'eau froide agissent plus comme toniques que par leur action purgative, et ont produit parfois de bons effets.

Les suppositoires sont spécialement indiqués dans la plupart des hypocondries et des engorgemens légers et chroniques du foie, de l'estomac, etc.; ils excitent les sécrétions hépatiques et intestinales en déterminant loin de ces organes une irritation assez vive; leur emploi doit être réitéré, parce que leur action n'est que momentanée et peu prononcée; mais aussi ils n'exposent pas aux inconvéniens qu'entraîne quelquefois l'usage des purgatifs, dont l'excitement immédiat et trop violent peut augmenter la sensibilité des organes malades.

Les sudorifiques sont applicables, et surtout à

l'intérieur, dans le principe d'une hypocondrie dont la source première dérive du dérangement de la transpiration; mais il faut pour administrer ces médicamens, qu'il n'existe aucun symptôme d'irritation ou de lésion locale, ni soif, ni fréquence du pouls. On peut seconder leur action par les frictions sèches ou médicamenteuses, et les applications de taffetas gommé, par les bains de vapeurs, qui sont en quelque sorte autant de sudorifiques appliqués à l'extérieur.

Les chaussons de flanelle, de taffetas gommé, les bains de jambes tièdes ou rendus aromatiques, les frictions avec l'éther, l'ammoniaque étendu, conviennent particulièrement quand on se propose de faire reparaître une transpiration habituelle des pieds.

Si l'on réfléchit aux formes variées, bizarres, et tout-à-fait méconnaissables que revêt parfois l'affection siphilitique très-ancienne et dégénérée, on concevra qu'il n'est pas impossible qu'elle ne simule, seule ou réunie à d'autres circonstances, une hypocondrie, ou qu'elle ne la produise véritablement : dans l'un et l'autre cas, il faut faire concourir à la cure les médicamens dits *antivénériens*, tels sont les bols ci-contre (1), la li-

---

(1) ℞ Oxi-muriate de mercure..... ℔ xvj.
Alcool..... ℥ j
Eau distillée..... ℥ ß
Opium gommeux..... ℔ xxiv

queur de *Van-Swiéten*, les sudorifiques rapprochés, et les frictions mercurielles.

On sait que des peuples entiers vivent en grande partie du lait des animaux : le Scythe et l'Arabe trouvent leur nourriture la plus ordinaire dans celui de leurs jumens et de leurs chameaux. C'est un aliment des plus utiles, et considéré comme médicament il rend encore d'éminens et nombreux services; lorsque l'estomac le digère facilement, il faut en continuer l'usage, mais on devra y renoncer s'il paraît passer avec peine. On facilite sa digestion en le coupant d'abord avec deux tiers d'infusion de fleurs de tilleul ou de feuilles d'oranger; on augmente ensuite progressivement la dose du lait : les différens animaux qui nous en fournissent sont : la vache, l'ânesse, la chèvre ; rarement a-t-on recours en Europe à celui de jument ou de chameau. Je ne parle pas du lait de la femme, dont l'usage semble réservé à la nourriture des enfans, bien qu'on l'ait conseillé et fait prendre quelquefois à des adultes très-affaiblis.

Jos. Lanzonius (cons. CVIII, t. II.) parle d'un

Extrait de bourrache..... ʒ ij

Gomme arabique..... ʒ iv.

Faites, suivant l'art, cent vingt bols; deux soir et matin. L'extrait leur conserve très-long-temps une consistance mollette, et l'opium gommeux diminue l'irritation produite par le sel sans nuire à son action *spécifique*.

hypocondriaque qui prit du lait d'ânesse, eut recours aux bains, etc., fit le voyage de Venise avec des compagnons très-joyeux, et guérit enfin parfaitement.

L'usage du lait d'ânesse peut avoir contribué à cette guérison; mais les joyeux compagnons de route y ont eu certainement la meilleure part. Dans l'exemple suivant nous voyons un nouveau témoignage en faveur de ce médicament (*Journ. de Méd.*, sept. 1813). Un étudiant en médecine, qu'une vie trop appliquée et trop sédentaire avait jeté dans une maladie accompagnée de la plupart des symptômes qui caractérisent la consomption nerveuse, ou spléen, éprouvait une irritation fixe à l'hypocondre gauche. Ce jeune homme qui avait déjà employé infructueusement beaucoup de remèdes, fut guéri par la diète lactée suivie exactement pendant quatre mois. A sa mélancolie et à son extrême maigreur succédèrent son embonpoint et sa gaîté naturels, qu'il a conservés en mêlant à ses études les exercices et les récréations convenables.

L'usage de ce précieux liquide convient surtout après l'abus des purgatifs et des remèdes irritans, du mercure, etc.

Nous terminerons l'examen de cette partie des médicamens en rapportant des exemples de guérison dues ou attribuées à des substances dont l'efficacité n'est rien moins que reconnue.

L'or potable, conseillé par *Zacutus Lusitanus*, a guéri un de ces malades. (Obs. XII, lib. II, *Prax. med.*) *Lanzonius* rapporte l'exemple d'un homme âgé de quarante ans, depuis long-temps hypocondriaque, et qui dut sa guérison à l'usage de la laitue. (Obs. CIV.) *Littre* et *Geoffroy* ont réussi dans plusieurs cas par l'emploi de moyens analogues.

Considérons maintenant des agens d'un usage beaucoup plus rationnel.

Les eaux que la nature nous offre avec une extrême abondance sont presque toutes minérales : l'eau des fleuves et de la mer, celle qui provient de la pluie, des brouillards ou de la rosée, celle qui résulte de la fonte des glaces ou des neiges, contiennent des substances minérales ; l'eau distillée seule, bien que produite artificiellement, est la plus naturelle et la plus simple, celle où l'on trouve l'hydrogène et l'oxygène isolés le plus possible de toute autre substance.

Toutefois on est convenu d'appeler *eaux minérales*, celles que des propriétés particulières, qui agissent sur nos sens et nos organes, nous font reconnaître pour différentes de l'eau commune, et surtout de celle qui est produite par la distillation; elles varient par leur température : les unes n'ont que le degré de chaleur relatif à la température atmosphérique; les autres offrent une chaleur égale à celle de l'eau tiède, et quelquefois à celle

de l'eau en ébullition. On donne à cette dernière classe le nom d'*eaux thermales*. Une seconde différence non moins essentielle résulte de la nature de leurs matériaux immédiats : on en connaît d'acidules, de salines, de ferrugineuses, de sulfureuses et de gazeuses; enfin, on les distingue en naturelles et artificielles. Deux établissemens également recommandables nous les présentent à Paris, en très-grande quantité. Le premier est le dépôt général des eaux minérales naturelles (1), auxquelles on doit toujours donner la préférence pour l'usage intérieur, d'autant que rien n'égale la juste confiance que mérite cet établissement. Le second est celui de Tivoli, où on les prépare par des procédés fort ingénieux qui rendent les eaux minérales artificielles presque aussi convenables, surtout pour l'usage extérieur. Les eaux gazeuses artificielles ont un avantage, c'est de ne pas laisser évaporer le gaz, qui dans les eaux naturelles, se dissipe, malgré toutes les précautions, au bout d'un certain temps, quelle que soit la nature du vase qui les renferme.

Nous ne parlerons que des eaux minérales dont la nature intime paraît susceptible d'applications heureuses au traitement de ces névroses, et nous renvoyons, pour les caractères physiques et chi-

(1) Rue Plâtrière, près de la Poste.

miques de ces mêmes eaux, aux auteurs qui en ont donné l'analyse, aux traités de matière médicale, où leur histoire est exposée, et principalement au savant ouvrage du docteur *Alibert*, et au *Cours méthodique de Matière médicale* du docteur *Pérylhe*, dont nous fîmes paraître la seconde édition en 1804.

Les différentes eaux minérales sont surtout indiquées lorsque l'affection hypocondriaque, par sa continuité, par l'intensité ou la persévérance de ses causes, fait craindre l'engorgement des viscères abdominaux, ou quelque autre complication fâcheuse : dans ce cas, on prescrit l'usage de celles que l'expérience a consacrées spécialement au traitement de ces dernières maladies, dont on s'efforce de prévenir ou d'arrêter les progrès.

On peut faire usage des eaux minérales à la source même, ou dans les établissemens auxquels on en adresse du pays qui les fournit, ou dans ceux qui les composent artificiellement. On les administre à l'intérieur, pures ou coupées avec une décoction d'orge, une infusion aromatique; d'autres fois on les prescrit en bains, et même en douches.

Jetons un coup-d'œil sur chacune des espèces principales.

Les eaux minérales sulfureuses sont celles dont le gaz hydrogène sulfuré constitue le prin-

cipe le plus actif : elles sont remarquables par une odeur d'œuf couvi et un goût fort désagréable.

Celles de Barèges, de Bagnères, de Bonnes, sont, parmi les eaux sulfureuses thermales, les plus renommées. Les eaux d'Aix-la-Chapelle, recommandées tout récemment contre l'hypocondrie, par le docteur *Huffeland*, revendiquent de nombreux succès. Viennent ensuite les eaux de Bade, de Loeche, et celles d'Enguien près Paris. Ces eaux conviennent surtout dans les maladies nerveuses des organes digestifs compliquées ou produites par les affections de la peau.

Les eaux minérales acidules contiennent de l'acide carbonique et quelques sels : elles sont excitantes. On remarque surtout les eaux thermales acidules du Mont-d'Or et de Clermont-Ferrand ; celles de Montbrisson, de Seltz, sont froides : cette dernière est d'un usage très-répandu ; on les prend ordinairement aux repas avec un filet de vin. En général, ces eaux sont indiquées contre la débilité des organes digestifs.

Les eaux ferrugineuses acidules thermales ont une saveur analogue à celle du métal qu'elles contiennent ; elles sont fortifiantes, très-salutaires aux personnes nerveuses et débiles, et méritent leur réputation. On a surtout préconisé l'usage intérieur des eaux de Vichy et de Bourbon-L'Archambaut contre l'hypocondrie, la mélancolie et

l'hystérie, etc. Ces dernières sont encore employées en douches et en bains.

On a également vanté les eaux ferrugineuses acidules froides de Spa, de Forges, de Vals, de la fontaine de Jonas à Bourbon-L'Archambaut, de Bussang, de Provins; celles de Passy près Paris ont été éminemment utiles dans un grand nombre de circonstances, et méritent plus d'éloges qu'elles n'en ont obtenu : il faut les prendre épurées; la proximité (1) ajoute à leur utilité l'avantage d'un prix très-modique.

Les eaux minérales salines contiennent différens sels, et principalement du muriate de soude, des sulfates de soude et de magnésie.

Elles sont thermales ou froides. Parmi les premières, on distingue celles de Plombières, de Bains, de Luxeuil, Lamotte, Balaruc, Bourbonne-les-Bains, et de Bagnères. Les plus accréditées des eaux salines froides sont celles de Pyrmont et de Sedlitz, dont *Hoffmann* recommandait l'emploi, et obtenait les plus heureux effets. Enfin celles d'Egra et d'Epsom ont encore été conseillées; les unes et les autres peuvent être d'un grand secours contre les névroses, avec embarras des premières voies.

La composition et la température des eaux minérales leur donnent sans doute des propriétés

---

(1) Quai Billy ou de Chaillot, n° 19.

utiles et variées ; mais ce qui ajoute à leur efficacité, c'est l'exercice que leur usage nécessite, c'est l'empire des impressions agréables que reçoivent à leur source les malades qui s'y rendent ; c'est parfois l'espoir qu'inspire un moyen nouveau : enfin, c'est la diversion qui résulte des rapports nouveaux que produisent le voyage, un climat inconnu, des habitudes différentes, et surtout le spectacle d'une société variée. Mais autant les plaisirs plus ou moins bruyans qu'on trouve à la plupart de ces sources sont favorables aux individus dont la sensibilité est seule affectée, sans lésion profonde des tissus organiques, autant ils seraient contraires aux personnes atteintes d'altérations profondes dans les viscères.

Nous avons rapporté déjà plusieurs observations qui démontrent l'utilité des eaux minérales ; *Hoffmann* en a consigné dans ses œuvres un grand nombre d'exemples : tantôt la guérison était due à l'usage intérieur des eaux, tantôt aux bains ; dans d'autres cas, à leur usage intérieur et extérieur, puissamment secondé par le voyage, l'exercice, la distraction, et toutes les impressions morales qui en sont le résultat le plus ordinaire.

Après avoir examiné l'action des médicamens intérieurs, nous allons passer succinctement en revue les agens extérieurs.

L'application de la saignée et des sangsues,

dans le traitement de l'hypocondrie simple, doit être déterminée par la cause qui a produit la maladie, par l'âge des malades, par l'état général des forces vitales, et par les symptômes qui font préjuger l'existence d'un état de pléthore sanguine. Si l'affection nerveuse est le résultat de la suppression d'une hémorrhagie, on doit chercher à la rappeler par l'usage rationnel des moyens avoués généralement, par les fumigations, les bains locaux, et les mélanagogues ou emménagogues.

Si ces premières tentatives sont insuffisantes, on a recours à la saignée ou aux sangsues. Quand l'hypocondrie reconnaît pour cause une aménorrhée accompagnée d'atonie, on insiste surtout vers l'époque des règles, sur les infusions amères, avec addition de safran; sur l'eau ferrée, le vin d'absinthe, de quinquina, l'éthiops martial, la poudre de cannelle, l'extrait de gentiane, de genièvre ou de quinquina; les frictions sèches ou aromatiques et irritantes pratiquées sur les lombes, le bassin, les jambes et les cuisses; on seconde leur action par les bains tièdes de jambes ou de siége simples, ou même animés par l'addition du muriate de soude, de la moutarde, du savon, du sulfure de potasse, etc. etc. Si la femme était fortement constituée et très-sanguine, les médicamens excitans seraient contr'indiqués, et l'on se bornerait aux bains

locaux ; quelquefois, malgré tous ces efforts, l'aménorrhée persiste ; l'indication est alors positive ; on en vient à l'application des sangsues ; la vulve, ou plutôt la région interne, moyenne et inférieure des grandes lèvres, est le lieu le plus convenable. On peut, si la malade répugne invinciblement à cette application, la conseiller aux cuisses, aux jambes, ou mieux la remplacer par une saignée du pied proportionnée aux forces générales.

Faisons succéder l'exemple au précepte.

Une jeune veuve d'un tempérament sanguin, d'une figure vive, fraîche et colorée, s'étant mise en route par un temps froid et pluvieux, eut ses règles supprimées : aussitôt maux de tête violens, chaleur et rougeur du visage, perte d'appétit. A l'époque menstruelle suivante, pesanteur générale, douleurs dans les lombes et aux aines, gonflement des veines, dégoûts, flatuosités, constipation, malaise après les repas. On lui donna des purgatifs, et on lui fit une saignée du bras ; elle en éprouva quelque soulagement ; on lui prodigua ensuite une foule d'apéritifs, où se trouvaient mêlés quelques emménagogues. Enfin, à l'époque des règles, on la saigna du pied ; elles reparurent, et sa santé se rétablit parfaitement.

(Dissertation de M. *Royer-Collard* sur l'*aménorrhée.*)

Il faut choisir pour l'emploi des saignées lo-

cales ou générales chez les femmes dont les règles sont dérangées, l'époque correspondante au moment de leur menstruation, et attendre qu'elle soit passée plutôt que de la devancer, parce que souvent les bains de pied ou de siége animés, et l'usage des frictions, des emménagogues, ont dispensé d'avoir recours à ces opérations.

L'épistaxis se supprime parfois vers l'âge de trente-cinq ou quarante ans, époque où le système veineux abdominal devient prédominant. Souvent alors, surtout chez l'homme, le flux hémorrhoïdal s'établit, ou l'affection hypocondriaque se déclare; dans ce cas, on doit se proposer d'exciter cette hémorrhagie par les sangsues à l'anus, quand surtout l'hypocondrie aura été précédée, ou sera accompagnée des signes qui font connaître la surabondance du sang; on agira de la même manière lorsqu'on voudra rappeler des hémorrhoïdes dont la suppression aura produit cette névrose. *Stahl*, *Rivière* et *Bonnet* ont reconnu le parti avantageux qu'on pouvait retirer alors de l'application des sangsues. On emploie, dans ce cas, la saignée du pied ou les sangsues; on met celles-ci au siége, quand l'homme approche de quarante ans, et quand la femme a cessé d'être réglée, ou qu'elle ne présente aucun indice d'irritation ou de congestion vers l'utérus; mais lorsque cet organe devient le foyer d'une congestion sanguine, caractérisée par les dou-

leurs hypogastriques, lombaires, une ménorrhagie, etc., la saignée du bras est seule praticable, et doit être préférée aux sangsues appliquées au siége, et qui, sous le rapport de l'hypocondrie, seraient cependant mieux indiquées. Au contraire, dans le jeune âge, où l'on s'efforce d'appeler le sang vers l'utérus, lorsque la nature l'en éloigne, soit par débilité, soit par suite d'une direction vicieuse, c'est vers le bassin qu'on établit les excitations, et à la vulve ou aux parties inférieures qu'il faut pratiquer les saignées ou appliquer les sangsues.

Si l'hypocondrie, occasionnée par l'absence d'une évacuation habituelle, se complique d'un engorgement des organes de la poitrine, et spécialement de l'abdomen, on doit opposer à la pléthore pulmonaire, ou même à l'hémoptysie, la saignée du bras. Au contraire, les sangsues au siége seront très-efficaces dans le principe des engorgemens au foie, à la rate, etc. Cette pratique conviendrait également, si l'on redoutait ces accidens chez une femme bien réglée; mais alors on pratiquerait la saignée du bras, ou l'on appliquerait les sangsues huit à dix jours après les règles finies, afin de ne pas troubler cette fonction importante. Un élève de *Stahl* fait des sangsues un éloge fondé, mais peut-être un peu exagéré : *Minimè reticenda utilitas hirudinum in hoc affectu*, dit *Georges Clacius*. Il recommande en

outre la saignée du pied, et regarde celle du bras comme nuisible dans beaucoup de cas. Enfin, il donne le conseil que nous avons déjà mentionné, de faire à la veine une ouverture un peu grande : *Incisio fiat largior, ut spissior sanguis breviori tempore sufficienter effluere queat.* En effet, il nous semble que les saignées du pied et les sangsues aux extrémités inférieures, et surtout au siége, sont bien préférables, dans cette maladie, aux saignées du bras. Ceci ne doit pas infirmer ce que nous avons dit de ces différentes opérations considérées chez les personnes du sexe.

La nécessité de la saignée ou des sangsues s'annonce presque toujours par plusieurs des symptômes suivans : maux de tête ou pesanteur, étourdissemens, éblouissemens, vertiges, somnolence, sommeil lourd ou agité, et parfois prolongé, réveil difficile, rougeur et injection des yeux, coloration de la figure, démangeaison générale ou locale, palpitations ou oppression, battemens du pouls plus ou moins forts, engourdissemens des mains, des bras, des pieds, et parfois des jambes et des cuisses. L'habitude ou la présence d'une hémorrhagie confirme l'indication; cependant tout cet appareil peut être trompeur, et produit par l'exaltation nerveuse. Dans un fait analogue que je vais rapporter, je fus long-temps incertain, et le hasard peut-être, autant que la réflexion, me fit éviter l'écueil. Un

des officiers les plus distingués de l'armée française, dans l'arme du génie, d'une imagination ardente et d'une grande activité, prend, après la paix, des habitudes casanières, éprouve bientôt du dérangement dans sa santé, et vient me consulter. Il avait trente-trois ans, la figure animée, la voix forte; son moral était exaspéré, et il se plaignait de la majeure partie des accidens que je viens de mentionner. Ma première idée fut de lui conseiller l'application de douze sangsues vers l'anus; mais, après une assez longue hésitation, je considérai que sa constitution était faible, et son tempérament nerveux ; que l'inaction physique et morale avait depuis peu remplacé chez lui la vie la plus active et la plus pénible, et que la pléthore sanguine pouvait n'être qu'apparente. Je le mis à l'usage des anti-spasmodiques doux et fortifians; je l'engageai à rechercher toute espèce de distractions, à fréquenter davantage la société de ses amis, à voyager dans les environs de Paris ou au loin. En effet, il a repris une vie très-active et fort occupée, et a retrouvé dès-lors une très-bonne santé.

S'il existe chez un malade atteint d'hypocondrie des indices d'une pléthore sanguine ou d'un effort de la nature vers un flux hémorrhoïdal, lors même que l'invasion de la névrose serait étrangère à toute suppression d'hémorrhagie, il faut encore recourir à la saignée ou à l'applica-

tion des sangsues. C'est l'analogie qui nous suggère ce précepte : la nature guérit souvent ces maladies nerveuses en produisant des hémorrhagies, et le médecin imite ce mouvement critique par la saignée locale : *Hæmorrhoïdes melancholiam et lienis morbum curant.* (Hipp.)

Quand la suppression d'une hémorrhagie, loin d'être cause, n'est qu'un effet de la maladie, on doit en quelque sorte l'oublier pour combattre celle-ci, persuadé que l'écoulement ne tardera pas à reparaître quand l'affection essentielle sera guérie. Si cependant la suppression consécutive de l'hémorrhagie aggravait les accidens, on chercherait à la rappeler, ou à diminuer les résultats par les procédés que nous avons déjà fait connaître ; mais on ne saurait être trop circonspect sur l'emploi des saignées dans ces maladies, si souvent remarquables par un affaiblissement local du système digestif, ou par une débilité générale, et on ne doit les employer que quand leur indication est bien évidente.

De plus, il ne suffit pas d'appliquer des sangsues à l'anus pour rappeler un flux hémorrhoïdal, ou de rétablir cet écoulement pour dissiper une maladie produite par la suppression de cette hémorrhagie; il faut, pour qu'on puisse espérer de guérir l'hypocondrie par la soustraction de la cause, que le désordre de l'économie ne soit pas trop avancé, et qu'il soit combattu par les moyens

appropriés. Nous allons confirmer cette assertion par un exemple extrait de *Zacutus Lusitanus.*

Un baron, sujet depuis long-temps aux douleurs hémorrhoïdales, et à un écoulement mensuel d'un sang épais et comme bourbeux, éprouve, par la suppression de ce flux habituel, tous les accidens de la mélancolie (ou plutôt de l'hypocondrie); on leur oppose les moyens usités, les mélanagogues, les sangsues sur les tumeurs hémorrhoïdales, les lotions chaudes sur les cuisses et les scarifications, la saignée du pied, les bains, etc., les cardiaques, et deux cautères aux jambes : il n'en résulta aucun soulagement; on eut recours alors à un cautère appliqué sur la région de la rate, et au bout de deux mois les accidens furent entièrement dissipés.

Toutefois il ne faut rien conclure de ce fait et de quelques autres analogues contre le conseil donné de combattre, par l'application des sangsues au siége, l'hypocondrie, suite d'un flux hémorrhoïdal supprimé : ce précepte, conforme à la bonne pratique, n'en conserve pas moins toute sa valeur, considéré d'une manière générale; mais lorsque la névrose est déjà ancienne, il faut, nous le répétons, perdre de vue en quelque sorte la suppression qui l'a occasionnée.

Les embrocations ou les applications toniques, si vantées par les anciens, et récemment par le professeur *Barthez*, ne sont point à négliger;

elles seront encore plus efficaces, si on a soin de les rendre calmantes. C'est ainsi que nous avons vu bien souvent un emplâtre de thériaque appliqué sur l'épigastre dissiper des cardialgies violentes : on peut y ajouter avec avantage l'extrait de ciguë et l'opium, ou simplement la poix de Bourgogne, et le diachylon gommé, qui serviront en outre à maintenir les autres substances, en bornant par un cercle la circonférence de l'emplâtre.

Pour frictionner la région de l'estomac, on se servira utilement des spiritueux, comme la teinture de quinquina, de gentiane, d'aunée, de cochléaria, de l'eau de mélisse ou de Cologne, etc. etc. Mais s'il y a sensibilité vive à l'épigastre ou aux hypocondres, les narcotiques et les anti-spasmodiques devront être associés aux fortifians : on combinera le baume tranquille, le laudanum liquide, l'opium, le camphre, l'éther aux toniques ou aux stimulans, dont la dose et l'intensité sera relative à la sensibilité de l'individu.

Parmi les topiques admissibles dans la cure de cette maladie, on distingue encore les vésicatoires. Non-seulement il est avéré que l'on négligeait autrefois, dans une foule de circonstances, d'avoir recours à ces moyens énergiques, lorsqu'ils étaient commandés par les accidens, mais il est en outre reconnu que leur emploi était

souvent beaucoup trop différé. C'est ainsi qu'ils ne sont point mentionnés dans la plupart des ouvrages qui traitent de cette névrose, et cependant ils fournissent une ressource ordinairement exempte d'inconvéniens, et fréquemment applicable. L'analogie vient appuyer le raisonnement : en effet, on connaît les heureux résultats obtenus par les vésicatoires dans plusieurs névralgies, dans le vomissement nerveux, et dans une foule d'autres affections. Sans doute, des succès aussi nombreux qu'éclatans auraient dû conduire à mettre ces médicamens en usage contre plusieurs cas d'hypocondrie.

Indiquons maintenant les variétés de cette vésanie, qui réclament plus particulièrement leur application.

Le transport d'une affection rhumatismale, arthritique ou goutteuse ; la desquammation imparfaite ou prématurée des phlegmasies cutanées aiguës, comme variole, scarlatine, rougeole, érysipèle ; la disparition spontanée ou artificielle des maladies dartreuses peut donner lieu à diverses affections hypocondriaques, qui seront affaiblies ou même dissipées par les vésicatoires secondés convenablement. On ne se bornera pas à une seule application, il faudra quelquefois les entretenir, ou y revenir à plusieurs reprises : dans d'autres cas, il faudra varier le lieu de leur application, en mettre un d'abord sur le siége

primitif de la maladie qui a été déplacée; d'autres fois, c'est sur l'épigastre qu'il faut l'appliquer, ou enfin dans la région où il se manifeste un sentiment douloureux.

Ces topiques sont spécialement indiqués contre l'hypocondrie produite ou aggravée par la présence ou le déplacement d'un rhumatisme, d'une goutte vague, d'une irritation dartreuse, érysipélateuse, psorique, et doivent être secondés par les bains tièdes, les bains d'eaux et de vapeurs sulfureuses, etc. Aucun inconvénient ne saurait balancer les avantages qu'on doit attendre de ces agens quand ils sont administrés convenablement.

Les rubéfians sont également applicables au traitement de ces maladies; les plus usités sont l'alkali volatil, la teinture de cantharides, la dissolution de sublimé corrosif, les sinapismes, les huiles âcres essentielles, le suc des plantes irritantes, l'euphorbe, la dentellaire, etc. La nature détermine fréquemment, dans ce genre de maladies, des éruptions critiques; et c'est agir sagement que de suivre la route qu'elle trace elle-même. Ces topiques, ou les vésicatoires volans, promenés sur la surface cutanée, sont susceptibles d'amener une très-grande amélioration, soit en déplaçant le principe morbifique (1), soit

(1) C'est ainsi qu'on rapporte, dans une dissertation sou-

en excitant l'action de la peau, soit en relevant sympathiquement les forces vitales affaiblies ou opprimées.

Le moxa, le séton et les cautères seront aussi admissibles dans diverses circonstances, et agiront avec une énergie relative à l'intensité et au mode de leur action. Il est encore d'autres moyens, également employés à l'extérieur, et qui sont d'un usage plus éprouvé et plus général dans la cure de cette maladie : ce sont les bains.

On les divise généralement en bains froids ou chauds, en bains domestiques ou d'eau courante; ils peuvent être simples ou composés, soit artificiellement, soit par la nature de l'eau dont on se sert; tels sont ceux d'eaux minérales, naturelles ou artificielles. Les bains tièdes sont d'un usage journalier; leur température doit être, en hiver, de 28 à 30 degrés, de 26 à 28 en été. On doit n'y pas rester très-long-temps : une heure ou deux au plus suffisent ordinairement. Les frictions sèches pratiquées à l'issue du bain ajoutent à son efficacité; ils ont véritablement une propriété relâchante, et conviennent surtout aux individus secs, et dont la fibre est irritable; tandis que les personnes qui ont beaucoup d'em-

---

tenue à Berlin, que l'inoculation de la gale a fait cesser une hypocondrie qui émanait de la disparition trop prompte d'une affection cutanée.

bonpoint, et dont la peau est flasque, en retirent moins de profit.

Lorsqu'un de ces malades a été sujet à des affections cutanées, qu'il transpire très-peu, les bains pourront lui être favorables, surtout s'il ajoute à leur usage l'attention de se tenir à l'abri du froid, ou de se mettre au lit en sortant de l'eau.

En général les bains tièdes ont, comme ceux qui sont froids, l'avantage de provoquer l'appétit.

Ne savons-nous pas d'ailleurs que les bains tièdes ne sont débilitans que d'une manière relative, et non absolue : on peut dire qu'ils affaiblissent toutes les fois qu'ils sont conseillés inconsidérément ; mais ils relèvent souvent l'énergie vitale, quand ils sont prescrits à propos ; en effet, l'homme exténué par une marche forcée, une fatigue excessive, celui qu'un rhumatisme violent prive de l'usage d'un membre sort du bain tiède, plus dispos et plus fort.

Le succès que retira César-Auguste des bains froids, dont *Antonius Musa*, son médecin, lui avait donné le conseil, les mit en grande faveur ; et cette pratique est encore très-suivie de nos jours ; ils agissent comme excitans lorsqu'on se borne à de simples immersions dans l'eau, ou quand on n'y fait qu'un séjour de vingt à trente minutes ; si on les prolonge plus long-temps, leur propriété change, et ils deviennent dé-

bilitans. Mais cette influence est relative à la force et à la sensibilité individuelle; telle personne les supporte très-bien pendant une heure, et retrouve de suite toute sa vigueur, tandis qu'une autre n'y séjourne qu'avec peine pendant un laps de temps beaucoup plus court. Qui ne connaît d'ailleurs les résultats du climat et des longues habitudes à cet égard? On ne doit en outre les conseiller, dans nos régions, que pendant les chaleurs de l'été, ou lorsque le thermomètre marque au moins 10 degrés au-dessus de zéro.

Les personnes d'une constitution molle et lymphatique, douées d'un embonpoint très-prononcé, spécialement quand elles ne sont pas très-sensibles au froid, en éprouvent souvent de bons effets.

Les bains d'eaux courantes, et surtout ceux de mer, sont en général beaucoup plus efficaces, et ont souvent répondu à l'attente du médecin, qui les propose de préférence contre cette vésanie, lorsque les puissances de la vie ne sont pas trop affaiblies. Quant au passage du bain chaud ou tiède dans l'eau froide, il expose à des inconvéniens; je ne vois qu'une circonstance où ce procédé serait admissible, c'est dans l'hypocondrie produite par la suppression brusque d'une fièvre intermittente qu'on voudrait rappeler.

Les bains de mer sont applicables à beaucoup de ces malades, et spécialement dans les pays chauds, où l'on peut en faire usage pendant une grande partie de l'année. Il existe maintenant à Dieppe un établissement destiné à cet usage, et dirigé par un médecin très-éclairé, M. *Langlois*. Les bains sulfureux de Barèges, de Bagnères, etc.; ceux de Plombières et de Bourbonne, etc., sont également susceptibles d'applications utiles. On peut imiter les premiers en ajoutant à l'eau d'un bain, sulfure de potasse ℥ de ij à iv; et la préparation suivante pourra très-bien suppléer celui d'eau naturelle de Plombières.

℞ Carbonate de soude.....	āā ʒ iij ß
Sulfate de soude.....	
Muriate de soude.....	ʒ ß
Albumine.....	℥ j
Carbonate de chaux.....	ʒ ij
Eau.....	q. s.

Telles sont les principales ressources que nous pouvons puiser dans les médicamens appliqués au traitement de cette affection nerveuse; nous allons nous convaincre incessamment qu'on trouve dans la direction des facultés mentales un parti non moins avantageux.

QUATRIÈME SECTION.

Traitement moral de l'Hypocondrie.

Le traitement moral de cette névrose consiste dans la bonne direction donnée à tous les attri-

buts qui constituent nos facultés mentales, et qui se rattachent à cette fonction étonnante par laquelle nous nous élevons au-dessus de tous les êtres animés, en un mot à notre intelligence. On ne peut mettre en doute le plus glorieux apanage de l'homme; et bien que l'âme en elle-même soit inaccessible à nos sens, ses effets sont évidens pour nous, et son existence incontestable. Nos sensations, nos perceptions, nos affections, nos passions, nos fonctions intellectuelles, sont autant de phénomènes qui peuvent être considérés comme les résultats de notre entendement.

Ces attributs moraux, bien dirigés, sont susceptibles de coopérer au rétablissement des personnes atteintes d'hypocondrie; mais il faut leur donner une direction tout opposée à celle qu'ils reçoivent de cette vésanie. Ainsi, ces malades rapportent à eux ou plutôt à leur santé toutes leurs facultés mentales; ils paraissent ne sentir que leurs maux, et semblent presque étrangers à tout autre objet : dans l'âge des passions ils n'en éprouvent que faiblement le besoin impérieux; leurs craintes prédominantes sont toujours relatives à leur existence; le jour et la nuit les mêmes idées sinistres se représentent à leur esprit. Le but que se proposera le médecin n'est donc pas seulement d'éloigner ces pensées de l'imagination du malade, il faut encore qu'il

s'efforce de l'attacher sur d'autres objets, de lui offrir d'autres sujets qui le frappent et appellent son attention tout entière, soit dans la conversation, soit dans ses méditations, quand il est en repos ou en mouvement, et aux époques si différentes de la journée : tels sont en partie les avantages qu'on peut espérer également des différens modes de diversion, de la fréquentation des sociétés, des spectacles, des voyages, des promenades, des lectures agréables et propres à remplacer la crainte ou la tristesse par des affections douces et plus convenables.

Mais c'est surtout dans les maladies nerveuses qui ont succédé à l'influence des peines de l'âme, et qui sont remarquables par le désordre de l'imagination et l'exaltation mentale, qu'il faut appliquer les moyens dont l'ensemble forme le traitement moral. Celui-ci se compose de tout ce qui peut agir sur nos sens et modifier nos sensations ou affections, et des impressions diverses que reçoivent nos passions et nos facultés intellectuelles.

Toutes les circonstances de la vie propres à faire naître le calme de l'âme, le plaisir ou la joie, et par conséquent capables d'affaiblir et d'effacer la peine, devront être recherchées par ces malades ou leur être offertes, quand rien ne s'y opposera : c'est aux sensations agréables qu'on doit rapporter les succès brillans attribués

à la fréquentation des sociétés particulières et des réunions plus nombreuses, aux pèlerinages de la Grèce, de l'ancienne Thébaïde, et enfin aux voyages vers les sources d'eaux minérales.

Des observations réitérées ont appris qu'en général les personnes gaies, actives et franches payaient moins souvent tribut aux affections hypocondriaques que les individus d'un caractère opposé : n'est-ce pas encore préparer la solution heureuse de ces maladies, que de faire contracter, à ceux qui en sont atteints, l'habitude des affections agréables, et de leur conseiller la société des personnes portées à la gaîté, ainsi que la lecture des ouvrages qui excitent des sensations analogues. On les engagera en outre à s'adonner aux professions qui n'exigent pas de profondes méditations, qui permettent la distraction, et les plaisirs d'une récréation variée, comme autant de circonstances qui peuvent à la longue influer sur leur état d'une manière avantageuse.

Ils s'étudieront à fuir la solitude et l'inaction, chercheront à provoquer la confiance, en en donnant l'exemple, en fournissant le témoignage d'une franchise éclairée, et s'efforceront de se monter à l'unisson des individus dont ils font leur société, afin de concourir à son agrément en travaillant à leur propre bien-être.

Il est en outre facile de sentir qu'en éloignant

de ces malades les hommes affectés des mêmes maux, qui, par leurs discours ou leur présence, les entretiennent dans des craintes continuelles, et leur rappellent sans cesse la maladie à laquelle ils sont en proie ; il est, disons-nous, évident qu'en détruisant l'action puissante de l'exemple, on fait en quelque sorte un premier pas vers leur guérison. C'est donc offrir aux hypocondres un conseil favorable, que de les engager à fuir la société et surtout la conversation des personnes qui éprouvent les mêmes accidens, ainsi que la lecture des ouvrages de médecine. La plus simple réflexion suffit pour convaincre de l'utilité de ce précepte. En effet, n'est-ce pas augmenter sa frayeur que de la communiquer à un homme déjà également effrayé? N'est-ce pas aggraver sa peine, que de s'en repaître constamment et de se refuser à toute distraction? Enfin ne devront-ils pas se garder de faire du récit de leurs souffrances l'éternel sujet de leurs entretiens.

On affaiblira les effets d'une douleur profonde, en écartant de l'esprit de ces malades tous les objets et toutes les circonstances propres à en retracer le souvenir. On conçoit également tout le parti qu'on peut attendre du temps, d'une heureuse diversion, et des moyens appropriés aux différens symptômes qui se déclareront.

Il est sans doute difficile de consoler les mal-

heureux, parce que trop souvent on oppose le sang-froid à leur égarement, l'indifférence à leur agitation : dès-lors leur confiance s'éloigne, et le chagrin se concentre davantage.

La conduite que doit bien souvent tenir le médecin nous est tracée par *Horace* écrivant à *Virgile*, pour l'exhorter à supporter avec calme la mort de *Quintilius*. Il lui dépeint l'étendue de la perte qu'ils ont faite, il l'engage à se résigner à la patience qui adoucit les maux qu'on ne saurait guérir.

Durum, sed levius fit patientiâ
Quidquid corrigere est nefas.

HORAT., *od.* XX.

Voulez-vous combattre le chagrin? provoquez la confiance de la personne qui est affligée; partagez sa douleur, insinuez-vous dans ses affections. Vous chercherez en même temps à diminuer l'excès de son désespoir et l'étendue de ses justes regrets. Plus tard vous ferez valoir avec adresse et ménagement les moindres sujets de consolation. Quelquefois vous rappellerez les pertes plus cruelles encore que d'autres ont éprouvées, ou vous laisserez apercevoir que des malheurs plus sensibles pouvaient l'atteindre. Par cette première tentative vous vous emparez de son esprit, afin de l'arracher à ses méditations, à la cause sur laquelle se concentrent toutes ses pensées, toutes ses affections, enfin toutes les

sensations qu'elle éprouve. Employez ensuite les moyens de diversion ; faites succéder aux épanchemens que vous avez amenés des conversations variées, étrangères à la peine prédominante ; repoussez vous-même toute dissipation trop joyeuse : quel surcroît de douleur inspirerait le contraste d'une gaîté folle et souvent irréfléchie, avec la contrainte imposée, et un simple retour sur soi-même ! Mais offrez au malheureux la société de ses amis les plus intimes, qu'ils excitent ses larmes : oh ! combien elles soulagent le cœur ! non-seulement elles procurent ce bien moral ; elles sont en outre, du moins en quelque sorte, une garantie contre les effets sourds et insensibles d'un chagrin intérieur et profond : plus son action est expansive, moins il est à craindre ; mais redoutez avant tout une douleur muette, sombre, concentrée, en un mot, une peine *rentrée*. C'est un principe septique, mortifère, qui a pénétré jusqu'aux sources de la vie : bientôt elles seront troublées, infectées ou épuisées.

Souvent il faut éloigner le malade du séjour qu'il habite, quand surtout rien ne l'y attache, lorsqu'il n'est pas obligé d'y revenir peu de temps après, ou quand les objets de ses affections les plus chères peuvent le suivre dans sa retraite.

Quelle puissance de diversion et de sensibilité douce exercent la vue de la campagne, le spec-

tacle de la belle nature, et par fois même la contemplation des chefs-d'œuvre de l'art ou des monumens célèbres! L'imagination est absorbée, toutes les facultés intellectuelles et morales sont agréablement occupées; déjà la douleur a perdu de son empire, et l'âme devient accessible à des idées de consolation : elle peut insensiblement renaître aux affections douces, à l'amitié, aux plaisirs tranquilles de la société, au bonheur du sage. Il ne suffit donc pas de dire à l'homme plongé dans la peine de changer de sentiment; la joie ne se commande pas plus que l'amour ou la haine; aussi faut-il observer les nuances successives, et conduire l'infortuné, au milieu des orages et des peines morales, jusqu'au but, jusqu'au port où il trouvera un asile assuré. Tantôt il faut faire naître l'espoir dans un cœur accablé sous le poids de ses maux, tantôt dissiper la tristesse par une heureuse diversion; ici, ménager; là, parler avec énergie; ailleurs, consoler, distraire, afin de remplacer le désespoir par des regrets réfléchis; et plus tard, afin de diminuer le chagrin, ou de faire succéder à la peine des sensations douces et agréables. *Magnus mihi erit Apollo*, dit Brunerius, *qui hypocondriacum, non sublato priùs animi aculeo, ad sanitatem reduxerit.* Il faut donc, pour guérir ces malades, effacer le chagrin qui les opprime, et qui est souvent le principe de l'hypocondrie.

La société des femmes, dont l'âme est en général si compatissante, est d'un précieux avantage pour les personnes en proie à la douleur morale ; elle tempère l'amertume de leur peine et provoque des affections douces, ou nous inspire l'espoir d'un meilleur avenir. « C'est dans » la société des femmes, dit M. *Lecamus*, que » l'homme perd son caractère farouche. *Cicéron,* » après avoir écouté les leçons d'éloquence que » lui donnait *Scevola* son maître, venait se ré- » créer dans la société de son épouse *Lælia,* dont » les discours, suivant l'expression de l'orateur » romain, avaient la teinte la plus élégante ». (*Médecine de l'esprit.*)

Tissot, dans son *Avis aux Gens de lettres*, nous offre le même conseil.

Le devoir du médecin est rempli quand il a opposé à la douleur morale toutes les ressources d'une consolation douce et adroitement amenée ; mais le malade doit aussi seconder ces efforts, et appeler sa raison à son secours. Trop souvent celui qui gémit sous le poids des affections les plus pénibles, désespère de trouver en lui-même aucune ressource. Cependant, dit l'auteur des *Tusculanes,* la nature nous a été libérale, et en nous donnant tant de remèdes pour le corps, elle en a aussi destinés à l'âme : celle-ci même a été le mieux partagée ; car les remèdes du

corps lui viennent de l'extérieur, et ceux de l'âme sont en elle.

Les passions peuvent également concourir à la guérison de ces névroses : elles sont la source de nos peines et de nos plaisirs; elles sont l'origine de nos maux, et souvent aussi leur remède.

On a mis en problème, si nos passions étaient subordonnées à l'empire de notre volonté. Cette question, qu'il y a dix-huit ans nous avions osé juger affirmativement, a reçu une nouvelle sanction du retour à l'ordre et aux vrais principes de la morale. Sans doute l'homme peut maîtriser ses passions, ou leur être asservi; ces combats intérieurs que nous éprouvons lorsque les sens nous portent vers un but dont nous éloignent le jugement et la réflexion; ces deux volontés opposées, dont *Saint-Augustin*, après *Saint-Paul*, nous a donné l'idée, l'*homo duplex* de *Buffon;* et cette distinction de l'homme des passions, et de l'homme de la raison, admise par les philosophes; ces combats enfin, s'ils attestent le pouvoir que les passions tendent à usurper sur nous, démontrent cependant, en dernier lieu, l'empire que peut toujours obtenir une raison forte et éclairée.

« L'âme est condamnée à se prêter aux besoins » du corps, mais non pour en être l'esclave; elle » revendique continuellement ses droits, et ja- » mais la partie de nous-mêmes qui, selon l'ex-

» pression de *Cicéron*, nous met en rapport avec
» les dieux, ne peut être soumise à celle qui nous
» ravale à la condition des brutes, sans que tout
» l'ordre social n'en soit renversé, et qu'il n'en
» naisse les plus grands malheurs. (MABLY.)

En s'armant d'une forte détermination, en opposant un grand courage et une volonté ferme à l'ascendant des passions, l'homme parviendra donc le plus souvent à les maîtriser. Ne sait-on pas qu'on peut réprimer ou arrêter un mouvement de colère, et qu'il est également possible de borner ses désirs, et de n'être pas dévoré par des espérances chimériques ou des projets ambitieux? Nous avons connu des individus très-portés à la colère, et qui ont fini, à force de soins, par dompter leur irascibilité naturelle. *Socrate* lui-même fut dans sa jeunesse fort enclin à la débauche ainsi qu'au vin, et sut, par la supériorité de sa raison, résister à l'impulsion de ces penchans honteux (1).

On doit donc recommander aux personnes menacées ou atteintes d'hypocondrie, de contracter

(1) Nous signalerons ici deux sources auxquelles nous renvoyons pour plus de développemens; 1°. le beau travail du professeur *Hallé*, sur les affections de l'âme (*Encyclop. méthodiq.*); 2°. la dissertation du docteur *Esquirol*, qui, en éclairant l'histoire des passions, a sans contredit le mieux démontré les avantages qu'on pouvait en retirer dans la cure des aliénations mentales.

l'habitude de maîtriser leurs passions, de ne pas s'asservir à l'empire des sens, et de s'appliquer surtout à ne connaître que la raison pour mobile de leurs discours et de leur conduite. Rien ne peut mieux disposer à cette étude, et surtout à cet empire de soi-même, qu'une bonne éducation, dont le but principal aura été de former ou de rectifier le jugement.

A l'hypocondrie provoquée par le chagrin d'un amour malheureux, opposez les consolations de l'amitié, la perspective d'un prochain adoucissement, les voyages; et laissez surtout entrevoir la possibilité d'un nouvel attachement : ce dernier moyen est le plus puissant de tous.

Ovide, pour guérir d'une inclination contrariée, conseille également de former de nouveaux liens :

Binas habeatis amicas,
Alterius vires subtrahit alter amor.

On trouve, dans les Tusculanes, un avis analogue :

Etiam novo quodam amore veterum amorem tanquam clavo clavum ejiciendum.

Tel est aussi le conseil que nous donne un philosophe qui connaissait bien le cœur humain : *Vouloir oublier un objet, c'est penser à lui. Pour l'oublier, il faut penser à d'autres objets.* (LABRUYÈRE.)

Ce n'est plus le même sentiment qui dirige

Ovide dans les moyens qu'il indique plus loin pour détourner d'une passion contrariée :

Exige quod cantet, si quæ est sine voce puella
Non didicit chordas tangere, posce lyram :
Turgida, si plena est, si fusca, nigra vocetur,
Et poterit dici rustica si quâ proba est.

Ce conseil a été répété depuis par *Sauvages*, qui avait bien étudié l'histoire et le traitement de ces maladies : *Vitia objecti amati detegenda, exageranda.*

Il faut avouer que ce précepte, en écartant ce qu'il offre d'odieux et de contraire aux convenances sociales, peut être utile dans quelques cas, et qu'il est même par fois le seul susceptible d'opérer une guérison parfaite.

Obs. Un jeune homme au printemps de l'âge, doué d'une santé robuste, d'un physique prévenant et d'un extérieur plein de noblesse, d'un caractère doux, et d'une imagination aussi vive que brillante, quitte la province et vient suivre à Paris le cours de ses études. Il se propose de sacrifier deux années au complément de son éducation, espérant recevoir, pour prix de ses travaux, la main d'une jeune personne qu'il aime et dont il est aimé. Après dix-huit mois d'un travail opiniâtre, auquel l'encourage l'espoir de posséder un jour sa jeune amie, toute correspondance est interrompue : dès-lors inquiétudes vagues, perplexités chaque jour renaissantes.

Bientôt il reçoit une lettre de cette jeune personne, qui lui apprend, que cédant aux désirs de ses parens, elle ne peut s'unir à lui.

Dans l'instant, douleur profonde et vivement sentie; exaltation de toutes ses facultés mentales, suivie d'un état de stupeur et d'abattement extrême, constriction violente vers l'épigastre, respiration insensible, soupirs profonds, séparés par de longs intervalles.

Le médecin le trouve plongé dans une consternation effrayante, et observant un morne silence. A la seconde entrevue il s'efforce en vain d'émouvoir l'imagination concentrée du malade, qui cependant arrache de son sein la lettre fatale.

Pendant trois jours même affection morale, et même trouble physique; refus des boissons et de toute nourriture, ce qui faisait craindre un dépérissement rapide.

Le médecin se concerte alors avec un de ses collègues; on ne pouvait favoriser cette inclination: il fallait donc en détourner ce jeune homme; ils se réunissent, provoquent sa confiance par les témoignages de l'intérêt le plus sincère, et se concilient son affection; bientôt tous les secrets d'un cœur ulcéré leur sont exposés avec candeur et effusion; le malade semble éprouver du soulagement: on vient alors au dénigrement de l'objet aimé; mais sa douleur s'exaspère, son imagination s'exalte, et il se retrace avec ravissement les

traits et la perfection morale de sa déité ; sa perte lui semble irréparable : de là le désespoir le plus atterrant. Ils le laissent exhaler la fougue de ses emportemens, conviennent de ses justes regrets, et semblent partager sa douleur ; mais ils ne peuvent concevoir comment cette jeune personne, avec les qualités les plus estimables, s'est déterminée aussi légèrement à abandonner son ami.

Cette objection, présentée sous diverses formes, fait sensation sur l'esprit du malade, et amortit sa passion dominante ; dès-lors il ne s'agit plus que de seconder par d'heureuses diversions l'impulsion déjà communiquée ; on le promène de distractions en distractions, et au milieu d'un repas, dans l'expansion d'une joie commune, et la réunion de quelques amis, on lui fait écrire une lettre de reproches et de rupture.

Il se trouve ainsi enchaîné ; le voile du prestige tombe, l'amour s'évanouit, et bientôt la raison reprend complètement son empire.

C'est alors que le médecin méritera le nom d'ἰσοθεον, ou de médecin du corps et de l'esprit, qu'*Hippocrate* donnait à ceux qui s'occupaient non-seulement des maladies du corps, mais aussi de consoler et de guérir les peines de l'âme. Cependant, s'il était possible d'écarter les obstacles qui s'opposent à l'union désirée, le meilleur parti serait d'exaucer les vœux du cœur.

En fouillant l'histoire des temps plus reculés,

nous trouvons un beau modèle, un bel exemple de la médecine philanthropique dans la conduite d'*Érasistrate*.

Appelé près d'*Antiochus*, ce médecin ne s'empresse pas de combattre les accidens qu'éprouve le jeune prince, mais il s'attache à en découvrir la cause, à recueillir tous les phénomènes que les sens peuvent lui fournir, et à les comparer ensemble. Bientôt l'émotion que produit sur *Antiochus* la présence de *Stratonice*, dissipe tous les doutes d'*Érasistrate*, et lui découvre la source véritable de la maladie.

La main de la belle *Stratonice* assura le salut du jeune prince, et confirma la juste célébrité du médecin philosophe.

Les principes du traitement sont dans ces cas faciles à saisir. On doit proposer l'union désirée quand elle est possible ; dans le cas contraire, l'éloignement de l'objet aimé, les voyages, tous les sujets de distraction ; quelquefois un nouvel amour ; l'on doit surtout défendre l'inaction physique et morale.

En effet rien n'est plus propre à dissiper l'hypocondrie érotique qu'une activité continuelle ; elle est donc bien juste cette allusion de la mythologie, qui nous représente la divinité de la chasse comme ennemie de l'amour. Mais cette passion peut contribuer elle-même à la guérison de certains malades ; ainsi, quand l'ennui du

célibat, quand un veuvage prématuré ont causé l'hypocondrie, un mariage assorti et conforme à nos désirs peut être alors très-favorable ; de plus dans beaucoup d'autres cas, on pourra également s'applaudir d'avoir inspiré ce sentiment; ne sera-t-il pas un excellent préservatif, ou le meilleur remède contre une foule de chagrins, tels qu'une humiliation, une offense non méritées, une injuste destitution, les mauvais procédés de l'amitié. Rappelons à ce sujet ce que dit *Montaigne* dans son style naïf : « Ayant besoin d'une » véhémente diversion, pour m'en distraire, je » me fis par art amoureux et par estude, à quoy » l'âge m'aydait : l'amour me soulagea, et re- » tira du mal qui m'estait causé par l'amitié ». (Tome III, liv. III, page 73.)

Combattez, s'il est possible, l'hypocondrie qui provient de méditations abstraites, de chagrins, etc., par une passion nouvelle : celle des voyages, de la chasse, la culture des beaux-arts, du dessin, de la musique. Dans d'autres cas, mettez en jeu les mobiles les plus puissans, intéressez l'amour-propre ou plutôt le sentiment de l'honneur; envoyez le médecin hypocondre pour arrêter les ravages d'une épidémie meurtrière ; confiez à un jeune compositeur la musique d'un poëme intéressant, à un artiste l'exécution d'un grand ouvrage, à un savant une entreprise scientifique importante, etc. ; présentez au courtisan

morose les appas de l'ambition; enfin, chargez l'avocat, en proie au même mal, d'une cause importante, de la défense d'un illustre accusé, vous ferez ainsi diversion à leurs idées maladives, à leurs craintes habituelles, et vous favoriserez leur rétablissement.

Tous les moyens de diversion sont éminemment utiles à cette classe de malades; mais ce n'est pas ordinairement un ou deux de ces moyens, une ou deux tentatives, qui peuvent rétablir de suite l'économie, c'est leur concours, leur continuité. Aussi voyons-nous chaque jour les meilleurs effets de la fréquentation des spectacles, des réunions nombreuses ou d'une société intime, des différens modes de récréation, des jeux de paume, de balle, de billard, des diverses occupations mécaniques, mis en pratique concurremment, et avec tenacité.

Le retour vers le pays natal, ou l'espérance seule de revoir la terre de prédilection, dissipera presque toujours les affections hypocondriaques, suites de la nostalgie.

Lorsqu'une autre maladie, par sa réaction sur notre moral, a entraîné l'hypocondrie, il faut combattre l'impression produite sur l'esprit du malade, et attaquer en même temps l'affection première, dont la guérison assurerait la fin de la vésanie.

La crainte peut concourir au traitement de

cette névrose : ainsi, quand les malades se refusent à suivre les conseils qu'on leur donne, et surtout à rompre des habitudes casanières, il faut les effrayer, mais avec mesure, non sur leur état présent, mais sur l'avenir, sur les malheurs auxquels ils s'exposent en n'adoptant pas un genre de vie plus actif. Peignez à leurs yeux, quelquefois même avec exagération, les dangers de l'inaction, qui a produit ou qui entretient le désordre; représentez-leur que l'affection dont ils gémissent est en grande partie le résultat de la vie sédentaire ; que le repos, comme l'excès de fatigue, amène du trouble dans l'économie, et que plus ils resteront inactifs, plus ils aggraveront leurs maux; prévenez-les enfin, qu'à la vérité leur maladie n'est pas inquiétante tant qu'elle reste simple, mais qu'une complication peut arriver, et que non-seulement leurs coutumes favorites n'y apporteront aucun obstacle, mais qu'au contraire elles la favoriseront.

Une femme de beaucoup d'esprit était affectée d'une hypocondrie dont le chagrin fut anciennement la source, et qui était entretenue principalement par un repos presque continu ; rien ne pouvait la déterminer à quitter le coin de son feu pendant neuf mois de l'année. Je cherchai à lui persuader que sa maladie était sans danger présent, mais que l'ancienneté et la continuité du désordre pouvait en occasionner de plus

graves, et que le meilleur moyen de les prévenir était l'adoption d'un genre de vie différent, les longues courses, les promenades variées ou un voyage : bientôt il fut moins difficile de la décider à sortir, et un mieux sensible s'annonça dès-lors.

La peur bien dirigée peut encore agir utilement, par un autre mode d'action. Quand la crainte d'une maladie devient prédominante chez un hypocondriaque, occupez-le d'un autre sujet d'effroi ; faites-lui le tableau d'une affection plus dangereuse encore, et annoncez-lui qu'à cette frayeur vous en ferez succéder à volonté une troisième, une quatrième, etc. En procédant ainsi, vous l'obligez indirectement à se convaincre ou à convenir, au moins tacitement, qu'il se tourmente, sinon sans raison, du moins sans mesure, et que son imagination lui exagère ses souffrances, et plus encore les dangers de sa situation. La crainte et la frayeur peuvent donc non-seulement être utiles, mais même, dans beaucoup de cas, opérer une action salutaire.

Le grand art consiste quelquefois à communiquer à l'imagination une impulsion favorable ; car alors l'imagination, comme la lance d'*Achille*, a seule le privilége de guérir les blessures qu'elle a faites.

En suivant une autre route on parvient également à diminuer les inquiétudes de ces malades : représentez-leur que des personnes atteintes de

la même maladie en ont cependant guéri parfaitement, et que d'autres, dont l'affection a été seulement modérée, ont néanmoins fourni une très-longue carrière. Non-seulement il faut les assurer et itérativement de cette vérité, mais on fera plus, on leur citera, nommera les individus, et il sera même très-utile de les mettre en rapports avec eux. Vous tendrez encore à écarter de leur esprit l'idée d'un mal irrémédiable, en leur faisant remarquer que l'exaltation générale de la sensibilité, et l'étonnante multiplicité de symptômes propres à leur vésanie, sont incompatibles avec une lésion organique, qui presque toujours masque ou dissipe tôt ou tard les symptômes sympathiques et locaux de la première.

Enfin on les rassurera encore en présentant à leur mémoire et leur rappelant fréquemment le pronostic de *Baglivi*. *Voyez* page 583.

J'ai engagé maintes fois ces malades à placer sur le manteau de leur cheminée cette sentence du célèbre praticien de Rome, et à échanger souvent les terreurs paniques qui les tourmentaient contre l'impression consolante qui résultait pour eux de cette lecture, et l'espoir dont elle leur retraçait constamment l'image.

Dans d'autres cas, pour agir plus efficacement sur l'imagination des hypocondres, il faut accorder quelque chose à leurs opinions, et même à

leurs erreurs, tout en combattant ces dernières : ainsi, convenez avec eux de cette vérité, à laquelle ils tiennent singulièrement, c'est qu'ils sont réellement malades ; mais tâchez aussi de leur démontrer qu'ils exagèrent quelquefois leurs souffrances, et presque toujours le péril qui peut en résulter. Dites-leur que les accidens dont ils se plaignent amèrement, et qui les tourmentent si cruellement, sont cependant de nature à céder aux médicamens les plus simples, à des habitudes actives, ou à un emploi plus raisonnable de leurs facultés mentales.

Par cette conduite, vous provoquerez leur confiance, et ils se persuaderont alors facilement que vous connaissez leur maladie, que vous la jugez bien ; et vous en préparez ainsi la guérison. Tandis qu'en agissant autrement, en leur disant constamment qu'ils sont malades imaginaires, et qu'ils ne souffrent pas, vous les révoltez, vous justifiez leur éloignement pour vos conseils, et leur versatilité ; ils se convaincront, et non sans quelque raison, que vous ne connaissez pas leur maladie. Du moins la jugerait-on mal, en la considérant comme une affection toujours idéale, chimérique, ou plutôt produite par la seule imagination.

Le médecin doit donc s'efforcer de gagner la confiance de ses malades : c'est en faisant naître ce sentiment qu'il pourra obtenir les guérisons

les plus étonnantes par les moyens les plus simples, souvent même par des médicamens sans action. Le succès dans ces cas est dû plutôt à l'impression produite sur l'imagination qu'à l'influence physique de la substance médicamenteuse. Nous avons vu dernièrement, aux consultations de l'Oratoire, un hypocondriaque qui nous déclara qu'il avait contracté une gonorrhée simple, pour laquelle il avait subi un traitement méthodique. Malgré les soins les mieux dirigés, et une guérison parfaite, cet homme devint sujet à une hypocondrie violente, qui fut en partie produite par l'idée qu'il avait encore le *sang gâté*. Nous feignîmes de partager son opinion, et nous lui ordonnâmes diverses préparations inertes, mais en apparence très-compliquées. Nous eûmes lieu de nous applaudir de ce stratagème, plus propre à réussir chez cet individu que tous les argumens de la meilleure logique.

On ne doit donc pas craindre de les tromper par une ruse innocente, et qui doit tourner à leur bénéfice. Tous les médecins ont eu maintes occasions de s'applaudir de pareils expédiens, inventés dans l'intérêt de l'humanité.

Il faut en outre déférer, dans quelques cas, à la confiance aveugle d'un malade pour tel ou tel médicament, pourvu toutefois que son action soit bénigne. On ne considère alors que l'effet moral, que l'influence exercée sur l'imagination.

Nous avons connu un hypocondre qui attribuait divers accidens imaginaires à des médicamens convenables, et qui se trouva mieux du moment qu'on lui prescrivit ceux dans lesquels il avait placé sa confiance. Si ceux-ci lui avaient été administrés à son insu, ils auraient eu le sort des remèdes précédens, et auraient pareillement échoué.

Quand un malade est tourmenté par des craintes continuelles, qu'il appréhende diverses maladies, enfin qu'il désespère de sa guérison, le médecin est placé entre deux écueils : en effet, si l'on abonde aveuglément dans son sens, on ajoute à son désespoir ; si au contraire on paraît regarder ses observations comme autant de fables, non-seulement on le laisse dans un état pénible; mais, ce qui est encore plus fâcheux, on le désole, et souvent on anéantit ses espérances.

Comment l'homme qui souffre, et dont les fonctions sont tellement dérangées, qu'il est obligé de s'imposer toutes sortes de privations, qu'il ne dort pas, et qu'il dépérit, pourrait-il attendre sa guérison d'un médecin qui refuse de le croire malade, et qui regarde son mal comme un simple jeu de son imagination.

Les médecins doivent au contraire se persuader que l'hypocondrie est une maladie véritable, et accueillir avec attention le récit des malades; qu'ils soient surtout bien convaincus que rien

n'est moins propre à calmer l'inquiétude d'un être souffrant que l'incrédulité présomptueuse. En exposant ces écueils, nous avons indiqué implicitement la conduite qu'il sied au médecin de tenir. Il faut, nous le répétons, qu'il s'attache à concilier l'opinion du malade avec la vérité, qu'il lui présente sa maladie comme une affection réelle, des plus pénibles, mais peu dangereuse, et très-souvent susceptible d'une guérison prochaine et durable : en consolant ainsi l'esprit, on imprime souvent à l'organisation physique une impulsion avantageuse. L'imagination n'étant plus aussi alarmée, l'hypocondre renaît à l'espérance, et ne tarde pas ordinairement à éprouver les bons effets de cette déférence.

Par cette condescendance raisonnable, si on ne guérit pas constamment, du moins on n'aggrave jamais le mal, et toujours on console, on soulage, et on soutient l'espoir des malades : c'est en outre un procédé sûr pour gagner et fixer leur confiance ; celle qu'ils ont dans l'homme qui les dirige entraîne une prévention favorable pour les conseils et les médicamens qu'il prescrit. Cette disposition morale, et la sécurité qui en émane, sont également capables des plus heureux effets.

Dans d'autres cas il faut suivre une route opposée; c'est ainsi qu'on a quelquefois excité avec avantage chez ces individus un mouvement de

colère; mais on ne doit risquer ces essais qu'avec la plus grande circonspection. Cependant, quand tous les efforts du médecin auront échoué, quand les exemples cités, les autorités rapportées, et les ressources du raisonnement n'auront nullement ébranlé un hypocondriaque en proie à des craintes exagérées ou chimériques, on peut alors démentir ce qu'il avance, et après avoir usé de douceur et de ménagement, mettre dans la discussion de la fermeté et de la vivacité: le malade s'emportera; mais le médecin, qui a conservé son sang-froid, profite quelquefois de l'exaltation qu'il lui a communiquée pour combattre avec plus d'avantages et avec succès les argumens ou les craintes de celui-ci, comme nous le verrons dans l'observation ci-jointe:

M. G**, âgé de trente-six ans, fut doué d'une bonne constitution, d'un tempérament nerveux et d'un caractère un peu susceptible; il reçut une éducation très-libérale, et se fit constamment remarquer par un jugement des plus sûrs, et une grande élévation de pensées. A vingt ans il s'adonne à l'étude de la médecine, et obtient des succès aussi nombreux qu'éclatans. Au milieu de ses cours, il eut une première atteinte d'hypocondrie, dont l'origine ne peut être attribuée qu'à des contentions d'esprit trop soutenues, et dont la durée ne fut pas fort longue. Il éprouva aussi, à quelque distance de là, des

douleurs rhumatismales très-vives et bien caractérisées.

Plus tard il partage son temps entre la pratique de son art et la continuation de ses travaux, auxquels il consacre cinq heures soir et matin. Dans le milieu de la journée il voit ses malades, et n'accorde au repos qu'un temps très-limité.

Durant trois années de ce genre de vie, il jouit d'une très-bonne santé ; l'exercice journalier, nécessité par les devoirs de son état, contrebalançait avec avantage les inconvéniens d'un travail de tête trop continu.

A vingt-huit ans, maître d'une fortune considérable, surtout comparativement au stricte nécessaire qui jusqu'alors avait été son partage, il renonce à sa profession, échange ses méditations et ses courses longues et occupées contre le repos, les habitudes tranquilles des riches, les soins ou plutôt les petits embarras domestiques. Bientôt sa santé s'altère, ses digestions ne s'exécutent plus aussi régulièrement, la sensibilité générale est singulièrement exaltée; mais le plus grand désordre, les phénomènes prédominans se manifestent vers la poitrine, et spécialement vers la région du cœur.

M. G** était tourmenté par la crainte d'une maladie organique, parce qu'un trouble sensible existait vers ce viscère; de plus, le pouls était serré, et souvent irrégulier. Telle était son exaltation

morale ou nerveuse, qu'il n'osait se coucher ni prendre d'alimens; il ne se risquait qu'en tremblant à boire un simple bouillon, parce qu'immédiatement après, ses anxiétés et ses souffrances augmentaient.

Il consulte un de nos confrères qui, sur la crainte d'une goutte vague ou remontée que témoigne le malade, lui fait appliquer le remède de *Pradier*. Ce moyen fut suivi du plus mauvais résultat, et dès-lors abandonné.

Deux autres médecins d'un mérite très-reconnu, sont appelés, et dans une consultation, décident l'application de dix sangsues au siége; cette opération diminua momentanément le désordre. Néanmoins, M. G** regretta qu'on n'eût pas pratiqué une saignée ou l'artériotomie; il eut également désiré qu'on lui appliquât cinq ou six moxas autour de la poitrine.

On prescrivit en outre des anti-spasmodiques, qu'on varia suivant les circonstances, et qui n'eurent aucun succès marqué. Ces deux médecins cherchèrent à rassurer l'esprit du malade; mais comme on le fait souvent en pareil cas, lorsqu'on partage les craintes. Pour nous, plus familiarisés peut-être avec les névroses, et nous appuyant plus sur le commémoratif que sur les accidens même de la maladie, qui étaient vraiment effrayans, nous nous crûmes fondés à soupçonner une affection nerveuse; soupçon qui nous fut en

partie inspiré par les renseignemens particuliers que nous communiqua madame G** ; ainsi, elle nous apprit que son mari, qui jadis faisait de longues courses, depuis quelque temps ne sortait presque jamais, qu'il se couchait de bonne heure et se levait très-tard ; qu'à la campagne, où il s'occupait beaucoup, il se portait toujours très-bien ; et qu'enfin autant il était dur à lui-même autrefois, autant il aimait actuellement tous les raffinemens du luxe et de la mollesse. Nous combattîmes pendant plusieurs jours les craintes du malade médecin ; dans nos discussions, nous apportions l'un et l'autre une certaine vivacité qui s'arrêtait tout près de l'aigreur ou plutôt d'un peu d'emportement.

Un jour je demandai à sa dame, si ces discussions ne fatiguaient pas notre malade, et si je ne devais pas en redouter les suites ; elle me répondit qu'il n'était jamais plus tranquille, ni plus long-temps tranquille qu'après s'être ainsi disputé ; je continuai donc mes visites, mes conseils, ou plutôt mes disputes. Bientôt une légère amélioration commence à s'annoncer. Sur ces entrefaites, j'engage M. G** à retourner aux champs et à y reprendre ses travaux manuels, ses habitudes actives. Un soir il en forme la résolution, s'occupe toute la nuit et les jours suivans des préparatifs de son départ, et dès-lors il renaît à la santé. Depuis quatre ans, M. G**, que

grand nombre de médecins connaissent très-bien, n'a pas éprouvé la moindre maladie.

Les preuves surabondent pour démontrer combien l'habitude des méditations profondes favorise le développement des affections hypocondriaques, et combien leur continuation est propre à perpétuer ces maladies ; mais l'expérience nous offre en même temps une consolation non moins certaine; en effet, le résultat de l'observation journalière nous atteste que la plupart des névroses provenant de cette cause ou s'affaiblissent ou se dissipent par un régime convenable, par un choix de médicamens appropriés, par la cessation des travaux du cabinet, enfin par l'exercice ou les voyages. Toutefois il ne faut pas croire que tous ces malades doivent entièrement renoncer à leurs études favorites ; il en est un petit nombre pour qui l'habitude du travail est indispensable, c'est l'interruption d'un travail trop prolongé ou continu, et non l'entier abandon de l'étude qu'il faut leur recommander.

Le travail, a dit *Hésiode*, est la sentinelle de la vertu ; nous ajouterons et de la santé. Le désœuvrement est une cause fréquente de cette maladie ; une vie active et bien remplie en sera souvent le meilleur préservatif, et le remède assuré. Ce conseil d'une occupation de l'esprit n'est point de notre part une contradiction, puisqu'on voit de ces malades qui ont un besoin presque irré-

sistible d'exercer leurs facultés intellectuelles, et pour qui une application exclusivement mécanique, ou des courses continuelles seraient insuffisantes. Il faut composer avec ces individus, leur permettre de se livrer à l'étude, mais exiger qu'ils compensent les réflexions du cabinet par l'exercice du corps, qui est le plus souvent indispensable et toujours utile. On évitera d'offrir à leurs méditations des objets abstraits, ou d'une conception difficile : l'étude de la géographie, de la botanique, la culture des beaux-arts, la lecture des comédies de *Molière*, *Regnard*, *Destouches*, et même celles de plusieurs de nos contemporains; les voyages du capitaine *Cook*, ceux du jeune *Anacharsis*, etc., offriront un aliment facile et agréable à leur imagination.

Mais de plus l'exercice modéré de nos fonctions intellectuelles a été dès long-temps considéré comme une consolation réelle contre les peines de l'âme : « C'est vous, disait Ovide à sa muse, » qui seule faites ma consolation, vous qui calmez » mes inquiétudes, vous qui êtes l'unique remède » à mes maux :

Tu solatia præbes, tu curæ
Requies, tu medicina venis.
OVID., *lib.* IV, *Trist. eleg.*

C'est ainsi qu'un de nos philosophes prétendait qu'il ne connaissait pas de chagrins qu'une heure de travail n'affaiblît ou ne dissipât.

Un jeune homme devenu hypocondre par excès de méditations, était grand amateur de peinture ; je résolus de mettre à profit cette disposition, et l'engageai à suivre les travaux d'un de ses amis, qui copiait plusieurs des beaux tableaux du Muséum. Chaque jour notre malade traversait tout Paris, afin d'assister au travail du peintre. Ces longues promenades, cette étude interrompue fréquemment par des discussions relatives à cet art favori, secondées par queques autres moyens, ont d'abord amené dans l'état de cet individu une très grande amélioration, et par suite une guérison complète.

Outre ces moyens moraux, il existe des agens mécaniques dont l'action est remarquable au moral, et qui sont quelquefois mis à contribution par le médecin. Voyons à ce sujet l'influence de la musique, qui, dans le traitement des maladies nerveuses, a produit de bons effets; cet agent est surtout applicable aux cas de mélancolie et d'aliénations mentales. Bien que les affections hypocondriaques n'en réclament pas l'emploi aussi fréquemment, elles peuvent néanmoins en éprouver une influence favorable. On connaît les effets surprenans de la musique grecque de la lyre du centaure *Chiron*, dont les heureux accords calmaient la colère d'*Achille :*

Puerum citharâ perfecit Achillem,
Atque animos molli contudit arte feros.

Les résultats non moins surprenans de la lyre de *Timothée* sur *Alexandre*, de la harpe de *David* sur *Saül*, sont des exemples célèbres, et qui suffisent pour autoriser le recours à ce procédé dans la curation de cette névrose.

Mais quel est le genre de musique le plus convenable, c'est celle qui porte à l'âme des impressions promptes, légères et agréables, telle que la musique guerrière, les airs dansans et villageois, ou ceux de nos opéra-comiques. Toutefois elle doit aussi être relative, ainsi que le genre d'instrument, à la susceptibilité particulière des individus, ou même à leur goût.

M. D** fut long temps hypocondre et goutteux au plus haut degré; néanmoins il se traînait tous les jours à l'Opéra, qu'il aimait passionément. Tel était sur son organisation l'empire de la musique, qu'après le spectacle, il s'en revenait leste et dispos, et d'autant mieux portant, que la musique l'avait ému plus vivement.

Terminons par un dernier exemple. Philippe V était tombé dans une espèce de mélancolie hypocondriaque, qui le rendait inhabile à toute espèce de travail. La reine, après avoir en vain fait employer toute sorte de moyens pour le guérir, résolut d'essayer l'empire parfois si puissant de la musique. Elle engagea *Farinelli* à chanter, dans un appartement qui joignait celui du roi, les plus beaux et les plus touchans de

ses airs. Le monarque parut d'abord surpris, et bientôt ému : à la fin du deuxième air il fit entrer le virtuose, qu'il accabla de caresses et de complimens. Celui-ci chanta un troisième morceau, dans lequel il se surpassa. Le prince, transporté, lui permit de demander la récompense qu'il voudrait.

Farinelli, qui était prévenu, pria seulement Sa Majesté de se faire raser et habiller, ce qu'elle n'avait pas fait depuis long-temps, et de reparaître au conseil. Depuis cette époque, la maladie du roi diminua sensiblement, et le virtuose eut l'honneur de cette guérison.

Nous bornons ici l'exposé des avantages que nous offrent les moyens moraux appliqués à la cure de cette affection, et qui complète la thérapeutique générale de l'hypocondrie; cependant l'étonnante multiplicité des symptômes locaux et sympathiques de cette névrose, et l'intensité à laquelle ils parviennent quelquefois, exigent que nous leur consacrions un examen particulier, auquel nous ferons succéder quelques conseils relatifs aux maladies qui s'associent le plus fréquemment à l'hypocondrie.

CINQUIÈME SECTION.

Traitement des Symptômes.

Nous avons à tracer maintenant la conduite du médecin, lorsqu'il existera quelque phénomène

prédominant : or l'on conçoit facilement qu'une maladie aussi fréquente, dont la durée est quelquefois si longue, dont les nuances et les variétés sont si nombreuses, et les rapports sympathiques si multipliés, doit souvent présenter des symptômes ou accidens capables d'aggraver, d'une manière plus ou moins fâcheuse, l'état physique et moral de ces malades.

La plupart des symptômes considérés en masse ne méritent ni une attention particulière, ni un traitement spécial ; ils se dissipent ordinairement d'eux mêmes, à mesure que le traitement général réussit, et que l'affection essentielle avance vers sa guérison ; toutefois il s'en rencontre souvent qui, par leur nature, leur influence, ou les résultats dont ils sont susceptibles, exigent des soins appropriés et des médicamens spéciaux. Cette thérapeutique particulière forme ce qu'on nomme la médecine du symptôme ; associée et subordonnée au traitement général de la maladie, elle constitue un des attributs du bon praticien ; mais appliquée exclusivement au lit des malades, elle ne peut former de grands maîtres, ni donner des résultats bien favorables. Si cette méthode a compté parmi ses zélateurs quelques médecins distingués, loin d'avoir contribué à leurs succès, elle n'a pu, au contraire, que les arrêter dans une foule de circonstances ; et les partisans de la médecine symptomatique n'auraient presque

jamais réussi, s'ils n'avaient, tout en se persuadant suivre leur marche empirique, le plus souvent combattu la maladie elle-même, et non chacun de ses élémens.

En effet quel succès peut-on espérer de ce traitement partiel, de cette médecine du symptôme, qui ne s'élève presque jamais à l'idée totale de la maladie, si ce n'est parfois un soulagement momentané; et ne devra-t-on pas toujours craindre que le mal ne fasse de nouveaux progrès. Il vaut autant ne pas attaquer l'hydre que d'en abattre successivement une tête, s'il s'en reproduit une autre immédiatement après :

Cave ne, inter ramorum excisionem,
Crescat truncus.
BENET., *Theatr. tabidorum.*

En effet, bientôt les accidens reprennent leur intensité première, si l'on ne se hâte de soustraire les malades à l'empire des causes, et si l'on ne s'efforce de combattre simultanément tous les élémens de la maladie : *Ridenda verbo et damnanda versipellis illa medicina, quæ mox capiti, mox pectori, mox renibus aut alvo medens, non modò nihil medetur, sed plurimùm nocet.* (Febris Lausannensis, TISSOT.)

Si donc il est important que le médecin subordonne cette curation partielle au traitement général de la maladie essentielle, il est cependant

aussi de son devoir de s'opposer aux symptômes les plus urgens.

Suivons dans un certain ordre ces divers accidens, et voyons d'abord ceux qui émanent plus directement de la nature même de cette névrose.

Lorsque la sensibilité des organes situés dans l'épigastre et les hypocondres acquiert un trop grand développement, on cherche à diminuer cette exaltation locale par les adoucissans, les boissons délayantes ou anti-spasmodiques, les potions calmantes, les bains, les cataplasmes opiacés, les emplâtres analogues, les linimens anodins, etc. Quand il ne coexiste pas de réaction générale, de pléthore sanguine, et quand ces premiers moyens ne répondent pas à l'attente du médecin, il peut administrer alors, mais avec modération, les toniques, comme deux ou trois onces de vin de Malaga ou de Lunel. Plus tard, on établit des irritations dans le voisinage ou sur les extrémités, afin de déplacer celle qui assiége des organes plus importans. Il n'est pas d'un moindre intérêt d'arrêter le vomissement nerveux qui survient chez quelques malades, et qui, par le fait seul de ses retours, pourrait altérer le tissu même de l'estomac. Pour le dissiper, on emploie les calmans ou les toniques suivant qu'il est le résultat d'une irritation vive ou de la faiblesse. Les narcotiques à dose modérée offrent très-souvent un moyen salutaire, non-seulement

contre la maladie elle-même toutes les fois qu'une sensibilité trop vive l'a déterminée ou l'entretient; mais encore contre beaucoup de symptômes isolés de l'hypocondrie, et surtout contre la cardialgie : c'est ainsi qu'on prescrit fréquemment l'opium gommeux, le sirop diacode, le laudanum, les gouttes noires, ou de *Rousseau*. La thériaque est tout à la fois un narcotique et un fortifiant; un emplâtre préparé avec cette substance, et mis sur la région épigastrique, a dans plusieurs occasions dissipé au bout de quelques jours une cardialgie très-ancienne.

La potion anti-vomitive de *Rivière* a obtenu des succès marqués lorsqu'il a fallu enchaîner les mouvemens vicieux de l'estomac, ou faire cesser son mouvement anti-péristaltique. C'est une composition éminemment utile dans une infinité d'occasions, et principalement contre les différens vomissemens et contre le hoquet spasmodique; mais dont la préparation a subi plusieurs modifications. Je la prescris ordinairement de la manière suivante : dans une fiole n° 1, on verse eau distillée et sirop d'althæa, āā ℥ j; puis on y ajoute carbonate de potasse ℈ j. Dans une autre, n° 2, on place suc de citron ℥ j, eau distillée et sirop ℥ ß. On fait prendre la fiole n° 1, et de suite celle n° 2.

On a encore conseillé contre le vomissement la potion dite de *Boërrhaave*, qui est plus dé-

sagréable, et ne réussit pas aussi fréquemment. Quand ces moyens sont insuffisans, on a recours à la limonade frappée de glace, à l'eau de menthe, aux amers, comme le vin d'absinthe ou de quinquina, au café, à l'extrait de quinquina uni à la rhubarbe, surtout dans les cas d'atonie; enfin, si le vomissement résiste à ces différens efforts, on applique sur l'épigastre un vésicatoire, qu'on transporte plus tard au bras, afin de s'opposer aux retours de ce phénomène.

Le hoquet est un accident nerveux peu inquiétant, quand il n'est qu'un symptôme de l'hypocondrie; mais lorsqu'il constitue une affection idiopathique, c'est une maladie très-redoutable. Dans le premier cas, il cède souvent à un verre de vin de Malaga. Je l'ai arrêté maintefois chez plusieurs hypocondriaques par ce seul moyen. On le fait encore cesser dans quelques cas en excitant fortement l'attention, en causant une surprise, une frayeur. Quand il résiste aux procédés les plus simples, il faut avoir recours aux potions calmantes et toniques, aux boissons à la glace, au musc, à l'opium, à la potion de *Rivière*, qui a dissipé chez un de mes malades un hoquet très-rebelle. Plus tard, on emploie les vésicatoires sur l'épigastre, et surtout les lavemens purgatifs les plus forts. Deux fois je suis parvenu à dissiper un hoquet opiniâtre, en excitant fortement les évacuations intestinales. Un de mes confrères a

réussi, dans un cas qui semblait désespéré, par l'application du moxa sur la région de l'estomac.

On oppose aux borborygmes qui fatiguent presque toujours ces malades, le cachou, le quinquina, le sirop d'éther, les huiles volatiles de semences de pimprenelle, d'anis, d'aneth, de fenouil, de coriandre ; les infusions de camomille, de menthe, de feuilles d'oranger, et les vins amers, de quinquina, etc. Quelques malades sont tourmentés par des rots ou rapports bruyans dont la sortie sonore est fort désagréable. *Zacutus Lusitanus* en cite un exemple (*Prax. med.*) ; la maladie fut long-temps rebelle, et céda à ℊ iv d'ambre et ʒ ij de vin de Falerne, pris tous les matins à jeun pendant un an. Les glaires, les mucosités, les aigreurs sont combattues avec succès par la magnésie et la rhubarbe, le cachou, la cannelle, ou par les préparations calcaires, à la dose d'un demi-scrupule avant chaque repas.

Le trop long séjour dans les intestins du résidu des alimens, ou la présence de sucs dégénérés et d'une bile irritante, etc., peuvent causer des coliques très-vives, et occasionner beaucoup d'inquiétude au malade ; il est donc urgent dans quelques cas de remédier à ce symptôme ; mais avant de combattre la constipation il faut en rechercher la cause : si elle provient de l'inaction, on recommandera l'exercice au dehors, ou une occupation active dans la maison ; lorsqu'elle est

la conséquence d'un état de spasme du tube intestinal, il faut prescrire les moyens les plus doux, l'usage du raisin, des pruneaux, des figues, des pommes cuites, du pain d'épice, de l'oseille; plus tard on passe à de légers laxatifs, etc. Dans certains cas d'atonie, on s'est bien trouvé de la rhubarbe, du quinquina, etc., et même de l'ipécacuanha, prescrits en infusion. On doit en général préférer aux purgatifs en boissons les lavemens de même nature, parce qu'ils n'irritent que les gros intestins, et n'agissent sur les intestins grêles que par sympathie; il en résulte souvent des évacuations suffisantes, et une irritation ou une débilité moindres dans le canal intestinal.

Contre la diarrhée on dirige les boissons gommeuses, légèrement aromatisées; s'il n'existe aucun état fébrile, on passe aux astringens les plus doux: un état de faiblesse très-avancé, mais exempt de fièvre, fait recommander des moyens plus actifs, comme la thériaque, le diascordium, l'écorce de simarouba, les narcotiques, et même les vésicatoires volans.

Les vers que l'on rencontre souvent chez les individus dont les organes de la digestion sont affaiblis, peuvent produire l'hypocondrie, ou au moins contribuer à son développement, ou la compliquer. Si le malade est affecté du *tœnia*, on le traite par les moyens appropriés : l'éther à la dose d'un ou plusieurs gros, suivant le profes-

seur *Bourdier*, est un des plus efficaces : celui de Me *Noufler* n'occupe plus que le second rang. On oppose en outre les anthelmintiques ordinaires aux ascarides, aux lombricoïdes, etc.; et quand le ver, quel qu'il soit, a été évacué, pour prévenir le retour de la même affection, on continue pendant quelque temps l'usage du quinquina, de la gentiane, ou du vin d'absinthe, de la mousse de Corse; quelquefois on administre de temps à autre le jalap, le mercure doux, ou la poudre de semen contra.

Les hémorrhoïdes nécessitent quelques considérations particulières ; elles sont sèches ou fluentes : dans ce dernier cas, elles amènent souvent une amélioration dans l'état du malade, ou même sa guérison ; dans le premier, elles peuvent indiquer la nécessité d'appliquer des sangsues. Lorsqu'elles sont très-grosses, douloureuses et squirrheuses, on est souvent obligé de les emporter; mais il faut avoir soin d'en laisser au moins une, celle dont l'endurcissement est moins avancé, et qui fournit un écoulement plus abondant.

Lorsqu'il existe une gêne habituelle de la respiration, on s'efforce de reconnaître si elle ne dépend pas de quelques causes particulières, et s'il en est ainsi, on les combat plutôt que leurs résultats; mais si la dyspnée tient à l'exaltation de la sensibilité générale, à l'état nerveux du malade, on y oppose les infusions de menthe,

l'eau de fleurs d'orange, le sirop d'éther, l'inspiration de l'éther, et surtout l'exposition à l'air extérieur, et, autant que possible, dans une température douce ou au milieu de la végétation; enfin un exercice modéré. Quand l'oppression provient de la surabondance sanguine, on y remédie par des boissons adoucissantes, ou légèrement acides, et par la saignée : très-souvent un exutoire établi au bras est le remède le plus efficace contre la dyspnée habituelle.

Lorsque la toux est fréquente, qu'elle subsiste depuis plusieurs jours, on cherche à la dissiper en écartant les causes qui l'ont provoquée, ou qui l'entretiennent, et par le régime, une température chaude, les boissons pectorales, les potions incisives, excitantes, ou rendues narcotiques. On unit alors, avec avantage, l'extrait gommeux d'opium au kermès. S'il existe une douleur fixe vers un point de la poitrine, on a recours aux sangsues appliquées localement. Dans d'autres cas on dirige, dans le même but, les rubéfians, le cataplasme de farine de moutarde délayée avec du vinaigre, les emplâtres fondans, ou même le vésicatoire.

Les palpitations nerveuses cèdent souvent à l'influence des mêmes procédés modifiés, à l'eau distillée de laurier cerise, à la teinture de castor, ou de corne de cerf succinée, à l'éther phosphoré, ou à la teinture éthérée de digitale pour-

prée, à l'inspiration de l'éther, de l'acide acétique, à celle du vinaigre et du sucre en vapeurs; on emploie d'autres fois contre ce phénomène les frictions éthérées et narcotiques sur la région précordiale, les plaques aimantées, les topiques réfrigérans, et surtout les saignées, quand il y a pléthore générale ou locale, habituelle ou accidentelle, ainsi que les sangsues qu'on applique, suivant les circonstances, à l'anus, à la vulve, ou même sur la région du cœur. Les irritations établies aux extrémités sont, dans quelques cas, aussi très-efficaces.

On observe encore chez certains hypocondriaques des crampes, soit vers la région du cœur, soit aux bras, ou dans d'autres parties; parmi les topiques préconisés contre cet accident, on distingue les bains tièdes, l'application des substances aimantées, les linimens éthérés, et même opiacés quand il y a douleurs; mais lorsque ces crampes dépendent d'une affection, ou même d'une lésion de l'origine des nerfs, il faut recourir à des moyens plus actifs, aux bains de vapeurs, aux vésicatoires, et principalement aux moxas appliqués sur le siége de la maladie.

Les syncopes sont assez rares dans ce genre d'affection; cependant il faut quelquefois les prévenir, et surtout les combattre par les excitans des sens, les odeurs spiritueuses, l'acide acétique, l'eau de Cologne, de mélisse, l'éther, l'ammonia-

que. On fait prendre quelques gouttes de ces substances étendues convenablement, ou du vin, du bouillon; on excite l'action cutanée par les frictions, et surtout le jeu des poumons par l'inspiration d'un air frais. Plus tard, on fortifie le malade s'il est débile; enfin si les accidens sont produits par la pléthore sanguine, la surcharge des premières voies, on y oppose les méthodes de curation indiquées en pareil cas.

Plusieurs malades éprouvent dans la tête, et surtout au moment où ils viennent de s'endormir, une ou deux détonations analogues à un coup de pistolet. Si cet accident se reproduisait d'une manière réglée, à une heure précise, on accélérerait ou on retarderait celle du sommeil; on pourrait encore essayer de prévenir ce symptôme désagréable en amenant le repos par excès de fatigue, ou à la suite d'une longue promenade. Du reste ce phénomène n'est point inquiétant, et se dissipera de lui-même à mesure qu'on réussira dans le traitement général de la maladie.

Contre les vertiges, les éblouissemens, ce vague de la tête, désigné sous le nom d'*ivresse hypocondriaque*, nous recommanderons les frictions, sur le front et la tête, pratiquées soir et matin avec l'alcool camphré, l'eau de Cologne, de mélisse, le baume de *Fioraventi*, de muscade, l'essence de girofle, la teinture de cannelle, etc.

Les tremblemens dépendent le plus souvent d'une origine complexe, d'un état d'irritation nerveuse, ou d'exaltation de la sensibilité organique, à laquelle se joint une atonie partielle ou générale : on les affaiblit ordinairement par l'union, à l'intérieur et à l'extérieur, des opiacés et des fortifians.

Si les tintemens et les bourdonnemens d'oreille sont assez fatigans pour amener l'insomnie, on peut essayer le suc d'oignon blanc, dont on verse tous les jours trois ou quatre gouttes dans l'oreille. Des médecins ont retiré de bons effets d'un peu de coton trempé dans la teinture de quinquina et de cannelle, dans celle de castoréum ou le laudanum, et introduit dans le conduit auditif. Quelques malades en ont été débarrassés, en plaçant sous leur oreiller une montre dont le mouvement était dur et bruyant; la sensation la plus forte absorbait la plus faible : enfin, d'autres fois on a opposé avec succès, à ces phénomènes devenus très-incommodes, les vésicatoires, et même le cautère actuel sur l'apophyse mastoïde, ou derrière la nuque.

On sait que le sommeil est indispensable à l'homme, et qu'il est le résultat de la fatigue des organes de la locomotion et des facultés intellectuelles. Lorsqu'un malade est privé de ce repos, il faut lui conseiller l'exercice des agens locomoteurs et de l'entendement ; si l'insomnie persiste

on a recours aux narcotiques administrés à faible dose, ou plutôt à doses progressives, qu'on diminue par la suite, à mesure que l'individu se livre à l'exercice, ou qu'il a recouvré le sommeil. Sans doute il ne faut point abuser des substances opiacées, mais dans tous les cas, il vaut mieux procurer aux malades un sommeil artificiel que de les abandonner à une insomnie bien plus capable d'aggraver leurs maux; on doit d'autant moins y répugner qu'il suffit le plus ordinairement de prescrire l'opium pendant un petit nombre de jours, pour ramener l'habitude du calme.

Il existe après le repas, dans certaines hypocondries, une propension très-pénible au sommeil; elle résulte du peu de repos que prennent ces personnes pendant la nuit, ou dépend de toute autre cause, soit de l'état nerveux, de l'atonie, d'une disposition habituelle, ou d'un état de pléthore sanguine. Dans le premier cas, il suffira d'assurer le sommeil; dans le second, on y remédiera par la saignée, ou par l'application des sangsues à l'anus, s'il y a pléthore; on détruira l'effet de l'habitude par l'exercice ou par l'impression de la musique, qui facilite souvent la digestion. Si la somnolence tenait à un état nerveux ou atonique, on y opposerait soit le traitement même de la maladie, soit les calmans ou les excitans, comme le café, si la coutume n'en existait pas. On pourrait encore dissi-

per cette propension au sommeil par la promenade à l'issue du dîner, ou par un exercice tel que celui du jeu de paume, du volant ou du billard, et surtout par l'équitation.

A la douleur de tête habituelle et nerveuse on oppose les sternutatoires, l'usage intérieur des anti-spasmodiques, les pédiluves; les sangsues, s'il coexiste un état pléthorique.

Quand l'exaltation mentale prédomine et fait craindre la manie; quand ces malades s'abandonnent à des frayeurs paniques, ou à une crainte unique, et qui avoisine la mélancolie ; il faut multiplier les efforts et les soins, opposer le calme de la raison à leur exagération, à leurs craintes; enfin les rassurer du mieux possible, en variant les ressources morales, les réflexions rassurantes, et les moyens de diversion.

Telles sont les principales considérations que nous semblent exiger les symptômes les plus marquans de l'affection hypocondriaque; il nous reste à examiner quelles modifications peuvent apporter dans le traitement de cette névrose les maladies qui la compliquent le plus fréquemment.

SIXIÈME SECTION.

Traitement des Complications.

Nous avons remarqué déjà l'hystérie et la mélancolie parmi les complications dont la nature

se rapproche plus ou moins de celle propre à l'affection hypocondriaque.

Le traitement de l'hypocondrie compliquée avec l'hystérie se déduit de la combinaison des moyens que nous avons indiqués, en exposant l'histoire de l'une et l'autre affection. Le mariage, dans ce cas, fixera le plus souvent un terme prochain aux accidens de l'une et l'autre vésanie. Relatons ici une observation d'*Hoffmann :* Une femme âgée de trente ans, très-sensible, irritable, et née de parens mélancoliques, vécut sans progéniture, et fut très-affligée de la mort inopinée de son mari ; il s'ensuivit la suppression des règles, des anxiétés, l'insomnie, le dégoût des alimens, et une sorte de délire. Bientôt mouvemens convulsifs de la figure, puis convulsions violentes, qui ne furent dissipées ni par la saignée, ni par aucun autre moyen. Elles revinrent vers l'époque des règles, avec une intensité voisine de la fureur. On employa les bains, les acidules; elle voyagea, consulta plusieurs médecins, et n'obtint qu'un peu de soulagement : enfin elle se remaria, et fut dès-lors entièrement guérie. Cette affection est intitulée *épilepsie ;* mais pour nous, c'est une hypocondrie compliquée d'une hystérie *épileptiforme*. (Obs. 9, t. III, *de Epil.*)

Dans les hypocondries mélancoliques et maniaques, les symptômes du désordre de la digestion sont masqués, et quelquefois suspendus, par

suite de l'excitation cérébrale. Il faut s'occuper spécialement des mesures propres à arrêter ou à dissiper les progrès du désordre mental.

Le traitement des aliénations ne peut être indiqué que d'une manière générale et peu précise : il doit varier suivant l'âge du malade, son sexe, son tempérament, ses habitudes, sa profession, le pays qu'il habite, et surtout suivant la cause physique ou morale qui a produit le désordre, suivant l'espèce particulière d'aliénation, et son caractère avec atonie ou avec excitation des forces vitales, etc.

Les principales ressources de la médecine contre ce genre d'affections sont les saignées générales ou locales, et proportionnées à l'état des forces ; les évacuans, les boissons rafraîchissantes, adoucissantes, les anti-spasmodiques, quelquefois les médicamens toniques, les applications réfrigérantes sur la tête, les rubéfians aux extrémités inférieures, les bains tièdes, l'exercice, les promenades champêtres, les soins du jardinage, ou une occupation mécanique, tous les agens propres à faire diversion, à dissiper les chagrins ; enfin, une bonne direction donnée aux facultés morales et intellectuelles.

Le succès de ces moyens est d'autant mieux assuré que l'aliénation est récente, accidentelle, et non héréditaire, que la cause est amovible, et peu susceptible de reparaître, que le sujet est jeune

et vigoureux. Quand l'affection du cerveau paraît sympathique et non essentielle, les chances de réussite sont prédominantes ; l'espoir de la guérison est surtout fondé lorsque l'aliénation dépend de la suppression d'une hémorrhagie qu'on peut aisément rétablir, etc.

Au nombre des complications les plus ordinaires de l'hypocondrie, et qui en sont une sorte de conséquence, nous avons noté les phlegmasies abdominales aiguës et chroniques, et les altérations organiques des viscères de l'abdomen : on reconnaît leur présence aux symptômes qui leur sont propres, et dont nous avons fait déjà mention en traitant des complications, pag. 448, etc. Aux phlegmasies intestinales aiguës il faut opposer le repos, la diète la plus sévère, les boissons adoucissantes et mucilagineuses, les lavemens, les demi-lavemens, les fomentations et les cataplasmes de même nature, quelquefois les bains tièdes entiers ou de siége, les saignées générales ou locales proportionnées à l'intensité des accidens ; et quand l'excitation est affaiblie, les irritations ou vésicatoires dans le voisinage, aux cuisses, aux jambes : rarement sur l'abdomen. Les vésicatoires sont des phlegmasies cutanées qui tendent à faire cesser les inflammations intestinales, etc. On les préparera, dans ces cas surtout, de manière à ce qu'ils n'exercent aucune influence sur les organes urinaires et géni-

taux (1). Ils seront entretenus quelque temps et pansés mollement.

Le traitement des inflammations intestinales chroniques doit être basé d'après les mêmes principes : on peut, à la vérité, être un peu moins sévère sur le régime; mais il convient encore de ne permettre que les alimens les plus légers, en très-petite quantité, et avec beaucoup de précaution. On devra, dans l'un et l'autre cas, bien prendre garde aux récidives, qui sont si fréquentes et si redoutables; et ne s'occuper du

---

(1) Presque tous les pharmaciens de Paris tiennent maintenant des vésicatoires dits *anglais*, ou par incorporation, et qui mettent les malades à l'abri de ces inconvéniens. Je joins ici une des formules qu'on peut employer dans leur préparation, renvoyant, pour plus de détails, au Mémoire que j'ai fait insérer dans le *Journal général de Médecine*, tom. 50, page 248.

℞	Poix de Bourgogne.....	℥ j
	Résine.....	ʒ iij
	Cire jaune.....	℥ j ʒ v
	Térébentine.....	℥ ß
	Onguent basilicum.....	℥ ij
	Cantharid. porphyr.....	℥ ij
	Huile de lavande.....	q. s.

Il convient aussi d'employer une pommade *sans cantharides*, car celle qu'on trouve dans la plupart des pharmacies, sous le nom de *pommade de Garou*, contient une certaine quantité de ces insectes.

traitement de l'hypocondrie qu'après l'entière et parfaite guérison de la phlegmasie.

Dans les altérations organiques de l'abdomen, comme dans celles des autres viscères, la médecine peut revendiquer quelques succès, quand le désordre n'est qu'imminent ou peu avancé; mais lorsque le mal a jeté des racines profondes, ou qu'il mine l'économie depuis long-temps, l'art reconnaît les limites qui lui sont opposées, et ne peut les franchir; le médecin est réduit à pallier les accidens, à dissiper, ou au moins à diminuer les souffrances, à tromper, à consoler l'esprit de ces malades; enfin à prolonger et à adoucir leur existence. Heureusement le terme qui doit attester l'impuissance des efforts de la science est souvent ignoré, et quelquefois très-éloigné.

Dans les circonstances favorables, mais trop rares, notre seul but est d'enrayer les progrès du mal, en écartant les causes physiques et morales qui le favoriseraient, en prescrivant le repos, une nourriture réparatrice, mais non excitante, et à dose très-modérée; les bouillies, avec les différentes farines de froment, de maïs, le gruau ou l'avoine, le salep, le vermicel, la semouille, etc., faites très-claires, avec addition d'un peu de beurre ou de sucre, enfin la diète lactée. On y joint en outre les boissons adoucissantes et mucilagineuses, les lavemens et demi-lavemens, les fomentations et les cataplasmes de

même nature, ou composés avec les feuilles de ciguë et de morelle, etc.; les emplâtres fondans, de ciguë, d'opium, de camphre; les bols de savon, d'extrait de ciguë et d'opium gommeux. Les potions anti-spasmodiques et légèrement narcotiques, celles de *Rivière* ou de *Boerhaave*, etc., sont souvent très-efficaces, ainsi que les bains tièdes, les exutoires et les vésicatoires placés dans le voisinage, et parfois sur l'abdomen. Rarement prescrit-on les saignées ou les sangsues, sinon dès le principe, quelquefois les sucs d'herbes, et spécialement dans les lésions du foie, de la vésicule, du pancréas et de la rate. Si on veut solliciter les évacuations alvines, on a recours aux purgatifs les plus doux, et de préférence en lavemens ou en frictions à la partie interne des cuisses. Mais le médecin laissera toujours luire aux yeux du malade quelques rayons d'espérance; il le consolera, et recommandera les précautions hygiéniques, la respiration d'un bon air, la tranquillité d'âme, enfin les affections douces.

Il est très-ordinaire de rencontrer des personnes du sexe qui, vers la cessation des règles, éprouvent une foule d'accidens dépendant de l'époque critique imminente, présente ou passée : dans ces cas de complication, les saignées au bras ou au pied, et l'application des sangsues à l'anus, sont susceptibles d'un effet très-utile, quand surtout leur emploi est bien motivé.

Tantôt les femmes éprouvent des chaleurs très-incommodes, des maux de tête violens, de la somnolence, des étourdissemens, des palpitations, une forte gêne de la respiration; tantôt elles sont affectées d'embarras dans le système veineux abdominal, d'engorgemens du foie ou de la rate, et d'hémorrhagies supplémentaires du nez, des poumons ou de l'estomac, qui ajoutent encore à l'intensité des symptômes nerveux propres à l'hypocondrie.

Ces accidens disparaissent ordinairement quand on enlève la cause qui les occasionne, lorsqu'on diminue la surabondance du sang par l'un des moyens que nous avons indiqués.

On peut rencontrer le même désordre, mais plus rarement, chez les hommes, à la suite d'un flux hémorrhoïdal supprimé, ou quand la nature fait effort pour établir cette hémorrhagie. L'indication dans ce cas est évidente, et quelques sangsues appliquées au siége sont presque toujours d'une très-grande efficacité.

Quand à la maladie nerveuse il se joint une disposition dartreuse ou des dartres véritables, le traitement est difficile, et nécessairement plus long que dans un cas simple.

Il faut alors prendre en considération les deux affections, et ne choisir que des médicamens qui conviennent à l'une et à l'autre, afin de les traiter simultanément. Une macération légère de quin-

quina avec du lait et addition de gomme arabique, de sucre ou de sirop, conviendrait assez bien; on y joint ordinairement le régime végétal, l'usage du lait, les sucs d'herbes, le cachou, la rhubarbe, les sirops anti-scorbutique, de fumeterre, de chicorée, de quinquina, les pastilles soufrées, les décoctions amères, le calomel; à l'intérieur et en bains, les eaux sulfureuses, etc. On a recours quelquefois aussi à l'application des exutoires. Si cependant l'on pouvait concevoir des inquiétudes sur les résultats d'une de ces maladies, on choisirait alors les moyens les plus efficaces pour arrêter les progrès du plus grand mal.

Les affections siphilitiques peuvent coexister avec l'hypocondrie : elles la modifieront, l'aggraveront même, ou n'exerceront sur cette névrose aucune influence. On doit, dans tous les cas, traiter d'abord la maladie dont les progrès sont parfois très-dangereux; mais ce traitement, surtout en hiver, où le malade est obligé à une vie sédentaire, contrarie singulièrement la cure de la vésanie. Si cependant la débilité était grande, les accidens nerveux très-prononcés, et la siphilis stationnaire, il serait préférable d'en ajourner le traitement jusqu'après la guérison de la névrose, et d'attendre le retour des forces.

Un de mes collègues m'a rapporté l'observation d'un homme fort et robuste, chez lequel

l'hypocondrie paraît avoir été déterminée et entretenue par une affection vénérienne masquée : l'emploi des spécifiques fit disparaître l'un et l'autre désordres. Il faut alors consulter, pour le choix de l'agent anti-siphilitique, la disposition du malade, afin de ne pas fatiguer les organes de la digestion, déjà très-affaiblis, ou pour ne pas exalter davantage la sensibilité nerveuse : les frictions méritent, dans ces cas surtout, la préférence. On y joint les sudorifiques très-rapprochés, et on y associe avec avantage les bains tièdes, les anti-spasmodiques, et l'extrait gommeux thébaïque à dose convenable.

Quand l'hypocondrie vient se joindre aux affections goutteuses, ou quand celles-ci sont les dernières en date, le traitement n'est pas pour cette raison très-différent. *Barthez* rapporte qu'il est divers symptômes nerveux et mélancoliques (ou hypocondriaques), qui surviennent dans la goutte chronique des organes digestifs : dans ces cas, dit-il, il faut combiner le traitement, associer les anti-spasmodiques et les calmans aux toniques intérieurs, et aux attractifs extérieurs; varier suivant les cas les pédiluves, les frictions avec la teinture de cantharides, les sinapismes, les vésicatoires. On ne peut rien ajouter à ces principes généraux de traitement également avoués par le raisonnement et l'expérience. Quand la goutte est le principe des affec-

tions nerveuses, il conseille, d'après *Stoll*, d'employer, pendant les attaques, l'opium, le musc, la liqueur de corne de cerf succinée, etc.; hors des attaques, le régime anti-goutteux, les gommes des plantes férulacées, le quinquina, les martiaux, et les autres toniques appropriés.

Les complications aggravent presque toujours la maladie première. Ce précepte offre cependant un très-petit nombre d'exceptions. M. *Dumas* (*Doctr. des mal. chroniq.*) a vu une hypocondrie qui, associée à une fièvre consomptive, tendait rapidement vers une terminaison funeste; l'estomac et les muscles abdominaux furent saisis d'un spasme violent, semblable à la crampe, qui, arrêtant les progrès de la fièvre, suspendit ceux de la consomption, et modifia la vésanie de manière qu'elle pût céder ensuite à l'usage des anti-spasmodiques et des tempérans qu'on avait employés jusqu'alors sans aucun fruit. Mais dans ce cas, peut-on admettre l'existence d'une complication? N'est-ce pas plutôt une affection incidente qui agit d'une manière critique par suite de ce principe, qui fait qu'une irritation plus vive dissipe presque toujours une irritation moins forte. Enfin, quand une phthisie pulmonaire, ou plutôt une disposition à cette maladie, est associée à l'hypocondrie, il faut combiner le traitement de cette dernière avec celui qui convient à l'affection de poitrine, et pour lequel

nous renvoyons page 201 ; mais comme celle-ci a une marche beaucoup plus rapide, et présente souvent des résultats fâcheux, elle a droit aux soins les plus empressés du médecin.

Après avoir étudié le traitement de cette névrose, et les moyens applicables, soit à ses symptômes prédominans, soit à ses complications, il nous reste, pour en terminer la thérapeutique générale, à considérer par quels procédés on peut prévenir son invasion, ou plutôt ses retours.

SEPTIÈME SECTION.

Traitement préservatif de l'Hypocondrie et de ses rechutes.

Le traitement préservatif de cette vésanie n'est pas, sous quelques rapports, susceptible de considérations aussi étendues ou aussi directes que celui de l'hystérie : cette dernière attaque les personnes du sexe, le plus souvent avant leur entier développement ; tandis que l'autre affecte spécialement l'âge adulte, c'est-à-dire, qu'elle se déclare lorsque l'organisation a acquis son complément : aussi n'est-il pas également facile de la prévenir. C'est pourquoi nous exposerons simultanément les règles de conduite les plus propres à s'opposer à l'invasion première, et aux retours des névroses hypocondriaques; ceux-ci sont assez fréquens : j'en connais du moins plusieurs exemples, et je rappelle ici l'observation, page 718.

Quelquefois une rechute est plus grave, comme dans le fait que je viens de mentionner; dans d'autres cas, la récidive peut être moins rebelle ou moins longue, ce qui toutefois dépend de l'intensité ou de la multiplicité des causes.

Le premier soin que l'on doit se proposer, c'est de fortifier la constitution, quand il existe de l'affaiblissement; on s'efforce en même temps de régulariser toutes les fonctions, on évite les dérangemens de la transpiration, des sécrétions ou des hémorrhagies habituelles, etc. D'autres fois on éloigne toutes les causes, les impressions antipathiques ou irritantes, etc.

L'expérience a démontré que l'hypocondrie, quoique moins sujette aux rechutes que la mélancolie, et surtout la manie, n'en était cependant pas exempte; on les préviendra en écartant les causes spéciales qui ont donné naissance à la maladie; par un bon régime, une vie active, et enfin par la modération dans les affections du cœur et dans l'exercice de l'entendement.

Les hommes qui donnent à l'étude ou à des travaux d'administration ou de cabinet une grande partie de leur temps, compenseront les inconvéniens d'une application mentale trop soutenue par des exercices variés, des promenades fréquentes, ou des occupations mécaniques. Une attention extrême à supporter courageusement les contrariétés et les peines de la vie, à les affai-

blir, ou au moins à en diminuer les effets par l'empire de la raison et les ressources puissantes de la diversion, constitue également un des moyens prophylactiques par excellence. L'étude modérée, la fréquentation des sociétés, des spectacles, les voyages, tous les moyens de diversion sont également susceptibles d'affaiblir, d'attiédir les effets d'un violent chagrin, d'une passion orageuse. On préviendra les retours de cette névrose lorsqu'ils pourraient être favorisés par l'onanisme, en rappelant à celui qui est coutumier de ce vice la honte dont il se couvre. On recommandera en outre aux femmes et aux personnes habituées à des hémorrhagies ou à des écoulemens habituels, de ne commettre aucune imprudence capable d'interrompre ces sortes d'évacuations naturelles, d'où dépend l'intégrité de leur santé. Engagez une jeune femme, qui fut hypocondriaque, à nourrir son nouveau-né; les soins de l'allaitement et de la maternité seront un excellent préservatif du retour de cette vésanie.

Le traitement des récidives ne diffère pas en général de celui de l'affection elle-même; on pourra de plus dans ce cas faire tourner au profit du malade la situation où il se trouve, en lui rappelant la première atteinte qu'il a essuyée, les inquiétudes qui l'ont tourmenté, et la terminaison heureuse de la maladie. On doit de préfé-

rence employer les moyens qui ont déjà réussi, avec les modifications qui seront commandées par la nature différente de l'âge, des causes ou des accidens.

Nous terminons ici l'histoire de l'hypocondrie, comme nous avons fait, au sujet de l'hystérie, par un résumé qui nous rappellera les principales divisions de ce travail, ses traits les plus notables, en un mot par l'analyse succincte de cette maladie.

CHAPITRE XII.

Résumé de la deuxième Partie.

L'HYPOCONDRIE est une maladie nerveuse, *sui generis*, distincte des diverses affections avec lesquelles on l'a confondue.

Son étymologie, d'υπο, sous, χονδρος, cartilage, nous indique en partie le siége qu'elle occupe; en effet, elle affecte les organes situés entre les hypocondres et dans ces cavités, ou plutôt leur système nerveux.

Sa synonymie est nombreuse; les auteurs semblent s'être proposé de rappeler un de ses symptômes ou de ses effets dans la dénomination qu'ils avaient adoptée; d'où l'on peut conclure qu'ils ont reconnu, au moins tacitement, la nécessité de choisir des mots qui fussent en rapports avec les idées qu'ils voulaient exprimer.

Les nosographes ont peu varié sur le rang que

cette maladie doit occuper dans un cadre méthodique. De nos jours on se rallie généralement à l'avis du professeur *Pinel*, qui la place dans les névroses; ordre : vésanies.

Depuis *Hippocrate*, tous les médecins avaient bien distingué l'hypocondrie et l'hystérie. *Sydenham* le premier a voulu les identifier, et a, malheureusement, fait partager son erreur à ses contemporains. Il était réservé à l'auteur de la *Nosographie philosophique* de signaler cette méprise, que les bonnes dissertations sorties de l'École de Paris ont amplement rectifiée.

Les sources d'où dérive cette vésanie sont nombreuses : les unes ne constituent que des dispositions; les autres sont des causes déterminantes. Parmi les premières on distingue une sensibilité physique très-vive, les professions ou métiers qui n'exigent presque aucune locomotion; les extrêmes de la température, les variations brusques de l'atmosphère, les dérangemens de la transpiration, les refroidissemens, un froid trop vif, une chaleur trop intense, l'impression de l'humidité. Sur la première ligne des causes productrices de la maladie on range la vie sédentaire, et surtout quand elle succède à des habitudes très-actives, physiques et morales; exemple, les militaires et les négocians retirés du service ou des affaires; parfois aussi une trop grande fatigue.

La surcharge habituelle de l'estomac, ou les excès de table, la pénurie des alimens, et une nourriture grossière amènent cette vésanie.

Les mêmes effets proviennent quelquefois de l'abus des liqueurs alcooliques, ou de la privation totale de ces boissons, surtout quand on y joint l'usage d'une eau de mauvaise qualité, ou l'habitude des travaux manuels les plus pénibles. Une boisson très-froide ou à la glace, prise dans le moment d'une soif ardente ou d'une forte transpiration, et avalée subitement, peut être suivie des mêmes conséquences; on aggrave alors le mal si on se livre au repos.

Les médicamens, par une administration inconsidérée, deviennent quelquefois aussi l'origine de cette maladie : tel est l'usage trop prolongé des boissons délayantes, des astringens, comme le baume de Copahu, des substances toniques, comme le quinquina, prescrites trop tôt ou en trop grande quantité. Ne peut-on pas admettre en outre qu'une fièvre intermittente soit remplacée par une hypocondrie, sans que le traitement ait eu aucune part à cette succession. Poursuivons l'examen des causes, et indiquons comme propres encore à déterminer ou à aggraver cette névrose, un usage indiscret ou trop multiplié des narcotiques, des purgatifs, des émétiques, des substances irritantes, comme le sublimé, etc.

Elle provient aussi de différens troubles sur-

venus dans notre économie : ainsi la marche d'une maladie, et surtout des affections cutanées, intervertie spontanément ou par des efforts inconsidérés, la suppression ou cessation prématurée d'un exutoire, d'une suppuration ou d'un écoulement quelconque à la surface de la peau, l'arrêt spontané de la transpiration ou d'une sueur habituelle aux pieds, aux aisselles, etc.

Nous citerons encore, comme source très-féconde de l'hypocondrie, le dérangement des règles, et surtout celui du flux hémorrhoïdal, et en général des hémorrhagies; la négligence d'une saignée périodique; une perte de sang trop considérable par suite de l'application des sangsues, des saignées trop réitérées ou trop copieuses, une hémorrhagie accidentelle ou naturelle, l'onanisme et toute déperdition trop considérable.

Les circonstances suivantes exercent, sous ce rapport, une action moins énergique; telles sont l'altération des sucs gastrique, pancréatique, l'âcreté de la bile ou sa trop grande abondance; des concrétions biliaires, des vers, etc.

La prédominance du tempérament biliaire, la susceptibilité des organes abdominaux, la compression habituelle exercée sur ces viscères par des ligatures ou par des corps extérieurs, comme dans certaines professions; un état chlorotique,

plus souvent une débilité générale ou du système digestif seulement ; les efforts impuissans de la nature pour établir un flux hémorrhoïdal, une hémorrhagie, un écoulement, ou la crise d'une maladie; la pléthore sanguine; le transport de certaines affections cutanées, rhumatismales ou goutteuses, etc. ; les fièvres gastriques ou muqueuses, enfin les phlegmasies des organes de l'abdomen mal jugées conduisent au même désordre.

De l'analyse des causes physiques passons à un examen également rapide des causes morales. Les impressions antipathiques n'ont, à ce sujet, qu'une influence indirecte ou secondaire, mais l'empire de l'exemple, et surtout la lecture des livres de médecine, et le spectacle habituel des malades, est pour les gens du monde et pour les médecins une cause des plus puissantes.

Une timidité ou une pusillanimité démesurée seconde puissamment l'action de ces dernières causes. Nous ferons encore remarquer comme dispositions un caractère morose, mélancolique, l'habitude de s'ennuyer de tout et partout. Non-seulement le défaut d'exercice, mais encore l'isolement où sont beaucoup d'ouvriers, favorisent ce dérangement de la santé. L'habitude des contentions d'esprit, si familière aux hommes de cabinet, les travaux administratifs, même sans forte application mentale, disputent le premier

rang parmi les circonstances qui amènent la production de cette vésanie. On ajoute à leur action en se livrant à l'étude, à l'issue des repas, ou dans une position vicieuse.

Notons en outre une imagination ardente, et les professions qui provoquent son exaltation, comme celles de poète, de musicien, etc.

Le plaisir ne peut déterminer l'hypocondrie qu'autant que son impression est brusque ou extrême, ou qu'il succède à un sentiment contraire ; mais le regret d'avoir quitté un pays ou une personne, objet d'un vif attachement, y concourt plus souvent.

Toutes les affections pénibles de l'âme, dont l'influence est si fréquente et si variée ; l'ennui, le vide du cœur, un amour contrarié, des chagrins domestiques, les revers de fortune, les tourmens de l'envie, de la jalousie, des emportemens journaliers, une ambition trompée dans ses calculs ; les chagrins politiques, suite des proscriptions, des exils, des destitutions, de l'envahissement de son pays ; la perte de nos parens, de nos amis, d'un enfant chéri ; la peine qui résulte d'une maladie chronique, exempte de douleurs vives, contribueront en plus ou en moins à l'invasion de cette névrose.

La crainte exerce à cet égard une action très-manifeste. Le plus souvent, c'est la peur d'une maladie dont on entend faire des récits, ou dont

on a sous les yeux le spectacle journalier : tantôt c'est la crainte d'un péril réel, tantôt celle d'un danger imaginaire ou au moins exagéré; d'autres fois c'est la frayeur des ravages qui sont attribués, avec ou sans raison, à des traitemens mercuriels. Enfin, nous mentionnerons ici l'empire d'une disposition héréditaire physique et morale.

Les causes varient suivant l'âge, le sexe, le tempérament, les différentes professions, le pays, le climat, les habitudes, etc. Leurs effets sont tantôt accélérés ou augmentés, tantôt ralentis ou anéantis par diverses circonstances. Souvent une seule cause détermine la maladie, d'autres fois plusieurs concourent à son développement.

Mais où réside l'hypocondrie? Le cerveau, les nerfs, les différens viscères de l'abdomen, etc., ont tour à tour été réputés le siége de cette affection, dont l'essence, la nature intime, n'a pas cependant varié selon les systèmes prédominans. Elle réside, suivant nous, dans les organes de l'abdomen, spécialement dans l'estomac, et consiste dans une affection, une exaltation de leurs propriétés vitales, et surtout de la sensibilité organique.

Le plus souvent son invasion s'opère lentement ; les malades n'accusent pendant longtemps qu'un trouble léger dans leurs digestions, et une sensibilité obtuse à l'épigastre ou aux

hypocondres. A une époque plus ou moins éloignée, ils se plaignent d'éprouver des vents, des rots et des borborygmes. L'appétit est parfois dérangé; cependant, chez un assez grand nombre, il se maintient; dans d'autres cas, il y a alternative de voracité et d'inappétence. Un malaise local, ou qui réagit sur le cerveau, s'annonce pendant la digestion : s'il survient peu de temps après le repas, on doit en conclure que l'estomac est l'organe affecté; mais quand il se manifeste deux ou trois heures après le dîner, on est en droit de présumer que le principal trouble réside dans le canal intestinal. La plupart de ces malades ressentent des tensions, des contractions, des douleurs sourdes, ou même des palpitations dans l'abdomen, et surtout vers l'épigastre et les hypocondres; les secrétions sont en général peu altérées; l'urine est ordinairement limpide; le plus souvent il y a constipation.

Plus tard, la maladie se propage aux organes voisins : dès-lors, resserremens spasmodiques de la poitrine, gêne de la respiration, toux sèche, palpitations; pouls irrégulier, et rarement manque total des pulsations à l'artère radiale; sentiment de constriction vers le col peu prononcé, et encore moins fréquent.

État variable de la figure, qui tantôt porte l'empreinte du désordre, tantôt n'en laisse apercevoir aucun indice.

Maux de tête, pesanteurs, étourdissemens, bourdonnemens, embarras, vertiges, éblouissemens, sensibilité étonnante des cheveux ou plutôt du tissu sur lequel ils sont implantés.

Douleurs plus ou moins mobiles, superficielles ou profondes, de nature extrêmement variée, rarement avec développement considérable de la sensibilité animale ou relative; sensations anomales, fourmillemens, engourdissemens, crampes, saccades, froids irréguliers ou chaleurs erratives, sortes de paralysies dans les membres abdominaux et thorachiques, faiblesse et instabilité plus ou moins grande dans la progression, quelquefois chutes fréquentes sur les genoux; sommeil ordinairement troublé par des rêves, quelquefois insomnie, agitation, cauchemar, bruits singuliers simulant une détente ou la détonation d'une arme à feu, craquemens, rarement accès de somnambulisme. Exaltation générale de la sensibilité. Augmentation des accidens, lors des changemens de température, au renouvellement des saisons, et surtout quand le vent souffle sud-ouest; par suite des impressions morales un peu vives; ou chez les femmes à l'approche des règles.

Tôt ou tard les organes de nos relations extérieures participent à ce trouble; les sens acquièrent ordinairement une grande susceptibilité. Le désordre mental se prononce plutôt et davan-

tage, quand l'hypocondrie provient d'une cause morale. Les craintes les plus bizarres, relatives à *leur moi physique*, poursuivent ces malades, et le moindre trouble de l'organisation leur semble l'annonce d'une maladie grave ou mortelle. Tristes et ennuyés, recherchant la solitude, fuyant le mouvement ou l'exercice, ils gémissent sur leur situation, mais n'attentent presque jamais à leurs jours. Ils se plaisent à entretenir de leurs souffrances, sollicitent des remèdes, et se plaignent d'un vague, d'un vide, d'une sorte d'ivresse qui leur ôte parfois toute aptitude au travail. L'entendement est troublé; mais le dérangement des fonctions intellectuelles n'est jamais essentiel; c'est l'imagination qui est le plus affectée, et toujours sympathiquement.

Leurs maux peuvent être exagérés, mais ne laissent pas d'être réels. Ils en parlent souvent avec emphase, avec exaltation, et ont en général une manière de s'exprimer toute particulière; un *modus dicendi* qui leur est propre. D'autres portent une attention minutieuse à observer tout ce qui est relatif à leur santé. Parmi leurs craintes les plus familières, nous distinguerons la crainte de la folie, des syncopes, et des accidens attribués au mercure. Les femmes redoutent en outre les maladies qui leur sont particulières.

Nous n'admettons qu'une seule espèce d'hypocondrie, et nous ne nous arrêterons pas à ses

variétés qui n'offrent rien de notable. Les phénomènes accidentels les plus singuliers sont l'hydrophobie ou plutôt l'horreur de l'eau, des quintes de toux assez vives, un hoquet spasmodique, des gargouillemens sonores, au point d'être insupportables ; des hémorrhoïdes sèches ou fluentes, et parfois très-douloureuses ; les irrégularités de la menstruation, l'influence souvent favorable de la grossesse, etc. etc.

Cette névrose se termine par une guérison quelquefois prompte, plus ordinairement tardive, ou se convertit en d'autres maladies dont la mort est trop fréquemment le terme. Ses crises les plus communes sont les éruptions, les clous, les abcès, la salivation, une sécrétion abondante d'urine, les écoulemens des surfaces muqueuses, les diarrhées, les vomissemens, les différentes hémorrhagies, les règles, et plus souvent le flux hémorrhoïdal.

L'exaltation de la sensibilité organique des viscères abdominaux et pectoraux favorise le développement de leur sensibilité animale, et par conséquent leurs inflammations aiguës et chroniques, ou l'altération de leurs tissus.

Parmi les complications de l'hypocondrie, on distingue celles qui s'en rapprochent par leur nature ou par l'identité et l'analogie de siége ; d'autres ne s'y trouvent associées que par suite de leur extrême fréquence ou de leur coïncidence.

Mais prévenons qu'à mesure qu'il s'établit une autre affection, et spécialement une phlegmasie ou une lésion organique, on voit d'une part augmenter les signes locaux de celle-ci, et de l'autre s'affaiblir les phénomènes sympathiques de l'hypocondrie, qui, de toutes nos maladies, est la plus féconde en résultats sympathiques.

L'hystérie et la mélancolie, plus rarement les aliénations et l'épilepsie, compliquent l'hypocondrie. Les phlegmasies chroniques et les lésions organiques de l'abdomen sont distinctes de cette vésanie, avec laquelle on les a confondues : mais elles la compliquent fréquemment, et en sont de plus une terminaison assez ordinaire.

Nous noterons parmi ses complications accidentelles les dartres, les paralysies, les fièvres intermittentes, les vers.

Pour établir son diagnostic, nous avons suivi deux procédés, l'analyse et l'exclusion. La première, c'est l'appréciation des principaux symptômes que présente un malade; la seconde est l'art de distinguer une maladie au milieu des diverses affections avec lesquelles on pourrait la confondre, par suite d'analogies ou de similitudes spécieuses. C'est cette dernière méthode que nous emploierons d'abord, pour tracer le cordon qui sépare l'hystérie et l'hypocondrie.

Les névroses utérines se manifestent principalement à l'époque de la puberté et à l'âge de re-

tour; l'hypocondrie, commune aux deux sexes, se déclare le plus souvent chez l'adulte, et succède à la vie sédentaire, aux travaux forcés du cabinet, aux affections pénibles de l'âme, à la suppression des hémorrhoïdes, à l'abus des médicamens intérieurs, etc.; tandis que l'hystérie tient communément au dérangement des règles, à la continence et aux chagrins d'amour. En général, les causes de l'hypocondrie sont plus nombreuses et plus variées, et attaquent un bien plus grand nombre d'individus.

Dans l'hystérie, le plus souvent l'invasion est brusque, les accidens parviennent très-promptement à leur plus haut degré, et se terminent dans l'espace de deux à trois heures ou de deux à trois jours; ils reparaissent ensuite à une époque plus ou moins prochaine. Telle est du moins leur marche la plus constante. L'accès s'annonce fréquemment par un trouble, un fourmillement vers l'utérus, le sentiment d'une boule qui de l'hypogastre s'élève, par un mouvement oscillatoire, jusqu'à la gorge, où existe une constriction violente; il s'y joint une perte de connaissance, rarement complète, et des mouvemens convulsifs ordinairement très-violens.

A la fin de l'accès, on observe un flux abondant d'urine, claire et limpide, et des évacuations utéro-vaginales, accompagnées quelquefois d'une sensation voluptueuse. Ces évacuations,

et le retour des règles forment les crises les plus fréquentes de l'hystérie, qui se termine très-souvent par le retour à la santé. Quand, par suite de son intensité ou d'une complication, cette névrose devient funeste, ses traces se rencontrent constamment vers l'utérus et ses annexes.

Chez les hypocondriaques, la maladie marche lentement; mais elle se prolonge bien davantage. Elle est continue, avec redoublemens irréguliers: au début, trouble varié des digestions; plus tard, exaltation de la sensibilité générale, aberrations mentales, multiplicité étonnante des symptômes. Lorsque l'hypocondrie devient mortelle, ce qui n'arrive qu'à la suite d'une complication, le désordre existe presque toujours dans les viscères de l'abdomen.

Leur traitement diffère également : dans l'hystérie, en rappelant les menstrues, on est souvent très-utile; mais le remède souverain c'est l'union désirée, ce sont les plaisirs de l'hymen. Une vie active, les voyages, et les différens modes de diversion, sont parfois aussi d'une application avantageuse, mais secondaire : ces moyens constituent au contraire les ressources les plus puissantes, les plus directes et les plus constantes de l'hypocondrie; il faut cependant y joindre les procédés susceptibles de rappeler les hémorrhagies, et particulièrement le flux hémorrhoïdal.

Si nous cherchons à faire ressortir les nuances

qui distinguent l'hypocondrie de la mélancolie, nous remarquerons que dans celle-ci les causes sont plus souvent morales que dans la première. Comme sources particulières de mélancolie, nous citerons un amour-propre exagéré, l'habitude de la crainte, une frayeur vive, les remords, tous les grands événemens d'un siècle, l'influence des erreurs ou des opinions religieuses, qui est nulle ou presque nulle, quant au développement de l'hypocondrie. Celle-ci nous offre un trouble manifeste, mais lent, des fonctions digestives, l'exaltation de la sensibilité générale, des aberrations mentales, des terreurs paniques relatives à la santé. Très-souvent l'invasion de la mélancolie a lieu d'une manière rapide; il y a délire exclusif et permanent sur un objet particulier, et sur une série d'idées qui s'y rattachent, délire partiel, relatif *au moi moral,* aux affections du cœur ou aux fonctions de l'entendement; tantôt une passion dominante, souvent une propension à la défiance sur les motifs les plus frivoles; une bouffissure ou une timidité également démesurées, et dans certains cas, un amour exalté du pays natal, ou un penchant très-prononcé au suicide; ce qui forme trois espèces particulières.

La mélancolie se complique spécialement avec d'autres aliénations, et est susceptible aussi de curation. Il faut, pour guérir le mélancolique,

employer des subterfuges, affaiblir, détruire sa passion dominante, vers laquelle son imagination tend toujours à revenir, comme l'aiguille aimantée vers le pole.

Si l'analogie de siége et de quelques symptômes a pu faire confondre l'hypocondrie et les phlegmasies chroniques de l'estomac, la différence de nature et de leurs principaux phénomènes aurait dû prévenir cette méprise. Afin de la faire éviter, rappelons les caractères distinctifs de ces affections.

Les phlegmasies chroniques attaquent tous les âges, et particulièrement les hommes qui fatiguent beaucoup, et qui souvent reprennent trop tôt leurs travaux à la suite d'une maladie; ceux qui sont mal vêtus, exposés aux intempéries de l'air, et qui, se nourrissant d'alimens grossiers, en jeûnent quelquefois pendant plusieurs jours, comme les militaires en campagne; enfin, ceux qui, privés habituellement d'une nourriture restaurante et de boissons toniques, en font excès dans d'autres cas. Les sudorifiques ou stimulans donnés mal à propos, dans le moment d'une irritation, l'abus des médicamens qui troublent par une action immédiate les organes digestifs, sont encore des causes plus spéciales de ces phlegmasies.

Dans celles-ci, trouble des digestions plus intense, désordre fixe et limité; soif, chaleur et

fréquence du pouls plus prononcées ou plus constantes, et surtout la nuit; insomnie plus physique que morale, redoublemens sensibles, altération plus grande de la figure, dépérissement rapide.

Terminaisons en général plus promptes, et souvent mortelles. Tout annonce ici, non une exaltation de la sensibilité organique, mais une affection locale de la sensibilité animale. Les délayans, la diète ou la nourriture la plus légère, le repos du lit, sont la base du traitement applicable aux phlegmasies chroniques. Qui ne sent maintenant combien diffèrent ces deux genres de maladies? Mais ces affections si dissemblables se compliquent, et c'est cette circonstance qui, échappant même à l'œil des observateurs attentifs, a jusqu'ici occasionné de fréquentes erreurs.

Il est un autre ordre de lésions qui peuvent encore, par leur siége, donner lieu à des méprises, bien que leur nature soit toute différente: ce sont les altérations organiques des viscères abdominaux.

Ne pouvant passer ici en revue leurs signes particuliers énoncés pages 547, etc., nous nous bornons à leurs caractères généraux. Ici, les symptômes sont encore plus locaux, plus fixes, plus constans, plus continus; il s'y joint tôt ou tard le trouble prédominant d'une fonction importante, la perte de l'appétit, l'anorexie, la car-

dialgie, souvent l'ictère, et les douleurs dans l'hypocondre droit ou dans la région de la rate, etc.; douleurs d'abord sourdes, puis vives, et enfin lancinantes; la difficulté croissante des digestions, quelquefois les vomissemens, et la constipation avec alternatives assez rares de diarrhée. Dans ces cas, les plaintes des malades peuvent nous éclairer; un pressentiment intérieur semble souvent les avertir : aussi leurs plaintes sont calmes, constantes, invariables, et offrent fréquemment l'accent de la résignation ou du désespoir.

Passant également sous silence le parallèle de l'hypocondrie avec les affections qui s'en rapprochent, mais faiblement, nous nous arrêtons à son pronostic.

Celui-ci varie suivant l'âge et la constitution de l'individu, l'état général des forces vitales, la cause, le degré et l'ancienneté de la maladie; selon les circonstances favorables ou fâcheuses où l'on est placé, les différentes professions, une atteinte première ou plusieurs attaques consécutives; enfin les complications modifient encore le jugement du médecin. Nous avons rapporté l'opinion de *Tissot*, qui nous semble avoir jugé trop sévèrement cette vésanie, à moins que son pronostic ne soit applicable à l'affection nerveuse compliquée. Celui de *Baglivi* est très-rassurant, et, considéré dans son application exclusive à l'hypocondrie simple, se rapproche bien da-

vantage de la vérité, ou plutôt en est l'expression fidèle.

Les lésions organiques que présentent à l'autopsie les personnes qui succombent dans un état d'hypocondrie, sont très-variées, et se rencontrent le plus souvent sur les viscères de l'abdomen ; elles ne sont presque jamais la conséquence de cette névrose, mais dépendent d'une autre maladie.

Nous arrivons au traitement général de l'hypocondrie, que nous avons divisé en traitement, 1°. de la maladie ; 2°. des symptômes; 3°. des complications. Dans des considérations préliminaires, nous posons en principe qu'il doit être varié suivant la cause, parce que la soustraction de celle-ci favorise ou produit souvent la guérison : *Sublatâ causâ, tollitur effectus;* suivant le climat, la saison, la constitution, l'idiosyncrasie, l'état général des forces, et les dispositions accidentelles physiques ou morales.

Les lois de l'hygiène sont une des parties essentielles du traitement. Si le froid modéré est favorable à l'action du système digestif, un froid trop vif, l'humidité, la pluie, la briéveté des jours pendant l'hiver, sont autant de circonstances contraires, parce qu'elles forment autant d'obstacles aux promenades, aux voyages, etc.

On recommandera à ces malades, et surtout dans la belle saison, un bon air, tel que celui de

la campagne, dont l'influence agit sur notre physique, et même sur notre moral; une habitation salubre et bien située, au midi dans les pays froids ou tempérés, à l'est ou à l'ouest, et même au nord, dans les climats opposés. Du reste, en combattant l'extrême chaleur par les précautions d'usage, ils éviteront les imprudences d'où résultent les refroidissemens; et en militant contre l'intensité du froid par une chaleur douce, égale, ils ne passeront jamais brusquement dans un milieu très-condensé, à moins qu'ils ne soient bien couverts ou aguerris contre ces oppositions de température. Mais rien ne peut balancer sous ce rapport les bons vêtemens, et spécialement l'usage habituel, immédiat et plus ou moins général de la flanelle. Les frictions sont encore une pratique bien entendue; elles sont au système cutané, comme les différens modes d'exercice à l'économie toute entière, l'excitant le plus utile.

Mentionnons d'une manière spéciale l'exercice, cette puissante ressource, dont chaque jour atteste un nouveau succès, mais qui demande à être modifiée selon la force des individus, leur profession, le degré de la maladie, etc. Il n'est pas, en outre, indifférent de s'y livrer dans telle ou telle saison, à une heure ou à une autre, avant ou après le repas, le jour ou la nuit; exemple, à Naples. Mais citons comme très-favorables les voyages, le cabotage, l'équitation, les voitures,

surtout découvertes, depuis les calèches jusqu'aux *carioles ;* les longues promenades au milieu des champs. Qu'elles aient toujours un but, et que le malade y soit en compagnie agréable. Notons encore la chasse, la pêche, le jardinage, les différens jeux de société, ceux de cartes, les occupations mécaniques ou domestiques. Ces dernières sont surtout utiles quand le mauvais temps nous consigne dans nos maisons, ou quand la profession d'un individu lui interdit la possibilité de tout exercice. C'est alors qu'un changement d'état, plus facile dans les classes les moins éclairées de la société, offre une bonne ressource.

Les règles diététiques ne sont pas moins importantes sous le rapport de la quantité et de la qualité de nos alimens : le point important, c'est de ne pas trop exciter l'appétit par la variété ou la préparation des mets ; il faut seulement le satisfaire, et ne jamais surcharger son estomac : trois ou quatre repas légers sont préférables à un ou deux trop copieux. Les légumes herbacés, les viandes douces, le poisson, les œufs frais, les bons fruits bien mûrs ou cuits, et surtout le raisin, formeront la base de la nourriture, à laquelle on joindra l'eau rougie ou le vin pur à dose modérée, relative aux forces de l'individu, à la nature des accidens.

Il faut en outre aider toutes les fonctions, toutes les sécrétions ou excrétions, celles surtout

dont le trouble a favorisé ou déterminé cette vésanie.

L'emploi des médicamens est soumis à des règles générales et particulières : ainsi il est le plus souvent subordonné à la connaissance de la source d'où provient le désordre ; il doit être en outre raisonné, conforme à la nature de la maladie ou des accidens, et non aux doctrines régnantes. On variera leur choix ou leur mode d'administration suivant le tempérament, les dispositions individuelles, et l'idiosyncrasie ; il faut surtout en être économe dans l'hypocondrie produite par des causes morales, par la vie sédentaire, etc.

En se fixant dans le choix des médicamens d'après la nature des causes les plus ordinaires de la maladie qui sont débilitantes, on est conduit à prescrire fréquemment les toniques. En effet, ceux-ci trouvent leur application toutes les fois qu'il y a débilité ; ils sont au contraire contre-indiqués lorsqu'il y a excitation générale.

Les anti-spasmodiques et les narcotiques, seuls ou unis aux fortifians, réussissent contre l'exaltation de la sensibilité organique accompagnée d'atonie, de douleur, sans mouvement fébrile. L'opium n'est pas, comme on le croit vulgairement, un simple palliatif ; c'est un médicament curatif et presque exempt d'inconvénient, s'il est administré d'une manière opportune. Mais avant

de le prescrire, il faut détruire les circonstances qui pourraient contrarier son action. S'il entraîne la constipation, on remédie facilement à celle-ci par les lavemens mucilagineux, laxatifs, etc.

Les absorbans, comme la magnésie et les poudres calcaires, jouissent d'une propriété implicitement annoncée dans leur dénomination, et sont prescrits dans l'état moyen des forces; s'il est rare qu'ils guérissent employés exclusivement, ils ne sont presque jamais nuisibles, et prêtent souvent leur appui à l'action des autres substances.

On administre les délayans aux individus à fibre sèche, dont le tempérament est sanguin, bilieux, sujets aux affections cutanées, qui sont *échauffés*, ou qui ont abusé des nourritures âcres, des liqueurs alcooliques, etc., ou chez qui l'on a prodigué les remèdes irritans.

Contre l'hypocondrie simple l'émétique ne convient presque jamais; à peine est-il applicable à l'embarras gastrique, accident, ou complication. Nous donnons alors la préférence à une infusion d'ipécacuanha, qui expose moins aux accidens consécutifs. L'abus des purgatifs, conséquence fâcheuse d'un système tombé en ruines, n'en doit pas faire proscrire l'usage réflechi : ainsi, ils seront admissibles, et plus souvent sous forme de lavemens ou de suppositoires, chez les personnes peu excitables, avec prédo-

minance du système graisseux, et habituellement constipées.

L'usage du lait, qui s'assimile facilement à notre substance organique, nous fournit un médicament et un aliment également précieux, et dont l'utilité est bien constatée, particulièrement chez toutes les personnes plus ou moins entachées d'un vice dartreux.

On trouve, pour cette classe nombreuse d'individus, une ressource puissante dans l'emploi intérieur et même extérieur des eaux sulfureuses. Les eaux acidules gazeuses conviennent spécialement aux estomacs débiles, peu irritables. Les hommes avec prédominance lymphatique, et atonie du système digestif, se trouveront fort bien des eaux ferrugineuses : celles de Passy, épurées, pourront, dans bien des cas, être éminemment utiles. Les eaux salines, de Sedlitz, etc., seront indiquées aux hypocondres replets, avec embarras, empâtement des premières voies ; mais ce qui ajoutera surtout au bon effet des eaux minérales, c'est le voyage, le mouvement et les impressions morales qui en émanent.

A l'examen des moyens intérieurs joignons celui des agens extérieurs. J'ai dit que les exutoires étaient en général beaucoup trop négligés, et j'en pourrais citer nombre de preuves (1);

---

(1) Le docteur *Ribes*, l'un de nos chirurgiens les plus

cependant on devra les employer dans les constitutions avec prédominance du tissu cellulaire, et dans les cas de rhumatismes ou de dartres.

Les bains tièdes sont recommandés aux sujets atrabilaires, etc., et sont fréquemment avantageux. Les bains froids, ceux d'eau courante et de mer sont également susceptibles des meilleurs résultats, quand la température est fort élevée. Les bains d'eaux minérales pris à propos ne seront pas moins favorables.

Le traitement moral forme le complément de notre thérapeutique, et n'est pas susceptible d'un moindre nombre d'applications utiles ; il se compose de tout ce qui peut agir sur nos sens et modifier nos sensations ou affections, et des impressions diverses que reçoivent nos passions et nos facultés intellectuelles.

Il importe que ces malades recherchent les lieux fréquentés, animés, les sites les plus variés, les spectacles, les réunions nombreuses, ou la société de quelques amis, et de préférence celle des personnes gaies, franches, ouvertes; qu'elles fuient les hommes atteints des mêmes maux, la lecture des livres de médecine, en un mot, l'influence de l'exemple. Elles devront se livrer à

---

instruits et les plus distingués, a été long-temps tourmenté par une névrose du système abdominal ; depuis l'application d'un vésicatoire, que je lui ai conseillé, il se porte fort bien.

l'exercice, faire de fréquentes promenades, s'occuper constamment ou à des travaux manuels ou à des jeux récréatifs, afin de songer moins souvent au trouble de leur santé. A un petit nombre on permettra une application modérée de leur entendement.

Contre les peines de l'âme il faut employer les consolations de l'amitié, tous les modes de diversion, les voyages. Quand l'hypocondrie provient d'un amour malheureux, il faut conseiller l'union désirée par le malade; si des obstacles s'y opposent, un nouvel attachement apportera bientôt un remède certain.

Il faut en outre rassurer l'imagination effrayée des hypocondres par le langage de la raison, en leur donnant la preuve que leur maladie, bien que très-fâcheuse, n'est point aussi grave qu'ils le pensent; leur citer la sentence de *Baglivi*, et la longevité à laquelle sont parvenues des personnes qui furent sujettes aux mêmes maux. Mais gardez-vous de n'ajouter aucune foi à leurs récits, à leur maladie, car vous éloigneriez leur confiance, et loin de leur être utiles, vous aggraveriez leur mauvaise disposition physique et morale. Tantôt on abonde dans leur sens pour les ramener doucement et insensiblement à une opinion plus exacte, plus conforme à la vérité; tantôt on combat franchement leurs opinions ou plutôt leurs erreurs; d'autres fois on a lieu de s'applau-

dir d'avoir apporté dans ces sortes de discussions de la chaleur, de la vivacité, et même un peu d'emportement. Telles sont les règles principales que nous avons développées en exposant le traitement général de la maladie; mais il est en outre quelques considérations relatives à la médecine du symptôme.

Ainsi l'on combattrait une cardialgie violente par l'usage intérieur et extérieur des opiacées à doses convenables. On opposerait au vomissement nerveux, au hoquet spasmodique, les mêmes moyens, souvent aussi la potion de *Rivière*, et parfois les irritations à la surface cutanée. Les toniques, les amers sont ordinairement les agens par excellence contre l'atonie intestinale avec surabondance de gaz et borborygmes; ils seraient contre-indiqués dans les cas d'irritation générale ou locale; et les délayans, les bains tièdes seraient alors bien placés. Les syncopes réclament les excitans, secondés plus tard par l'usage des fortifians; aux vertiges on remédie par les frictions alcooliques vers le sinciput; aux bourdonnemens d'oreilles, par les applications analogues, etc. On ramène le sommeil par l'exercice des sens, des facultés intellectuelles, et le retour des mouvemens physiques; plus tard, par un demi-grain ou un grain d'opium gommeux. Enfin on dissipe la somnolence par une vie active; par les toniques et l'usage du café, s'il y a fai-

blesse; par les saignées et les laxatifs, s'il y a pléthore.

Quand l'exaltation mentale ou la prédominance d'une idée font craindre la manie ou la mélancolie, il faut insister sur les ressources morales et sur l'exercice. Dans le premier cas, on recommandera spécialement le calme de l'âme, de fréquentes promenades dans les champs, l'éloignement de toute dissipation trop bruyante; dans le second, au contraire, on prescrira de préférence le séjour d'un pays très-pittoresque, très-animé, l'habitude des spectacles, tous les modes de diversion.

Contre les complications, on dirige le traitement de l'hypocondrie combiné avec les moyens déduits de la nature de l'autre affection : ainsi, l'hypocondrie hystérique se guérit le plus souvent par le mariage. L'affection dartreuse oblige à modifier le traitement de la vésanie. On ajoute à des habitudes actives les bains tièdes, les médicamens dits dépuratifs, les sulfureux à l'intérieur et extérieurement.

Il faut en outre subordonner le traitement de la névrose à celui de la complication, quand celle-ci présente quelques dangers, comme dans les cas d'inflammations des viscères abdominaux, de dispositions à la phthisie pulmonaire, etc.

Le traitement préservatif de l'hypocondrie et de ses retours consiste, d'une part, à fortifier la

constitution, à régulariser toutes les fonctions, à éloigner toutes les circonstances qui peuvent les déranger, et surtout à prevenir le trouble des hémorrhagies, de la transpiration, les irritations abdominales; de l'autre, à modérer, à compenser l'habitude des méditations par un exercice du corps régulier, journalier; à combattre un attachement malheureux par le sentiment de l'amitié, etc.; et le chagrin que nous cause un ami, par la passion de l'amour; à opposer à toutes les peines morales les consolations affectueuses, le langage de la raison, le calme de l'âme, les principes d'une philosophie bien entendue, et les distractions adroitement amenées. Mais en outre le médecin et le malade redoubleront de soins pour écarter tout agent propre à rappeler dans l'économie de nouveaux désordres.

Enfin nous terminons ici l'histoire des maladies nerveuses *proprement dites;* sous cette dénomination, sous ce double titre d'*affections hystériques* et *hypocondriaques*, nous avons rangé un grand nombre de maladies : nous les avons vues, tantôt se présenter sous la forme d'espèces ou de variétés différentes, tantôt se dessiner par des nuances encore plus multipliées; souvent elles étaient simples, quelquefois elles s'associaient entre elles, plus souvent elles se réunissaient à d'autres désordres, ou ceux-ci venaient s'y adjoindre; et c'est alors surtout que leur ter-

minaison, ordinairement favorable, se trouvait cependant plus ou moins éloignée. Sans doute un pareil cercle est limité, mais on conçoit quel nombre prodigieux d'objets sont compris dans sa sphère; c'est en quelque sorte le cercle de *Popilius* qui renfermait la destinée de tout un peuple; à ce cercle des maladies nerveuses se rattachent aussi le sort, l'existence d'une population encore plus nombreuse.

Si j'ai conduit mes lecteurs, sans avoir fatigué leur attention, dans ces sentiers variés, je respire et je m'applaudis; mais si, chemin faisant, ils ont de lassitude abandonné le livre, je regretterai moins mes veilles que leur peine, et réclamerai toujours, pour mes faibles essais, l'indulgence qu'il est d'usage d'accorder au travail opiniâtre, aux intentions droites et louables.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

PRÉFACE..... Page j

PREMIÈRE PARTIE.

DE L'HYSTÉRIE.

CHAPITRE Ier. Considérations préliminaires..... 1

CHAPITRE II. Causes de l'Hystérie..... 27

PREMIÈRE SECTION. Causes physiques..... 29

DEUXIÈME SECTION. Causes morales..... 37

CHAPITRE III. Siége et Principe de l'Hystérie.... 51

CHAPITRE IV. Histoire de l'Hystérie..... 53

Marche de la Maladie..... 55

Symptômes précurseurs..... 56

Premier degré..... 58

Deuxième degré..... 62

Troisième degré..... 64

CHAPITRE V. Variétés de l'Hystérie..... 74

Première variété. Hystéricisme..... 75

Deuxième variété. Hystérie épileptiforme..... 79

CHAPITRE VI. Terminaisons des accès et de la maladie..... 93

CHAPITRE VII. Complications de l'Hystérie..... 99

CHAPITRE VIII. Diagnostic de l'Hystérie..... 111

PREMIÈRE SECTION. Différences de l'Hystérie et de l'Épilepsie..... 118

DEUXIÈME SECTION. Différences de l'Hystérie, des Convulsions, etc..... 135

CHAPITRE IX. Pronostic de l'Hystérie..... 139

CHAPITRE X. Autopsie cadavérique..... Page 143
CHAPITRE XI. Traitement général de l'Hystérie.. 149
Première Section. Traitement préservatif de la maladie..... 150
Deuxième Section. Traitement préservatif des accès..... 155
Troisième Section. Traitement des accès..... 157
Quatrième Section. Traitement de l'Hystérie... 165
Cinquième Section. Hygiène..... 176
Sixième Section. Médicamens..... 177
Septième Section. Traitement moral..... 189
Huitième Section. Traitement des Symptômes.. 198
Neuvième Section. Traitement des Complications. 201
Dixième Section. Traitement consécutif ou préservatif des récidives..... 207
CHAPITRE XII. Résumé de la première Partie.... 209

DEUXIÈME PARTIE.

DE L'HYPOCONDRIE.

CHAPITRE Ier. Considérations préliminaires..... 217
CHAPITRE II. Causes de l'Hypocondrie..... 224
Première Section. Causes physiques..... *ibid.*
Deuxième Section. Causes morales..... 274
CHAPITRE III. Siége et principe de l'Hypocondrie. 325
CHAPITRE IV. Considérations. Histoire de la maladie..... 329
Premier degré..... 331
Deuxième degré..... 337
Troisième degré..... 347
CHAPITRE V. Variétés de l'Hypocondrie..... 370
CHAPITRE VI. Terminaisons de l'Hypocondrie..... 396

PREMIÈRE SECTION. Terminaisons favorables, suites du traitement..... Page 397
DEUXIÈME SECTION. Crises ou guérisons opérées exclusivement par la nature..... 401
TROISIÈME SECTION. Terminaisons de l'Hypocondrie par d'autres maladies..... 407

CHAPITRE VII. Complications de l'Hypocondrie. 409
PREMIÈRE SECTION. Complications de l'Hypocondrie avec les névroses et vésanies..... 413
DEUXIÈME SECTION. Complications de l'Hypocondrie avec les affections ou lésions des organes abdominaux..... 425
TROISIÈME SECTION. Complications de l'Hypocondrie avec les maladies qui ont des rapports moins directs avec cette névrose, ou qui sont accidentelles..... 449

CHAPITRE VIII. Diagnostic de l'Hypocondrie.... 471
PREMIÈRE SECTION. Différences de l'Hypocondrie et de l'Hystérie..... 477
DEUXIÈME SECTION. Caractères distinctifs de l'Hypocondrie et de la Mélancolie..... 505
TROISIÈME SECTION. Caractères distinctifs de l'Hypocondrie et des phlegmasies chroniques de l'abdomen..... 526
QUATRIÈME SECTION. Caractères distinctifs de l'Hypocondrie avec les lésions organiques de l'abdomen..... 547
CINQUIÈME SECTION. Parallèle de l'Hypocondrie avec les maladies qui s'en rapprochent, mais faiblement..... 563

CHAPITRE IX. Pronostic de l'Hypocondrie..... 579

CHAPITRE X. Anatomie pathologique..... 585

CHAPITRE XI. Traitement de l'Hypocondrie. Considérations préliminaires..... Page 593
PREMIÈRE SECTION. Principes généraux..... 606
DEUXIÈME SECTION. Application des lois de l'Hygiène au traitement de l'Hypocondrie..... 621
TROISIÈME SECTION. Application des médicamens au traitement de l'Hypocondrie..... 647
QUATRIÈME SECTION. Traitement moral..... 693
CINQUIÈME SECTION. Traitement des Symptômes.. 726
SIXIÈME SECTION. Traitement des Complications.. 740
SEPTIÈME SECTION. Traitement préservatif de l'Hypocondrie et de ses rechutes..... 751
CHAPITRE XII. Résumé de la seconde partie..... 754

FIN DE LA TABLE.

ERRATA.

Page 153, *ligne* 29, la moralité, *lisez* les mœurs.
491, 5, cette vésanie, *lisez* l'autre vésanie.
ibid. 15, les sangsues, *lisez* les sangsues à l'anus.
527, 20, ces derniers, *lisez* ces derniers désordres.
587, 10, examiner, *lisez* avoir examiné.
628, 20, brosse de peau, *lisez* brosse à peau.

Document non prêté
Non-circulating item

U D' / OF OTTAWA
COLL ROW MODULE SHELF BOX POS C
333 12 01 02 12 07 4